

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

► **B**

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/354

z dne 4. marca 2020

**o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene in razveljavitvi
Direktive 2008/38/ES**

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 67, 5.3.2020, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
► <u>M1</u>	Uredba Komisije (EU) 2024/2899 z dne 20. novembra 2024	L 2899	1	21.11.2024
► <u>M2</u>	Uredba Komisije (EU) 2025/639 z dne 1. aprila 2025	L 639	1	2.4.2025

popravljen z:

► **C1** Popravek, UL L 90181, 14.12.2023, str. 1 (2020/354)

**UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/354****z dne 4. marca 2020****o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene in razveljavitvi Direktive 2008/38/ES****(Besedilo velja za EGP)***Člen 1*

Krma za posebne prehranske namene v smislu Uredbe (ES) št. 767/2009 se lahko daje v promet le, če:

- se upoštevajo splošne določbe za krmo za posebne prehranske namene iz dela A Priloge k tej uredbi ter
- je njena predvidena vrsta uporabe vključena v del B Priloge k tej uredbi in se upoštevajo določbe zadevnega vnosa.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 1 se lahko krma za posebne prehranske namene, ki je v skladu z določbami Direktive 2008/38/ES, še naprej daje v promet, če je bila vloga za predvideno vrsto uporabe, zajeto v navedeni direktivi, predložena Komisiji v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 767/2009 pred 25. marca 2021 in dokler se Komisija ne odloči o vlogi.

Člen 3

Krma za posebne prehranske namene, ki je bila označena pred 25. marcem 2022 po pravilih, ki se uporabljajo pred 25. marcem 2020, se lahko še naprej daje v promet in uporablja do porabe obstoječih zalog.

Člen 4

Direktiva 2008/38/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 25. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B*PRILOGA***DEL A****Splošne določbe za krmo za posebne prehranske namene**

1. Kadar je v stolpcu 2 dela B navedena več kot ena skupina osnovnih prehranskih značilnosti, označena z „in/ali“, za isti posebni prehranski namen, lahko proizvajalec uporabi eno od skupin ali obe skupini osnovnih značilnosti, da izpolni posebni prehranski namen, opredeljen v stolpcu 1 dela B. Za vsako od možnosti so v stolpcu 4 navedene ustrezne deklaracije za označevanje.
2. Kadar je osnovna prehranska značilnost, omenjena v stolpcu 2 dela B, količinsko navedena, se uporabljajo določbe člena 17(2) Uredbe (ES) št. 767/2009 in dovoljene tolerance, kot so določene v Prilogi IV k navedeni uredbi. Če v navedeni prilogi toleranca za zadevni podatek pri označevanju ni določena, je dovoljeno tehnično odstopanje $\pm 15\%$.
3. Kadar je krmni dodatek omenjen v stolpcu 2 ali 4 dela B, se uporabijo določbe o dovoljenju v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾, njihova uporaba pa mora biti v skladu z določeno osnovno prehransko značilnostjo.
4. Kadar je v stolpcu 4 dela B treba navesti deklaracijo snovi, ki je ►C1 dovoljena ◄ tudi kot krmni dodatek, in jo spremlja izraz „skupaj“, se skupna vsebnost snovi označi pod naslovom „analitske sestavine“.
5. V deklaracijah, ki jih je treba navajati v skladu s stolpcem 4 dela B, se navede količina brez poseganja v Direktivo 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾.
6. Priporočeni rok uporabe v stolpcu 5 dela B navaja obseg, v katerem je običajno treba doseči prehranski namen. Proizvajalci lahko navedejo natančnejše roke uporabe v okviru določenih skrajnih meja.
7. Kadar mora krma, namenjena posebnemu prehranskemu namenu, ustrezati več kot enemu posebnemu prehranskemu namenu, mora biti v skladu z vsemi ustreznimi vnosi v delu B.
8. V primeru dopolnilnih krmnih mešanic za posebne prehranske namene je treba v navodilih za pravilno uporabo navesti smernice o uravnoteženem dnevnem obroku.

▼M2

9. Kadar je krma za posebne prehranske namene z ustreznim načinom uporabe namenjena za posamezno peroralno dajanje prek bolusa, se to za zadevno krmo navede v stolpcu „druge določbe“. Taka krma, vključno z morebitno oblogo, vsebuje izključno posamična krmila in krmne dodatke, razen če je v vnosu drugače določeno. Priporoča se, da krmo, ki je namenjena za posamezno peroralno dajanje, daje veterinar ali druga pristojna oseba.

⁽¹⁾ Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).

⁽²⁾ Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, 30.4.2004, str. 45).

▼ M2

10. Kadar se krma za posebne prehranske namene, ki je posamično krmilo ali dopolnilna krmna mešanica, namenjena za posamezno peroralno dajanje z upočasnjnim sproščanjem spojin (ki traja več kot 24 ur), daje na trg v obliki bolusa, morata biti, če je primerno, pri označevanju take krme za vsak krmni dodatek, za katerega je določena najvišja vsebnost v popolni krmni mešanici, navedena najdaljše obdobje neprekinjenega sproščanja bolusa in stopnja dnevnega sproščanja. Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki bolus daje na trg, mora predložiti dokaze, da dnevna razpoložljiva raven krmnega dodatka v prebavnem traktu ne bo presegla, če je primerno, najvišje vsebnosti dodatka, določene na kilogram popolne krmne mešanice v celotnem obdobju krmljenja (učinek upočasnjjenega sproščanja). Tak dokaz bi moral temeljiti na strokovno pregledani metodologiji ali interni analizi.

▼ B

11. V primeru predvidenih vrst uporab, za katere je v stolpcu 2 za dopolnilno krmno mešanico dovoljena koncentracija nekaterih krmnih dodatkov, ki je več kot 100 krat večja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici, koncentracija navedenih krmnih dodatkov ne sme biti več kot 500 krat večja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici, razen v primeru bolusov iz točke 10. Z vključitvijo take dopolnilne krmne mešanice v prehrano živali se zagotavlja, da je vnos pri teh živalih skladen z določeno najvišjo vsebnostjo v popolni krmni mešanici.

DEL B

Seznam predvidenih vrst uporabe

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti (GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje (GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
10	„Pomoč delovanju ledvic v primeru kronične ledvične insuficience (1)“	Visokokakovostne beljakovine in fosfor ≤ 5 g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (2) ter ≤ 220 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (2)	Psi	— Viri beljakovin — Kalcij — Fosfor — Kalij — Natrij — Esencialne maščobne kisline (če so dodane)	Na začetku do 6 mesecev (3)	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Priporočena prebavljivost beljakovin: najmanj 85 %. 3. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ 4. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“
		Zmanjšana absorpcija fosforja zaradi dodanega lantanovega karbonata oktahidrata	Odrasli psi	— Viri beljakovin — Kalcij — Fosfor — Kalij — Natrij — Esencialne maščobne kisline (če so dodane) — Lantanov karbonat oktahidrat	Na začetku do 6 mesecev (3)	1. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ 2. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“
		Visokokakovostne beljakovine in fosfor $\leq 6,5$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (2) ter ≤ 320 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (2)	Mačke	— Viri beljakovin — Kalcij — Fosfor — Kalij — Natrij — Esencialne maščobne kisline (če so dodane)	Na začetku do 6 mesecev (3)	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Priporočena prebavljivost beljakovin: najmanj 85 %. 3. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
						4. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“
		Zmanjšana absorpcija fosforja zaradi dodanega lantanovega karbonata oktahidrata	Odrasle mačke	— Viri beljakovin — Kalcij — Fosfor — Kalij — Natrij — Esencialne maščobne kisline (če so dodane) — Lantanov karbonat oktahidrat	Na začetku do 6 mesecev ⁽³⁾	1. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ 2. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“
		Velika kaloričnost z več kot 8,8 MJ/kg krme z vsebnostjo vlage 12 % Lahko prebavljivi in zelo okusni viri škroba Omejena raven beljakovin: ≤ 106 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % Raven natrija: 2 g/100 kg telesne teže dnevno Visoka raven vsote eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline ≥ 0,2 g na kg telesne teže ^{0,75} dnevno	Enoprsti koptarji	— Viri beljakovin in energije — Kalcij — Fosfor — Kalij — Magnezij — Natrij — Vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline	Na začetku do 6 mesecev Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja	1. Krma se daje v promet v obliki dopolnilne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ — Dopolnilna krmna mešanica se ne sme uporabljati v primeru hipernatriemije in hiperkloremije. — Dopolnilna krmna mešanica bi morala zadovoljiti vsaj 10 do 20 % dnevnih energijskih potreb (približno 0,05 do 0,1 MJ/kg telesne teže^{0,75} dnevno) 3. Obrok bi moral zagotoviti > 0,62 MJ energije/kg telesne teže ^{0,75} dnevno

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
						4. Obrok ne bi smel preseči 50 mg kalcija/kg suhe snovi/dnevno 5. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“
11	Zmanjšanje nastanka oksalatnih kamnov	Nizka raven kalcija, nizka raven vitamina D in lastnosti alkalizacije urina	Psi in mačke	— Fosfor — Kalcij — Natrij — Magnezij — Kalij — Kloridi — Žveplo — Vitamin D (skupaj) — Hidroksiprolin — Snovi, ki alkalizirajo urin	Do 6 mesecev	Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
12	Uravnavanje dovajanja glukoze (Diabetes mellitus)	Skupaj sladkorji (mono- in disaharidi) ≤ 62 g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi in mačke	— Viri ogljikovih hidratov — Po potrebi obdelani ogljikovi hidrati — Škrob — Skupaj sladkorji — Fruktaza (če je dodana) — Esencialne maščobne kisline (če so dodane) — Viri maščobnih kislin s kratko in srednjo verigo (če so dodane)	Na začetku do 6 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: — „Nizka raven mono- in disaharidov.“ — „Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
13	Zmanjšanje intolerance za sestavine in hranilne snovi ⁽⁴⁾	Izbrano in omejeno število virov beljakovin in/ali viri hidroliziranih beljakovin in/ali izbrani viri ogljikovih hidratov	Psi in mačke	— Viri beljakovin in po potrebi način obdelave (če so dodane) — Viri ogljikovih hidratov in po potrebi način obdelave (če so dodani) — Esencialne maščobne kisline (če so dodane)	3 do 8 tednov: če izginejo znaki intolerance, se ta krma na začetku lahko uporablja do enega leta	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Priporoča se omejitev števila glavnih virov beljakovin na 3. 3. Pri označevanju se navede: — ustrezna kombinacija osnovnih prehranskih značilnosti, kakor je primerno, — „Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
14	Zmanjšanje nastanka cističnih kamnov	Lastnosti alkalizacije urina in ≤ 160 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ ali Beljakovine, izbrane zaradi omejene vsebnosti cistina in cisteina (npr. kazein, beljakovina graha, sojine beljakovine) ter ≤ 220 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi	— Žveplove aminokisline (skupaj) — Viri beljakovin — Natrij — Kalij — Kloridi — Snovi, ki alkalizirajo urin (če so dodane)	Na začetku do 6 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“ 3. Pri označevanju se navede: — „Lastnosti alkalizacije urina in nizka raven beljakovin“ ali „Nizka raven izbranih beljakovin“, kakor je primerno. — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ 4. Za presojo veterinarja ali nutricionista: Lastnosti alkalizacije pomenijo, da bi se prehrana morala oblikovati tako, da se doseže pH urina ≥ 7.

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
15	Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje ⁽⁵⁾	Lahko prebavljive sestavine s kaloričnostjo $\geq 3\,520$ kcal in ≥ 250 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi	— Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave — Energijska vrednost	Do vzpostavitve prvotnega stanja	1. Priporočljiva očitna prebavljivost suhe snovi ≥ 80 % ali organske snovi ≥ 85 %. 2. Če se posebej zahteva dajanje krme po sondi, se na pakiranju, vsebniku ali oznaki navede: „Uporaba pod nadzorom veterinarja.“ 3. Pri označevanju se lahko navedejo posebne okoliščine, za katere je namenjena dietetična krma. 4. Pri označevanju se navede: „Visoka kaloričnost, visoka koncentracija bistvenih hranilnih snovi in lahko prebavljive sestavine.“
		Lahko prebavljive sestavine s kaloričnostjo $\geq 3\,520$ kcal in ≥ 270 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Mačke			
16	Zmanjšanje nastanka uratnih kamnov	≤ 130 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ ali ≤ 220 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ in izbrani viri beljakovin	Psi	— Viri beljakovin	Do 6 mesecev, vendar dosmrtna uporaba v primeru trajnih motenj v presnovi sečne kisline	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri izbiri vira beljakovin je treba upoštevati kakovost beljakovin in raven purinov. Primeri izbranih virov beljakovin visoke kakovosti z nizko ravniyo purinov zajemajo jajca, kazein, sojine beljakovine in koruzni gluten. 3. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“ 4. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
						— „Nizka raven beljakovin“ ali „Omejena raven beljakovin in izbranih virov beljakovin“, kakor je primerno.
		≤ 317 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Mačke			- Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. - Pri izbiri vira beljakovin je treba upoštevati kakovost beljakovin in raven purinov. Primeri izbranih virov beljakovin visoke kakovosti z nizko ravniyo purinov zajemajo jajca, kazein, sojine beljakovine in koruzni gluten. - Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ — „Omejena raven beljakovin.“ - V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“
17	Razkroj struvinskih kamnov ⁽⁶⁾	Lastnosti podzasičevanja urina ⁽⁷⁾ za struvit in/ali lastnosti zakisljevanja urina ⁽⁸⁾ in ≤ 1,8 g magnezija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi in mačke	— Fosfor — Kalcij — Natrij — Magnezij — Kalij — Klorid — Žveplo	5 do 12 tednov	- Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. - Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ — „Lastnosti podzasičevanja urina za struvit in/ali lastnosti zakisljevanja urina“

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
						3. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“ 4. Deklaracija o skladnosti, ki podpira lastnosti podzasičevanja in/ali zakisljevanja prehrane, se na zahtevo da na voljo ustreznim pristojnim organom.
18	Zmanjšanje ponovnega nastanka stru- tnih kamnov ⁽⁶⁾	Popolna krmna mešanica z lastnostmi podzasičevanja ⁽⁷⁾ ali metastabilizacije urina ⁽⁹⁾ za strunit in/ali prehrana z lastnostmi zakisljevanja urina ⁽⁸⁾ in ≤ 1,8 g magnezija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi in mačke	— Fosfor — Kalcij — Natrij — Magnezij — Kalij — Klorid — Žveplo	Na začetku do 6 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ — „Lastnosti podzasičevanja ali metastabilizacije urina za strunit in/ali lastnosti zakisljevanja urina.“ 3. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“ 4. Deklaracija o skladnosti, ki podpira lastnosti podzasičevanja ali metastabilizacije in/ali zakisljevanja prehrane, se na zahtevo da na voljo ustreznim pristojnim organom.

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
19	Izravnavna za slabo prebavo ⁽¹⁰⁾	Lahko prebavljiva prehrana Očitna prebavljivost — krme z nizko vsebnostjo vlaknin (≤ 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾): surove beljakovine ≥ 85 % surove maščobe ≥ 90 % ali — krme s povečano vsebnostjo vlaknin (> 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾): surove beljakovine ≥ 80 % surove maščobe ≥ 80 %	Psi in mačke	— Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave	Na začetku do 12 tednov ter vse življenje v primeru kronične pankreasne insuficience	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: — „Lahko prebavljiva krma.“ — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
20	Zmanjšanje motenj absorpcije v črevesju	Lahko prebavljiva prehrana Očitna prebavljivost — krme z nizko vsebnostjo vlaknin (≤ 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾): surove beljakovine ≥ 85 % surove maščobe ≥ 90 % ali — krme s povečano vsebnostjo vlaknin (> 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾): surove beljakovine ≥ 80 % surove maščobe ≥ 80 %	Psi in mačke	— Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave — Natrij — Kalij	Do 12 tednov	Pri označevanju se navede: — „Lahko prebavljiva krma s povečano vsebnostjo natrija in kalija.“ — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
		in ≥ 1,8 g natrija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ in ≥ 5 g kalija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾				
21	Zmanjšanje akutnih motenj absorpcije v črevesju	Zvišana raven elektrolitov: — natrij ≥ 1,8 % — kalij: ≥ 0,6 % in Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati: — ≥ 32 %	Psi in mačke	— Natrij — Kalij — Viri ogljikovih hidratov	1–7 dni	1. Krma se daje v promet v obliki dopolnilne krmne mešanice 2. Pri označevanju se navede: — „V obdobju akutne diareje ter okrevanja po bolezni.“ — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ 3. V primeru trdne krme bi bilo treba priporočen razpon elektrolitov izračunati na podlagi običajnega dnevnega prostovoljnega vnosa vode.
22	Podpora presnovi lipidov v primeru hiperlipidemije	≤ 110 g maščob ⁽¹¹⁾ /kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽¹²⁾	Psi in mačke	— Surove maščobe	Na začetku do 2 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ — „Nizka raven maščob.“

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
23	Podpora delovanju jeter v primeru kronične jetrne insuficience	„Zmerna raven beljakovin.“ ≤ 279 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ za pse ≤ 370 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ za mačke in izbrani viri beljakovin in priporočena prebavljivost prehranskih beljakovin ≥ 85 %	Psi in mačke	— Viri beljakovin — Baker (skupaj) — Natrij	Na začetku do 4 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Primeri izbranih virov beljakovin na osnovi lahke prebavljivosti: mlečne beljakovine (sirotka, kazein, mleko, skuta), druge živalske beljakovine (jajca, perutnina) in rastlinske beljakovine (soja). 3. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“ 4. Pri označevanju se navede: — „Zmerna raven beljakovin, izbranih in lahko prebavljivih.“ — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
		Nizka raven visokokakovostnih beljakovin in lahko prebavljivi ogljikovi hidrati	Enoprsti kopitarji	— Viri beljakovin in vlaknin — Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati in po potrebi način njihove obdelave — Metionin — Holin — Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane)	Na začetku do 6 mesecev	1. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ 2. Za način dajanja krme je treba zagotoviti nasvet, vključno z dajanjem večkrat na dan v majhnih obrokih.
24	Pomoč delovanju srca v primeru kronične srčne insuficience	Omejena raven natrija: ≤ 2,6 g natrija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi in mačke	— Magnezij — Kalij — Natrij	Na začetku do 6 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
25	Zmanjšanje prevelike telesne teže	< 3 060 kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽¹³⁾ ali < 560 kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 85 % ⁽¹³⁾	Psi	— Energijska vrednost	Dokler se ne doseže ciljna teža ter po tem, če se zahteva ohranitev ciljne telesne teže	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Za izpolnitev minimalnih zahtev je treba raven hranilnih vrednosti prehrane za zmanjšanje prekomerne telesne teže ustrezno povečati, da se nadomesti omejeni dnevni vnos energije ⁽¹⁴⁾ . 3. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ — „Za začetek prehrane mačk se priporoča prehodno obdobje.“ — „Za učinkovito izgubo telesne teže ali idealno telesno težo se priporočeni dnevni vnos energije ne bi smel preseči.“
		< 3 190 kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽¹³⁾ ali < 580 kcal energije, ki se metabolizira, na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 85 % ⁽¹³⁾	Mačke			
26	Pomoč pri delovanju kože v primeru dermatoze in čezmerne izgube dlake	Linolna kislina $\geq 12,3$ g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline $\geq 2,9$ g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi in mačke	— Linolna kislina — Vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline	Na začetku do 2 mesecev	Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ — „Visoka raven linolne kisline (LA) in vsote eikozapentaenojske kisline (EPA) in dokozaheksaenojske kisline (DHA).“
		Linolna kislina $\geq 18,5$ g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline $\geq 0,39$ g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi			
		Linolna kislina $\geq 18,5$ g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline $\geq 0,09$ g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Mačke			

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
27	Podpora presnovi v sklepih pri osteoartritisu	Skupaj omega-3 maščobne kisline ≥ 29 g/kg in eikozapentaenojska kislina $\geq 3,3$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ in ustrezne ravni vitamina E	Psi	— Omega-3 maščobne kisline (skupaj) — Eikozapentaenojska kislina (skupaj) — Vitamin E (skupaj)	Na začetku do 3 mesecev	Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
		Skupaj omega-3 maščobne kisline $\geq 10,6$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ ter dokozaheksaenojska kislina $\geq 2,5$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾ in povišane vrednosti metionina in mangana Ustrezne ravni vitamina E	Mačke	— Omega-3 maščobne kisline (skupaj) — Dokozaheksaenojska kislina (skupaj) — Metionin (skupaj) — Mangan (skupaj) — Vitamin E (skupaj)		
28	Znižanje bakra v jetrih	Omejena raven bakra: $\leq 8,8$ mg bakra/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi	Baker (skupaj)	Na začetku do 6 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
29	Zmanjšanje ravni joda v krmi v primeru hipertiroze	Omejena raven joda: $\leq 0,26$ mg joda/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Mačke	Jod (skupaj)	Na začetku do 3 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
30	►C1 Opora v stresnih razmerah, ki privede do zmanjšanja povezanih vedenjskih odklonov ◀	1–3 g govejega kazeina, hidrolizirane s tripsinom/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % ⁽²⁾	Psi	Goveji kazein, hidroliziran s tripsinom	Na začetku do 2 mesecev	1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice. 2. Pri označevanju se navede: — „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
50	Podpora pripravam na estrus in razmnoževanje	— Visoka raven selena in minimalna vsebnost vitamina E na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 50 mg za prašiče, 35 mg za zajce in 88 mg za pse, mačke in nerce, minimalna vsebnost vitamina E na žival dnevno: 100 mg za ovce, 300 mg za govedo in 1 100 mg za konje ali — visoke ravni vitamina A in/ali vitamina D in/ali minimalna vsebnost beta karotena 300 mg na žival dnevno Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici	Sesalci	Imena in skupne količine vsakega dodanega elementa v sledovih in vitaminov	— Krave: 2 tedna pred koncem brejosti, dokler ni potrjena naslednja brejost — Svinje: 7 dni pred kotitvijo do 3 dni po njej in 7 dni pred parjenjem do 3 dni po njem — Ostale samice sesalcev: od zadnjega obdobja brejosti, dokler ni potrjena naslednja brejost — Samci: v obdobjih dejavnosti razmnoževanja	1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota. 2. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico. 3. Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
		— Visoke ravni vitamina A in/ali vitamina D ali — visoke ravni selena in/ali cinka in/ali najmanjša vsebnost vitamina E: 40 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %. Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici	Ptice	Imena in skupne količine vsakega dodanega elementa v sledovih in vitaminov	— Za samice: med estrusom — Za samce: v obdobjih dejavnosti razmnoževanja	
51	Podpora obnovi kopit, parkljev in kože	Visoka raven cinka Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje cink v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici	Konji, prežvekovalci in prašiči	— Cink (skupaj) — Metionin (skupaj) — Biotin (če je dodan)	Do 8 tednov	1. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti cinka za popolno krmno mešanico. 2. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena za prežvekovalce. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.
52	Podpora prehranskemu neravnovesju pri spremembi prehrane	Najmanjši vnos z dietetsko krmo: — Selen: 0,1 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali — Cink: 15 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali	Prežvekovalci Prašiči Kunci Perutnina	►C1 Ime in skupna količina nutritivnih dodatkov, če je primerno ◀	2 do 15 dni	1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena za prežvekovalce in prašiče. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota. 2. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
		— Baker: 2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri ovcah ter 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri drugih vrstah in/ali — Vitamin A: 2 000 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali — Vitamin D: 400 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali — Vitamin E: 35 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri perutnini, 10 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prežvekovalcih, 40 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri kuncih in 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prašičih Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, baker, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici				3. Pri označevanju se navedejo smernice o razmerah, v katerih je ustrezna uporaba te krme.
53	Podpora v času odstavitve	Najmanjši vnos z dietetsko krmo: — Selen: 0,1 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali	Sesalci	► C1 Ime in skupna količina nutritivnih dodatkov, če je primerno ◀	Do 4 tedne v času odstavitve	1. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
		— Cink: 15 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali — Baker: 2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri ovcah ter 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri drugih vrstah in/ali — Jod: 0,2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali — Mangan: 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali — Vitamin A: 1 500 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali — Vitamin D: 400 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali — Vitamin E: 100 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri teletih ter 50 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri jagnjetih, kozličkih in pujskih Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, baker, jod, mangan, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici				2. Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
54	Podpora obnovi kože in okončin	— Najmanjši vnos cinkovih spojin z dietetsko krmo ustreza 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in — visoka raven bakra in/ali joda in/ali selen in/ali vitamina B6 in/ali vitamina E in/ali vitamina A in/ali metionina in/ali cistina in/ali najmanjši vnos $\leq 0,4$ mg biotina/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prežvekovalcih Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje cink, baker, jod, selen in vitamin A v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici	Sesalci in perutnina	►C1 Ime in skupna količina nutritivnih dodatkov, če je primerno ◀	— Do 8 tednov — Dopolnilna krmna mešanica za prežvekovalce, ki vsebuje biotin: Do 6 mesecev	1. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico. 2. Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.
55	Ohranjanje vodnega in elektrolitskega ravnotežja za pomoč fiziološki prebavi	— Pretežno elektroliti: natrij, kalij in kloridi — Puferna kapaciteta ⁽¹⁹⁾ v primeru tekoče krme: najmanj 60 mmol na liter napitka, pripravljenega za krmljenje — Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati	Teleta, pujski, jagnjeta, kozlički in žrebata	— Natrij — Kalij — Kloridi — Viri ogljikovih hidratov — Bikarbonati in/ali citrati (če so dodani)	1 do 7 dni	1. Priporočena količina elektrolitov na liter napitka, pripravljenega za krmljenje: natrij: 1,7 g –3,5 g kalij: 0,4 g – 2 g kloridi: 1 g –2,8 g 2. V primeru trdne krme bi bilo treba priporočen razpon elektrolitov izračunati na podlagi običajnega dnevnega prostovoljnega vnosa vode. 3. Pri označevanju se navede: — „V primeru tveganja prebavnih motenj (diareje), pri prebavnih motnjah (diareji) ali med okrevanjem po njih.“

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
						— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ 4. V navodilih za pravilno uporabo se navede: — Priporočeni vnos zmešanega napitka in mleka, če je to primerno. — Če je koncentracija bikarbonatov in/ali citratov višja od 40 mmol na liter napitka, pripravljenega za krmljenje prežvekovalcev: „Sočasnemu krmljenju z mlekom se je treba izogibati pri živalih s sirišnikom (abomasumom).“
56	Zmanjšanje tveganja za tetanijo (hipomagnezemijo)	Visoka raven magnezija, lahko dostopni ogljikovi hidrati, zmeren raven beljakovin in nizka raven kalcija	Prežvekovalci	— Škrob — Sladkorji (skupaj) — Magnezij — Natrij — Kalij	3 do 10 tednov v obdobjih hitre rasti trave	1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota. 2. V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o pripravi uravnoteženega dnevnega obroka, v zvezi z dodajanjem vlaknin in lahko dostopnih energijskih virov. 3. V primeru krme za ovce se pri označevanju navede: „Zlasti za ovce v laktaciji.“
57	Zmanjšanje tveganja za acidozo	Nizka raven lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov in visoka puferna kapaciteta	Prežvekovalci	— Škrob — Sladkorji (skupaj)	do 2 mesecev ⁽¹⁵⁾	1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
						2. V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o pripravi uravnoveženega dnevnega obroka, v zvezi z dodajanjem vlaknin in virov lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov. 3. V primeru krme za krave molznice se pri označevanju navede: „Zlasti za krave z visoko proizvodnjo mleka.“ 4. V primeru krme za prežvekovalce za pitanje se pri označevanju navede: „Zlasti za intenzivno krmljenje ⁽¹⁶⁾.“
58	Zmanjšanje tveganja za nastanek uratnih kamnov	Nizka raven fosforja, magnezija ter lastnosti acidifikacije urina	Prežvekovalci	— Kalcij — Fosfor — Natrij — Magnezij — Kalij — Kloridi — Žveplo — Snovi, ki acidificirajo urin	Do 6 tednov	1. Pri označevanju se navede: „Zlasti za intenzivno krmljene mladih živali.“ 2. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“
59	Dolgoročno zagotavljanje elementov v sledovih in/ali vitaminov za pašne živali	Visoka raven — elementov v sledovih in/ali — vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno opredeljenih snovi s podobnim učinkom Dopolnilna krmna mešanica lahko krmne dodatke v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici	Prežvekovalci s funkcionalnim vampom	— Ime in skupna količina vsakega od dodanih elementov v sledovih, vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno opredeljenih snovi s podobnimi učinki — ►C1 Stopnja dnevnega sproščanja ◄ za vsak element v sledovih in/ali vitamina, če se uporablja bolus — ►C1 Najdaljše obdobje neprekinjenega sproščanja ◄ elementa v sledovih ali vitamina, če se uporablja bolus	Do 12 mesecev	1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota. 2. Pri označevanju krme se navede: — „Hkratnemu dodajanju dodatkov z najvišjo vsebnostjo iz drugih virov poleg tistih, ki so vključeni v bolus, če je relevantno, se je treba izogibati.“

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
						— Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem ali nutricionistom glede: (a) ravnovesja elementov v sledovih v dnevnem obroku; (b) statusa črede glede elementov v sledovih.“

▼M1

60	Zmanjšanje tveganja za mlečno mrzlico in subklinično hipokalcemijo	Nizko razmerje kationi/anioni Za skupni obrok: — minimalno zakisanje s krmo za posebne prehranske namene: 100 mEq/kg suhe snovi — cilj: razpon od negativnih vrednosti DCAD ⁽¹⁷⁾ do < 100 (mEq/kg suhe snovi) vrednosti DCAD ali	Krave molznice	— Kalcij — Fosfor — Magnezij — Natrij — Kalij — Kloridi — Žveplo	Od tri tedne pred telitvijo do telitve	V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Po telitvi prekinite dajanje snovi.“
		Zeolit (natrijev aluminijev silikat) 250–500 g na dan ali		Natrijev aluminijev silikat	Od tri tedne pred telitvijo do telitve	V navodilih za pravilno uporabo se navede: — „Količina krme se omeji z namenom, da se ne preseže dnevnega vnosa 500 g aluminij-natrijevega silikata na žival.“ — Trajanje uporabe se omeji na največ 2 tedna. — „Po telitvi prekinite dajanje snovi.“
		►M2 Zagotavljanje posamičnih krmil, zaščiteneh pred razgradnjo v vampu, bogatih s fitinsko kislino (> 6 %), z vsebnostjo kalcija < 0,2 %, da se doseže najmanj 28 g in največ 32 g dostopnega kalcija na kravo dnevno ali ◀		Kalcij	Od štiri tedne pred telitvijo do telitve	V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Po telitvi prekinite dajanje snovi.“

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
		Visoka raven kalcija v obliki lahko dostopnih virov kalcija: kalcijev klorid in/ali kalcijev sulfat in/ali dikalcijev fosfat in/ali kalcijev karbonat in/ali kalcijev propionat in/ali kalcijev format in/ali „kateri koli drug vir kalcija s podobnim učinkom“ Kalcij, ki ga zagotavlja eden od teh virov ali njihova kombinacija, z najmanj 50 g na kravo dnevno ali		— Kalcij — Viri kalcija	Od prvih znakov kotitve do dva dni po kotitvi	— Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota. — V navodilih za pravilno uporabo se navede število odmerkov in kdaj se snov uporablja – pred telitvijo in po njej. — Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“
		Vnos kalcija v obliki kalcijevega pidolata najmanj 5,5 g na kravo dnevno ali		— Kalcij — Kalcijev pidolat	Od prvih znakov kotitve do dva dni po kotitvi	— Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota. — Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“
		Moka iz rastlin vrste <i>Solanum glaucophyllum</i>, ki omogoča sprostitvev 38–46 µg glikozidov 1,25 dihidroksi-holekalciferola dnevno ali		— Moka iz rastlin vrste <i>Solanum glaucophyllum</i> — Vsebnost glikozidov 1,25 dihidroksi-holekalciferola — Surove vlaknine — Magnezij — Surove maščobe — Škrob — Vitamin D3 (skupaj) kot holekalciferol	Od dva dni pred telitvijo ali prvih znakov kotitve do deset dni po kotitvi	— Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota. — Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
1	2	3	4	5	6	6
		Glikozilirani 1,25-dihidroksiholekalciferol iz izvlečka <i>Solanum glaucophyllum</i> , ki omogoča sprostitev 15–80 µg glikoziliranega 1,25-dihidroksiholekalciferola dnevno.	Krave molznice	— Glikozilirani 1,25-dihidroksiholekalciferol iz izvlečka <i>Solanum glaucophyllum</i> — Vitamin D₃ (skupaj) kot holekalciferol	Eno peroralno dajanje bolusa, ki vsebuje glikozilirani 1,25-dihidroksiholekalciferol iz izvlečka <i>Solanum glaucophyllum</i> , v predporodnem obdobju (od 9 dni pred telitvijo do telitvijo).	1. Glikozilirani 1,25-dihidroksiholekalciferol iz izvlečka <i>Solanum glaucophyllum</i> se daje peroralno enkrat v obliki bolusa, pri čemer je dnevno dajanje: — najmanj 60 g kalcija na kravo v enem tednu pred telitvijo in 84 g na kravo do konca tretjega tedna laktacije; — najmanj 18 g magnezija na kravo v enem tednu pred telitvijo in 26 g na kravo do konca tretjega tedna laktacije. 2. Pri označevanju krme se navede: „Bolus se uporabi le enkrat v predporodnem obdobju od 9 dni pred telitvijo do tik pred telitvijo. Kalcij in magnezij se dajeta dnevno v naslednjih ravneh: — najmanj 60 g kalcija na kravo v enem tednu pred telitvijo in 84 g na kravo do konca tretjega tedna laktacije; — najmanj 18 g magnezija na kravo v enem tednu pred telitvijo in 26 g na kravo do konca tretjega tedna laktacije.“ Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem ali nutricionistom.

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
61	Zmanjšanje tveganja za ketozo ⁽¹⁸⁾	— Najmanjši vnos propan-1,2-diola ali propilen glikola: 250 g dnevno za krave molznice 50 g dnevno za ovce ali koze — Najmanjši vnos propionatov (kalcijevih ali natrijevih soli): 110 g dnevno za krave molznice 22 g dnevno za ovce ali koze — Najmanjši kombinirani vnos propan-1,2-diola in propionatov (kalcijevih ali natrijevih soli), pod naslednjimi pogoji: — kombinacija propan-1,2-diola in propionatov za krave molznice: propionati +0,44 x propan-1,2-diol > 110 g dnevno — kombinacija propan-1,2-diola in propionatov za ovce ali koze: propionati +0,44 x propan-1,2-diol > 22 g dnevno	Krave molznice, ovce in koze	— Propan-1,2-diol, če je dodan — Propionati v obliki natrijevih ali kalcijevih soli, če so dodane	V obdobju od treh tednov pred telitvijo do šest tednov po telitvi za krave molznice V obdobju od šest tednov pred kotitvijo do treh tednov po kotitvi za ovce in koze	1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota. 2. Pri označevanju se navede: „Med vnosom kalcijevih ali natrijevih propionatov ob koncu brejosti je potrebna ocena ravnotežja mineralov v povezavi s tveganjem hipokalcemije po kotitvi.“
62	Zmanjšanje stresne reakcije	— Visoka raven magnezija in/ali — Lahko prebavljive sestavine	Prašiči	— Magnezij — Lahko prebavljive sestavine in po potrebi način njihove obdelave — Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane)	1 do 7 dni	Treba je navesti smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.
63	Zmanjšanje tveganja zaprtja	Sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja	Svinje	Sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja	10 do 14 dni pred prasitvijo in 10 do 14 dni po prasitvi	

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
64	Nadomeščanje nezadostne razpoložljivosti železa po rojstvu	►C1 Visoka raven železovih spojin, dovoljenih v funkcionalni skupini „spojine elementov v sledovih“ kategorije „nutritivni dodatki“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003. ◀ Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje železo v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.	Sesni pujski in teleta	Železo (skupaj)	Po rojstvu do 3 tednov	Navodila za pravilno uporabo zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti železa za popolno krmno mešanico.
65	Izravnava za slabo absorpcijo	Nizka raven nasičenih maščobnih kislin in visoka stopnja vitaminov, topnih v maščobi	Perutnina, razen gosi in golobov	— Odstotek nasičenih maščobnih kislin glede na skupne maščobne kisline — Vitamin A (skupaj) — Vitamin D (skupaj) — Vitamin E (skupaj) — Vitamin K (skupaj)	V prvih dveh tednih po izvalitvi	
66	Zmanjšanje tveganja za sindrom zamaščenih jeter	Nizka energija in visok delež energije, ki se metabolizira, iz lipidov, z visoko ravni polinenasičenih maščobnih kislin	Kokoši nesnice	— Energijska vrednost (izračunana po metodi ES) — Odstotek energije, ki se metabolizira, iz lipidov — Vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin	Do 12 tednov	
67	Podpora pripravi na športne napore in okrevanju po njih	Visoka raven selena in minimalna vsebnost 50 mg vitamina E/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje spojine selena v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici	Enoprsti kopitarji	— Vitamin E (skupaj) — Selen (skupaj)	Do 8 tednov pred športnim naporom – do 4 tedne po športnem naporu	Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti selena za popolno krmno mešanico.

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
68	Izravnava izgube elektrolitov po močnem znojenju	Vsebovati mora natrijev klorid in bi morala vsebovati kalijev klorid Nizka raven magnezija, kalcija in fosforja Vključitev drugih elektrolitnih soli ni obvezna	Enoprsti kopi-tarji	— Natrij — Kloridi — Kalij — Kalcij — Magnezij — Fosfor	Dan, dva ali tri dni po močnem znojenju	1. Navodila za krmljenje morajo biti na voljo v primerih, ko je uporaba te krme primerna 2. Navodila za pravilno uporabo morajo vsebovati navodila za dajanje, ki temeljijo na trajanju in intenzivnosti izvedene aktivnosti ter se nanašajo na formulacijo in prezentacijo krme. 3. Pri označevanju se navede: — „Vedno mora biti na voljo voda.“ — Pri dajanju elektrolitov, ki niso zmešani z vodo (npr. v krmi ali z brizgalko): „Voda mora biti na voljo vsaj 20 minut ali po možnosti eno uro po dajanju.“ 4. Poleg tega je treba zagotoviti smernice za spremljanje naknadnega pitja in če se opazi nezadosten vnos vode, se je treba posvetovati z veterinarjem. 5. Navedejo se lahko navodila glede količine vode (v litrih), ki jo je treba zagotoviti ob krmi ali v obliki elektrolitov po brizgalki.
69	Podpora energijski presnovi in delovanju mišic v primeru rabdomiolize	Škrob in sladkor: ne več kot 20 % razpoložljive energije Surove maščobe: več kot 20 % razpoložljive energije Najmanj 350 IU vitamina E/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %	Enoprsti kopi-tarji	— Škrob — Sladkor — Surove maščobe — Vitamin E (skupaj)	Na začetku najmanj 3 mesece	1. Treba je navesti smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna. 2. V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o uravnoteženem dnevnem obroku in ustreznem dnevnem vnosu.

▼B

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
						3. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“
70	Izravnavna za kronično insuficienco delovanja debelega črevesa	— Vsebnost škroba, ki ga je treba zagotoviti, < 1 g/kg telesne teže/obrok (< 0,5 g/kg telesne teže/obrok v primeru driske) — Žitna zrna, obdelana s hidrotermičnim postopkom, kot so ekstrudiranje, mikronizacija, širitev ali kosmičenje, za izboljšanje prebave škroba v tankem črevesju — Dodaten vnos vitaminov, topnih v vodi, ter ustreznih ravni mineralov/elektrolitov — Dodaten vnos olja, če ni driske	Enoprsti koptarji	— Škrob — Surove maščobe	Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja	- Treba je navesti smernice o — točno določenih primerih, ko je uporaba krme primerna, zlasti o tem, ali je proizvod primeren za uporabo pri živalih z drisko, — velikosti obrokov in vnosu krme. - Navodila za pravilno uporabo se nanašajo, odvisno od vsebnosti olja, na morebitno postopno uporabo in predlagajo spremljanje driske. - Pri označevanju se navede način obdelave žitnih zrn.
71	Izravnavna za kronično insuficienco delovanja tankega črevesa	— Lahko prebavljive vlaknine — Visokokakovostni viri beljakovin in lizin > 4,3 % surovih beljakovin — Skupaj sladkor in škrob do največ 0,5 g/kg telesne teže/obrok — Žitna zrna, obdelana s hidrotermičnim postopkom, kot so ekstrudiranje, mikronizacija, širitev ali kosmičenje, za izboljšanje prebave pred cekumom	Enoprsti koptarji	— Lahko prebavljiva posamična krmila in po potrebi način njihove obdelave — Skupaj sladkor in škrob — Viri beljakovin	Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja	- Treba je navesti smernice o — točno določenih primerih, ko je uporaba krme primerna, — velikosti obrokov in vnosu krme. - Navodila za pravilno uporabo se nanašajo, odvisno od vsebnosti olja, na morebitno postopno uporabo in predlagajo spremljanje driske.

Številka vnosa	Poseben prehranski namen	Osnovne prehranske značilnosti ^(GP1)	Vrsta ali kategorija živali	Deklaracije za označevanje ^(GP2)	Priporočeni rok	Druge določbe
	1	2	3	4	5	6
72	Ustalitev fiziološke prebave	Krmni dodatki iz funkcionalne skupine „stabilizatorji mikroflore“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003 ali, do postopka ponovne odobritve iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003, krmni dodatki iz skupine „mikroorganizmi“	Živalske vrste, za katere je dovoljena uporaba stabilizatorjev mikroflore ali mikroorganizmov	Ime in dodana količina stabilizatorja mikroflore ali mikroorganizma	Do 4 tednov	1. Pri označevanju se navede: „V primeru tveganja prebavnih motenj, pri prebavnih motnjah ali med okrevanjem po njih.“ 2. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upošteva zakonsko določena najvišja vsebnost stabilizatorjev mikroflore/mikroorganizmov za popolno krmno mešanico.

(GP1) Za nadzor količinskih navedb se uporabljajo tolerance iz Priloge IV Uredbe (ES) št. 767/2009.

(GP2) Te deklaracije za označevanje se uporabljajo poleg splošnih zahtev za označevanje iz Uredbe (ES) št. 767/2009.

(1) Po potrebi lahko proizvajalec priporoča uporabo tudi pri začasni ledvični insuficienci.

(2) Na osnovi prehrane z energijsko gostoto suhe snovi v višini 4 000 kcal energije, ki se metabolizira, na kg, izračunane s pomočjo enačbe iz Prehranskih smernic FEDIAF (<http://www.fediac.org/self-regulation/nutrition.html>). Vrednosti se prilagodijo, če energijska gostota odstopa od 4 000 kcal energije, ki se metabolizira, na kg.

(3) Če se krma priporoča za začasno ledvično insuficienco, je priporočeni rok uporabe dva do štiri tedne.

(4) V primeru krme za posebno intoleranco lahko navedba posebne intolerance nadomesti „sestavino in hranljivo snov“.

(5) Pri mačkah se lahko doda sklic na „jetno lipidozo mačk“.

(6) Pri mačkah se lahko doda „obolenje spodnjega urinarnega trakta mačk“ ali „urološki sindrom mačk – FUS“.

(7) Lastnosti podzasičevanja: urin, povezan z lastnostmi razkroja kristalov in kamnov in/ali lastnostmi preprečevanja izločanja in rasti kristalov.

(8) pH urina $\leq 6,5$.

(9) Lastnosti metastabilizacije: urin, povezan z lastnostmi preprečevanja izločanja kristalov.

(10) Doda se lahko „eksokrina pankreasna insuficienca“.

(11) V dnevnem obroku se upoštevajo vsa minimalna priporočila iz Prehranskih smernic FEDIAF (<http://www.fediac.org/self-regulation/nutrition.html>) za vse esencialne maščobne kisline.

(12) Na osnovi prehrane s kaloričnostjo suhe snovi v višini 3 500 kcal energije, ki se metabolizira/na kg, izračunane s pomočjo enačbe iz Prehranskih smernic FEDIAF (<http://www.fediac.org/self-regulation/nutrition.html>). Vrednosti se prilagodijo, če kaloričnost odstopa od 3 500 kcal energije, ki se metabolizira/kg.

(13) Energija, ki se metabolizira/kg, izračunana z enačbo iz Prehranskih smernic za popolno in dopolnilno krmo za mačke in pse (Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, FEDIAF (2019)).

(14) Prehranske smernice za popolno in dopolnilno krmo za mačke in pse (Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, FEDIAF (2019)).

(15) V primeru krme za krave molznice. „največ dva meseca po začetku laktacije“.

(16) Navedite kategorijo zadevnih prežvekovalcev.

(17) $DCAD \text{ (mEq/kg suhe snovi)} = (Na + K) - (Cl + S)$.

(18) Izraz „ketoza“ se lahko nadomesti z izrazom „acetonemija“, oseba, ki je odgovorna za označevanje, pa lahko priporoči tudi uporabo pri okrevanju po ketozi.

(19) Izračunano z metodo razlike močnih ionov (vrednost SID): SID je razlika med vsoto koncentracij močnih kationov in močnih anionov; $[SID] = [mmol Na^+/l] + [mmol K^+/l] + [mmol Ca^{++}/l] + [mmol Mg^{++}/l] - [mmol Cl^-/l] - [mmol drugih močnih anionov/l]$.

(20) $DCAD \text{ (kationsko-anionska razlika v obrokih; izražena v mEq/kg suhe snovi)} = (Na + K) - (Cl + S)$.