

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/354,

4. märts 2020,

millega kehtestatakse erisööda kasutusotstarvete loetelu ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/38/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 10 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

- (1) Sööda turuleviimist ja kasutamist reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 767/2009. Kõnealuse määruse artikli 9 kohaselt võib erisööta turustada üksnes siis, kui selle kasutusotstarve on esitatud erisööda kasutusotstarvete loetelus, mis on kehtestatud sama määruse artikli 10 kohaselt.
- (2) Komisjoni direktiiviga 2008/38/EÜ ⁽²⁾ on kehtestatud eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri.
- (3) Direktiivi 2008/38/EÜ I lisa A osas on kehtestatud erisööta käsitlevad üldsätted. Pidades silmas teaduse ja tehnika arengut ning määrusega (EÜ) nr 767/2009 kehtestatud märgistamisnõudeid, tuleks kõnealused üldsätted läbi vaadata.
- (4) Määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklitega 11–17 on kehtestatud sööda turuleviimise, sealhulgas märgistamise uued põhimõtted ja eeskirjad. Sellest tulenevalt on direktiivi 2008/38/EÜ I lisa B osas esitatud eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekirja mitu kannet aegunud, eelkõige seetõttu, et veerus „Põhilised toiteomadused“ esitatud kirjeldused on puudulikud ja liiga üldised. Selliste kannete puhul on kontrolliasutustel väga raske kontrollida määruse (EÜ) nr 767/2009 sätetele vastavust, sealhulgas seda, kas konkreetse sööda koostis vastab kavandatud erisöötmise eesmärgile.
- (5) Komisjon on saanud mitu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 10 kohaselt esitatud taotlust, milles palutakse muuta erisööda mitme kasutusotstarbega seonduvaid aegunud tingimusi. Need aegunud kanded, mille kohta ei ole taotlust esitatud või mille puhul taotlus tagasi võeti, tuleks välja jätta.

⁽¹⁾ ELT L 229, 1.9.2009, lk 1.

⁽²⁾ Komisjoni 5. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (ELT L 62, 6.3.2008, lk 9).

- (6) Direktiivi 2008/38/EÜ I lisa B osas loetletud erisööda muude kasutusotstarvete puhul on vaja muuta sätteid, milles käsitletakse põhilisi toiteomadusi ja märgistamisel esitatavaid andmeid, et kohandada neid sätteid teaduse ja tehnika arenguga ning muuta sätted paremini jõustatavaks ja selgemaks.
- (7) Lisaks on komisjon saanud vastavalt määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklile 10 esitatud taotlused lisada erisööda kasutusotstarvete loetellu konkreetseid kasutusotstarbeid, mis aitavad toetada energiaainevahetust ja lihaste toimimist rabadmüüli korral ning mis pakuvad tuge stressirohketes olukordades, aidates vähendada stressist tulenevat käitumist.
- (8) Komisjon on teinud liikmesriikidele kättesaadavaks kõik taotlused koos toimikutega.
- (9) Alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee (edaspidi „komitee“) tões pärast kõnealuste taotluste juurde kuuluvate toimikute hindamist, et asjaomase sööda täpne koostis vastab asjaomasele kavandatud erisöötmise eesmärgile ja et söödal ei ole kahjulikku mõju loomade või inimeste tervisele, keskkonnale ega loomade heaolule.
- (10) Eelnevat arvesse võttes tuleks erisööda kasutusotstarvete loetelu ajakohastada.
- (11) Kuna ohutusnõuded ei eelda uute üldsätete ja erisööda kasutusotstarvete ajakohastatud loetelu viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekumeetmed, et vältida tarbetuid häireid kaubanduses ja ettevõtjatele tekitatavat asjatut halduskoormust.
- (12) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks direktiiv 2008/38/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määrusega, mis ei sisalda elemente, mis nõuaksid nende ülevõtmist liikmesriikide siseriiklikku õigusesse. Kõnealuse direktiivi viimased muudatused on juba mitmel korral tehtud määruste kaudu, sest siis puudub vajadus asjaomaste sätete ülevõtmiseks siseriiklikku õigusesse. Lisaks sellele on erisööda turuleviimise ja kasutamise üldnõuded sätestatud määruses (EÜ) nr 767/2009.
- (13) Selleks et liikmesriigid saaksid teha vajalikke kohandusi, tuleks enne käesoleva määruse kohaldama hakkamist ette näha piisav ajavahemik.
- (14) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erisööta määruse (EÜ) nr 767/2009 tähenduses võib turustada üksnes juhul, kui:

- see vastab käesoleva määruse lisa A osas esitatud erisööta käsitlevatele üldnõuetele ja
- selle kasutusotstarve on lisatud käesoleva määruse lisa B ossa ning vastava kande sätted on täidetud.

Artikkel 2

Erandina artiklist 1 võib jätkuvalt turule lasta erisööta, mis vastab direktiivi 2008/38/EÜ sätetele, tingimusel et komisjonile on vastavalt määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklile 10 esitatud kõnealuse direktiiviga ettenähtud kavandatud kasutuse taotlus enne 25. märtsi 2021 ning kuni komisjon teeb vastava taotluse kohta otsuse.

Artikkel 3

Erisööta, mis on märgistatud enne 25. märtsi 2022 kooskõlas enne 25. märtsi 2020 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

Artikkel 4

Direktiiv 2008/38/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 25. detsembrist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 2020

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

A OSA

Erisööta käsitlevad üldnõuded

1. Kui B osa 2. veerus on sama erisöötmise eesmärgi kohta märgitud mitu põhiliste toiteomaduste rühma ning need on eraldatud sõnadega „ja/või“, võib tootja B osa 1. veerus määratletud erisöötmise eesmärgil kasutada kas üht või mõlemat kõnealust põhiomaduste rühma. Mõlema variandi puhul on märgistamisel esitatavad andmed esitatud B osa 4. veerus.
2. Kui B osa 2. veerus nimetatud põhilisel toiteomadusel on arvuline väärtus, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 17 lõike 2 sätteid ja kõnealuse määruse IV lisas määratletud lubatud erinevusi. Kui kõnealuses lisas ei ole asjaomase märgistuselemendi jaoks lubatud erinevust kindlaks määratud, lubatakse tehnilist kõrvalekallet $\pm 15\%$.
3. Kui söödalisandit on nimetatud B osa 2. või 4. veerus, kohaldatakse söödalisandi suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003⁽¹⁾ kohaseid kasutamise lubamist käsitlevaid sätteid ning söödalisandi kasutamine peab olema vastavuses konkreetse põhilise toiteomadusega.
4. Kui B lisa 4. veerus nõutakse söödalisandina lubatud aine märkimist ning kõnealune veerg sisaldab märget „kokku“, tuleb pealkirja „analüütilised koostisosad“ all esitada aine kogusisaldus.
5. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/48/EÜ⁽²⁾ kohaldamist, peavad B osa 4. veeru kohaselt esitatavad andmed olema kvantitatiivsed.
6. B osa 5. veerus märgitud soovitatav kasutusaeg tähistab ajavahemikku, mille jooksul peaks söötmise eesmärk tavaliselt saavutatud olema. Kindlaksmääratud piirides võivad tootjad viidata täpsematele kasutusaegadele.
7. Kui erisööt on mõeldud mitme söötmise eesmärgi saavutamiseks, peab see vastama kõigi asjaomaste B osa kannete nõuetele.
8. Erisöödana kasutatava täiendsööda puhul tuleb kasutusjuhendis märkida juhised tasakaalus päevaratsiooni koostise kohta.
9. Kui erisööda asjakohaseks kasutusviisiks on individuaalne suukaudne manustamine booli kujul, siis tuleb see märkida vastava sööda veerus „Muud sätted“. Selline sööt peab sisaldama üksnes söödamaterjali ja söödalisandeid (kaasa arvatud võimalik kattekiht), kui asjakohases kandes ei ole sätestatud teisiti. Soovitavalt manustab individuaalseks suukaudseks manustamiseks mõeldud sööta veterinaararst või muu pädev isik.
10. Kui erisööt on viidud turule booli kujul ning tegemist on söödamaterjali või täiendsöödaga, mis on ette nähtud individuaalseks suukaudseks manustamiseks, mille puhul on toimeainete imendumine aeglane (st üle 24 tunni), näidatakse sööda märgistusel (kui seda kasutatakse) iga söödalisandi puhul, mille maksimaalne sisaldus täissöödas on kindlaks määratud, nende ainete booli kaudu eraldumise maksimaalne periood ja iga sellise söödalisandi päevas eralduv kogus. Booli turule viival söödakäitlejal peavad olema tõendid, et iga päev seedetraktis eralduva söödalisandi kogus ei ületa söödalisandi puhul kehtestatud maksimaalset sisaldust (kui see on kohaldatav) kg täissööda kohta kogu söötmiss perioodi jooksul (aeglustatud imendumise mõju). Need tõendid peavad olema koostatud vastastikuse eksperdi hinnangu meetodil või põhinema ettevõttesisel analüüsil.
11. Selliste kavandatud kasutuste puhul, kus 2. veerus esitatud teatavate söödalisandite sisaldus on täiendsööda puhul 100 korda suurem kui lubatud asjakohane kindlaksmääratud sisaldus täissöödas, ei tohi selliste söödalisandite sisaldus olla üle 500 korra suurem asjakohasest kindlaksmääratud sisaldusest täissöödas, välja arvatud juhul, kui kasutatakse booli, nagu on viidatud punktis 10. Sellise täiendsööda lisamine looma söödaratsiooni peab tagama, et sööda kogus, mida loom omastab, on vastavuses täissööda puhul kindlaksmääratud maksimaalse sisaldusega.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003, , loomasööta kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29).

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, 30.4.2004, lk 45).

Kasutusotstarvete loetelu

Kande number	Erisõotmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
10	Neerutalitluse toetamine kroonilise neerupudulikkuse korral ⁽¹⁾	Kõrge kvaliteediga valgud ja fosfor ≤ 5 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾ , ja toorvalgud ≤ 220 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Koerad	— Valguallikas/-allikad — Kaltsium — Fosfor — Kaalium — Naatrium — Asendamatud rasvhapped (kui on lisatud)	Esialgu kuni 6 kuud ⁽³⁾	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Soovitav valkude seeduvus: vähemalt 85 %. 3. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist või kasutaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ 4. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“.
		Fosfori väiksem imendumine lisatud lantaankarbonaatoktahüdraadi tõttu	Täiskasvanud koerad	— Valguallikas/-allikad — Kaltsium — Fosfor — Kaalium — Naatrium — Asendamatud rasvhapped (kui on lisatud) — Lantaankarbonaatoktahüdraat	Esialgu kuni kuus kuud ⁽³⁾	1. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist või kasutaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ 2. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“.
		Kõrge kvaliteediga valgud ja fosfor $\leq 6,5$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾ , ja toorvalgud ≤ 320 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Kassid	— Valguallikas/-allikad — Kaltsium — Fosfor — Kaalium — Naatrium — Asendamatud rasvhapped (kui on lisatud)	Esialgu kuni kuus kuud ⁽³⁾	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Soovitav valkude seeduvus: vähemalt 85 %. 3. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist või kasutaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ 4. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“.
		Fosfori väiksem imendumine lisatud lantaankarbonaatoktahüdraadi tõttu	Täiskasvanud kassid	— Valguallikas/-allikad — Kaltsium — Fosfor — Kaalium — Naatrium	Esialgu kuni kuus kuud ⁽³⁾	1. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist või kasutaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ 2. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“.

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
				— Asendamatud rasvhapped (kui on lisatud) — Lantaankarbonaatoktahüdraat		
		Kõrge energiasisaldusega (üle 8,8 MJ/kg) sööt, mille niiskusesisaldus on 12 %. Kergesti seeduvad ja meeldivamaitse- lised tärklise allikad. Piiratud valgusisaldus: ≤ 106 g toor- valku ühes kg-s söödas, mille niisku- sesisaldus on 12 %. Naatriumisisaldus: 2 g naatriumi 100 kehamassi kg kohta päevas. Eikosapentaeenhappe ja dokosahek- saeenhappe sisaldus kokku ≥ 0,2 g ke- hamassi ^{0,75} kg kohta päevas.	Hobuslased	— Valgud ja energiaalli- kad — Kaltsium — Fosfor — Kaalium — Magneesium — Naatrium — Eikosapentaeenhappe ja dokosahek- saeenhappe sisaldus kokku	Esialgu kuni 6 kuud. Pikaajaliselt või probleemse olukorra lahene- miseni	1. Sööta turustatakse täiendsöödana. 2. Märgitusel märgitakse: — „Enne kasutamist või kasutusa- ja pikendamist soovatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ — Täiendsööta ei tohi kasutada hüpernatreemia ja hüperkloreemia korral. — Täiendsööt peaks katma vähemalt 10–20 % päevasest energiavajadusest (ligikaudu 0,05–0,1 MJ kehamassi ^{0,75} kg kohta päevas). 3. Annus peab tagama energiavaru vähemalt 0,62 MJ kehamassi ^{0,75} kg kohta päevas. 4. Annus ei tohiks sisaldada üle 50 mg kaltsiumi kuiv- aine kg kohta päevas. 5. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“.
11	Oksalaadikivide tekkimisohtu vä- hendamine	Väike kaltsiumisisaldus, väike D-vi- tamiini sisaldus ja uriini leelistavad omadused	Koerad ja kassid	— Fosfor — Kaltsium — Naatrium — Magneesium — Kaalium — Kloriidid — Väävel — D-vitamiin (kokku) — Hüdroksüproliin — Uriini leelistavad ained	Kuni 6 kuud	Märgitusel märgitakse: „Enne kasutamist soovatakse konsulteerida veteri- naararstiga.“

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
12	Glükoosivaru reguleerimine (melliitdiabeet – Diabetes mellitus)	Suhkrud (mono- ja disahhariidid) kokku ≤ 62 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Koerad ja kassid	— Süsivesikuallikas/-allikad — Vajaduse korral süsivesikute töötlemisviis — Tärglis — Suhkrud kokku — Fruktoos (kui on lisatud) — Asendamatud rasvhapped (kui on lisatud) — Lühi- ja keskahelaliste rasvhapete allikas/allikad (kui on lisatud)	Esialgu kuni 6 kuud	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Märgistusel märgitakse: — „Väike mono- ja disahhariidide sisaldus“. — „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“
13	Koostisosa ja toitaine talumise vähendamine ⁽⁴⁾	Valitud valguallikad ja piiratud arv valguallikaid ja/või hüdrolyüsitud valguallikas/-allikad ja/või valitud süsivesikute allikas/allikad	Koerad ja kassid	— Valguallikad ja vajaduse korral nende töötlemisviis (kui valku on lisatud) — Süsivesikute allikas/allikad ja vajaduse korral nende töötlemisviis (kui süsivesikuid on lisatud) — Asendamatud rasvhapped (kui on lisatud)	3–8 nädalat: kui talumise tundemärgid kaovad, võib seda toitu esialgu kasutada kuni ühe aasta	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Soovitav on kasutada mitte rohkem kui kolme peamist valguallikat. 3. Märgistusel märgitakse: — Oluliste toiteomaduste sobiv kombinatsioon, nagu on ette nähtud. — „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“
14	Tsüstiinikivide tekkimiseohtu vähendamine	Uriini leelistavad omadused ja toorvalgu sisaldus ≤ 160 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾ või Piiratud tsüstiini ja tsüsteiinkivi sisaldust soodustavad valgud (nt kaseiin, hernevalk, sojavalk) ja toorvalk ≤ 220 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Koerad	— Väävlit sisaldavad aminohapped (kokku) — Valguallikad — Naatrium — Kaalium — Kloriidid — Uriini leelistavad ained (kui on lisatud)	Esialgu kuni 6 kuud	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“. 3. Märgistusel märgitakse: — „Uriini leelistavad omadused ja väike valgusisaldus“ või „Valitud valkude vähene sisaldus“ (vastavalt vajadusele). — „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
						4. Veterinaararsti või toitumisspetsialisti jaoks: „Leelistavate omaduste all peetakse silmas seda, et söödanormid peaksid olema koostatud selliselt, et uriini pH-tase oleks vähemalt 7.“
15	Toiduga kosutamine, konvalesents (³)	Kergesti seeduvad koostisosad energiasaldusega $\geq 3\,520$ kcal, toorvalgusisaldusega ≥ 250 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % (²)	Koerad	— Kergesti seeduvate koostisosade allikad, vajaduse korral ka nende töötlemisviis — Energeetiline väärtus	Kuni looma kosumiseni	1. Soovitav nähtav seeduvus kuivaine puhul ≥ 80 % või orgaanilise aine puhul ≥ 85 %. 2. Tuubist manustatava lemmikloomatoidu puhul tuleb pakendile, tuubile või märgistusele märkida: „Manustatakse veterinaarjärelevalve all.“ 3. Märgistusel võib viidata eriolukorrale (eriolukordadele), milleks konkreetne lemmikloomatoit on mõeldud. 4. Märgistusel märgitakse: „Suur energiasisaldus, suur oluliste toitainete ja kergesti seeduvate koostisosade kontsentratsioon.“
		Kergesti seeduvad koostisosad energiasaldusega $\geq 3\,520$ kcal, toorvalgusisaldusega ≥ 270 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % (²)	Kassid			
16	Uraadikivide tekkimisohtu vähendamine	Toorvalgusisaldusega ≤ 130 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % (²), või toorvalgusisaldusega ≤ 220 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % (²), ning valitud valguallikad	Koerad	— Valguallikas/-allikad	Kuni 6 kuud, ent kusi-happe ainevahetuse pöördumatute häirete korral kogu elu	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Valguallika valikul tuleb arvesse võtta valgu kvaliteeti ja puriinisaldust. Valitud kvaliteetsed ja vähesed puriinisaldusega valguallikad on näiteks munad, kaseiin, sojavalgud ja maisigluteen. 3. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“. 4. Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ — „Väike valgusisaldus“ või „Piiratud valgusisaldus ja valitud valguallikad“ (vastavalt vajadusele).

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		Toorvalgusisaldusega ≤ 317 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Kassid			- Sööta turustatakse täissöödana. - Valguallika valikul tuleb arvesse võtta valgu kvaliteeti ja puriinisaldust. Valitud kvaliteetsed ja vähehese puriinisaldusega valguallikad on näiteks munad, kaseiin, sojavalgud ja maisigluteen. - Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ „Piiratud valgusisaldus“. - Kasutusjuhendis märgitakse: „Vesi peab olema alati kättesaadav“.
17	Struviidikivide lahustamine ⁽⁶⁾	Struviidi korral uriini küllastuvust vähendavad ⁽⁷⁾ omadused ja/või uriini happelisust soodustavad omadused ⁽⁸⁾ ning magneesium $\leq 1,8$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Koerad ja kassid	— Fosfor — Kaltsium — Naatrium — Magneesium — Kaalium — Kloriid — Väävel	5–12 nädalat	- Sööta turustatakse täissöödana. - Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ „Struviidi korral uriini küllastuvust vähendavad omadused“ ja/või „Uriini happelisust soodustavad omadused“. - Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav.“ - Kui asjakohane pädev asutus seda nõuab, tuleb kättesaadavaks teha vastavusdeklaratsioon, milles kinnitatakse uriini küllastuvust vähendavate ja happelisust soodustavate omaduste esinemist vastava dieedi korral.
18	Struviidikivi taastekkimisohu vähendamine ⁽⁶⁾	Struviidi korral uriini küllastuvust vähendavate ⁽⁷⁾ omaduste või metastabiliseerivate omadustega ⁽⁹⁾ täissööt ja/või uriini happelisust soodustav dieet ⁽⁸⁾ ning	Koerad ja kassid	— Fosfor — Kaltsium — Naatrium — Magneesium — Kaalium — Kloriid — Väävel	Esialgu kuni 6 kuud	- Sööta turustatakse täissöödana. - Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ „Struviidi korral uriini küllastuvust vähendavad omadused või metastabiliseerivad omadused“ ja/või „Uriini happelisust soodustavad omadused“.

Kande number	Erisõotmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		magneesium $\leq 1,8$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾				3. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“. 4. Kui asjakohane pädev asutus seda nõuab, tuleb kättesaadavaks teha vastavusdeklaratsioon, milles kinnitatakse uriini küllastuvust vähendavate või metastabiliseerivate ja/või happelisust soodustavate omaduste esinemist vastava dieedi korral.
19	Seedehäirete vähendamine ⁽¹⁰⁾	Kergesti seeduv dieet: parem seeduvus — väikse kiudainesisalduse korral (toorvalgusisaldus ≤ 44 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾): toorvalk ≥ 85 % toorrasv ≥ 90 % või — kiudainerikas sööt (toorvalgusisaldus > 44 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾): toorvalk ≥ 80 % toorrasv ≥ 80 %	Koerad ja kassid	— Kergesti seeduvate koostisosade allikad, vajaduse korral ka nende töötlemisviis	Esialgu kuni 12 nädalat, kroonilise kõhunäärme-puudulikkuse korral kogu elu	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Märgistusel märgitakse: — „Kergesti seeduv dieet“ — „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“
20	Soolestiku imendumishäirete vähendamine	Kergesti seeduv dieet: parem seeduvus — väikse kiudainesisalduse korral (toorvalgusisaldus ≤ 44 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾): toorvalk ≥ 85 % toorrasv ≥ 90 % või — kiudainerikas sööt (toorvalgusisaldus > 44 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾): toorvalk ≥ 80 % toorrasv ≥ 80 %	Koerad ja kassid	— Kergesti seeduvate koostisosade allikad, vajaduse korral ka nende töötlemisviis — Naatrium — Kaalium	Kuni 12 nädalat	Märgistusel märgitakse: — „Kergesti seeduv sööt, suurem naatriumi- ja kaaliumisisaldus.“ — „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		ning naatrium $\geq 1,8$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾ , ning kaalium ≥ 5 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾				
21	Ägeda sooleimendumishäire vähendamine	Elektrolüütide suurem sisaldus: — naatrium $\geq 1,8$ % — kaalium: $\geq 0,6$ % ning kergesti seeduvad süsivesikud: — ≥ 32 %	Koerad ja kassid	— Naatrium — Kaalium — Süsivesikullikas/-allikad	1–7 päeva	1. Sööta turustatakse täiendsöödana. 2. Märgistusel märgitakse: — „Ägeda kõhulahtisuse ja sellest taastumise ajal.“ — „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ 3. Tahke sööda puhul tuleks elektrolüütide soovitatav määr arvutada tavapärase päevas joodava veekoguse alusel.
22	Rasvade ainevahetuse toetamine hüperlipideemia korral	Rasv ⁽¹⁾ ≤ 110 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽¹²⁾	Koerad ja kassid	— Toorrasv	Esialgu kuni 2 kuud	1. Sööta turustatakse täiendsöödana. 2. Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist või kasutusaaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ — „Väike rasvasisaldus.“
23	Maksatalitluse toetamine kroonilise maksa-puudulikkuse korral	Keskmine valgusisaldus: toorvalgusisaldus ≤ 279 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾ (koertele), toorvalgusisaldus ≤ 370 g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾ (kassidele), ning valitud valguallikas/-allikad ning soovitav dieetvalgu seeduvus ≥ 85 %	Koerad ja kassid	— Valguallikas/-allikad — Vask (kokku) — Naatrium	Esialgu kuni 4 kuud	1. Sööta turustatakse täiendsöödana. 2. Kergesti seeduvate valitud valguallikate hulka kuuluvad näiteks piimavalgud (vadak, kaseiin, piim, kodujuust), muud loomsed valgud (munad, kodulinnuliha) ja taimsed valgud (soja). 3. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav.“ 4. Märgistusel märgitakse: — „Keskmine valgusisaldus, valitud ja kergesti seeduvad valgud.“ — „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		Vähese valgusisaldusega, kuid sisaldab kvaliteetseid kergesti seeduvaid süsivesikuid	Hobuslased	— Valgu- ja kiudaineallikad — Kergesti seeduva süsivesikud ja vajaduse korral ka nende töötlemisviis — Metioniin — Koliin — n-3-rasvhapete sisaldus (kui neid on lisatud)	Esialgu kuni 6 kuud	1. Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist või kasutaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaarstiga.“ 2. Juhendis tuleb kirjeldada söötmisviisi, kaasa arvatud söötmist väikeste portsjonite kaupa palju kordi päevas.
24	Südamefunktsiooni toetamine kroonilise südamepuudulikkuse korral	Piiratud naatriumisisaldus: naatrium $\leq 2,6$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Koerad ja kassid	— Magneesium — Kaalium — Naatrium	Esialgu kuni 6 kuud	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist või kasutaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaarstiga.“
25	Liigse kehakaalu vähendamine	Ainevahetuse käigus tekkiv energia < 3060 kcal täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽¹³⁾, või ainevahetuse käigus tekkiv energia < 560 kcal täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 85 % ⁽¹³⁾	Koerad	— Energeetiline väärtus	Kuni saavutatakse soovitud kehakaal ja pärast seda juhul, kui see on vajalik soovitud kehakaalu hoidmiseks	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Et tagada miinimumnõuete täitmine, tuleks ülekaalu vähendamiseks kasutatava dieedi toitainesisaldust suurendada selliselt, et päeva piiratud energiakogus ⁽¹⁴⁾ oleks kompenseeritud. 3. Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaarstiga.“ — „Kassidele soovitatakse dieedi alguses üleminekuperioodi.“ — „Tõhusa kaalulanguse saavutamiseks või ideaalse kehakaalu hoidmiseks ei tohiks soovitatavat päevase energia kogust ületada.“
		Ainevahetuse käigus tekkiv energia < 3190 kcal täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽¹³⁾, või ainevahetuse käigus tekkiv energia < 580 kcal täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 85 % ⁽¹³⁾,	Kassid			

Kande number	Erisõotmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
26	Nahafunktsiooni toetamine dermatoosi ja liigse karvade väljalangemise korral	Linoolhape $\geq 12,3$ g kg kohta ning eikosapentaenenhapet ja dokosaheksaenenhapet kokku $\geq 2,9$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ^(?)	Koerad ja kassid	— Linoolhape — Eikosapentaenenhappe ja dokosaheksaenenhappe sisaldus kokku	Esialgu kuni 2 kuud	Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ — „Suur linoolhappesisaldus ning eikosapentaenenhappe ja dokosaheksaenenhappe sisaldus kokku“
		Linoolhape $\geq 18,5$ g kg kohta ning eikosapentaenenhapet ja dokosaheksaenenhapet kokku $\geq 0,39$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ^(?)	Koerad			
		Linoolhape $\geq 18,5$ g kg kohta ning eikosapentaenenhapet ja dokosaheksaenenhapet kokku $\geq 0,09$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ^(?)	Kassid			
27	Liigete ainevahetuse toetamine osteoartriidi puhul	Omega-3 rasvhapped kokku ≥ 29 g kg kohta ja eikosapentaenenhappe $\geq 3,3$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ^(?) , ning piisav E-vitamiini sisaldus	Koerad	— Omega-3 rasvhapped (kokku) — Eikosapentaenenhappe (kokku) — E-vitamiin (kokku)	Esialgu kuni 3 kuud	Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“
		Omega-3 rasvhapped kokku $\geq 10,6$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ^(?) , ja dokosaheksaenenhappe $\geq 2,5$ g täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ^(?) , ning kõrgem metioniini- ja mangaanisaldus. Piisav E-vitamiini sisaldus.	Kassid	— Omega-3 rasvhapped (kokku) — Dokosaheksaenenhappe (kokku) — Metioniin (kokku) — Mangaan (kokku) — E-vitamiin (kokku)		

Kande number	Erisõotmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
28	Maksa vasesisalduse vähendamine	Piiratud vasesisaldus: vask $\leq 8,8$ mg täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Koerad	Vask (kokku)	Esialgu kuni 6 kuud	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaarstiga.“
29	Joodisisalduse vähendamine söödas kilpnäärme ületalitluse korral	Joodisisalduse piirang: jood $\leq 0,26$ mg täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Kassid	Jood (kokku)	Esialgu kuni 3 kuud	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaarstiga.“
30	Toetus stressirohkete olukordades, et vähendada stressist tingitud käitumist	1–3 g trüpsiin-hüdrolüüsitud veise kaseiini täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % ⁽²⁾	Koerad	Trüpsiin-hüdrolüüsitud veise kaseiin	Esialgu kuni 2 kuud	1. Sööta turustatakse täissöödana. 2. Märgistusel märgitakse: — „Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaarstiga.“
50	Innaajaks ja paljunemiseks ettevalmistumise toetamine	— Suur seleenisisaldus ja 12 % niiskusesisaldusega täissööda kg kohta E-vitamiini vähemalt 50 mg sigade puhul, 35 mg küülikute puhul, 88 mg koerte, kasside ja naaritsate puhul; E-vitamiini sisaldus looma päevaratsioonis vähemalt 100 mg lammaste puhul, 300 mg lehmade puhul, 1 100 mg hobuste puhul või — suur A ja/või D-vitamiinisisaldus ja/või vähemalt 300 mg beetakaroteeni looma kohta päevas.	Imetajad	Iga lisatud mikroelemendi ja vitamiini nimetus ja üldkogus.	— Lehmad: 2 nädalat enne tiinuse lõppu kuni järgmise tiinuse kindlakstegemiseni. — Emised: 7 päeva enne poegimist kuni 3 päeva pärast poegimist ja 7 päeva enne paaritamist kuni 3 päeva pärast paaritamist. — Muude imetajate emasloomad: tiinuse viimasest perioodist kuni järgmise tiinuse kindlakstegemiseni.	1. On lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul. 2. Sööda kasutusjuhendis märgitakse, et õigusnormidega täissööda jaoks ettenähtud maksimumsisaldust ei tohi ületada. 3. Sööda märgistusel tuleb esitada juhised olukordadeks, kus sööda kasutamine on asjakohane.

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		Täiendsööt võib sisaldada seleeni ning A- ja D-vitamiini kontsentratsioon, mis on üle 100 korra suurem kui täissööda jaoks kehtestatud asjakohane maksimumsisaldus.			— Isased: paljunemistsükli ajal.	
		— Suur A-vitamiini ja/või D-vitamiini sisaldus või — sisaldab suures kontsentratsioonis seleeni ja/või tsinki ja/või vähemalt 40 mg E-vitamiini 12 % niiskusesisaldusega täissööda kg kohta. Täiendsööt võib sisaldada seleeni, tsinki, A- ja D-vitamiini kontsentratsioon, mis on üle 100 korra suurem kui täissööda jaoks kehtestatud asjakohane maksimumsisaldus.	Linnud	Iga lisatud mikroelemendi ja vitamiini nimetus ja üldkogus.	— Emaslinnud: paljunemistsükli ajal — Isaslinnud: paljunemistsükli ajal	
51	Kapjade/sõrgade, jalgade ja naha taastumise toetamine	Suur tsiingisisaldus. Täiendsööda tsiingisisaldus võib olla üle 100 korra suurem kui asjakohane kindlaksmääratud maksimumsisaldus täissöödas.	Hobused, mäletsejalised ja sead	— Tsink (kokku) — Metioniin (kokku) — Biotiin (kui on lisatud)	Kuni 8 nädalat	1. Sööda kasutusjuhendis märgitakse, et õigusnormidega täissööda jaoks ettenähtud tsiingi maksimumsisaldust ei tohi ületada. 2. Mäletsejaliste sööda puhul on lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul.
52	Toitumise tasakaalustatuse toetamine toitmiskava muutmise korral	Dieetsööda kaudu omastatav miinimumkogus: — seleen: 0,1 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — tsink: 15 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — vask: 2 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (lamaste puhul), ja 5 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (muude liikide puhul), ja/või	Mäletsejalised Sead Küülikud Kodulinud	Toidu lisaainete nimetus ja üldkogus, vajaduse korral	2–15 päeva	1. Mäletsejaliste ja sigade sööda puhul on lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul. 2. Sööda kasutusjuhendis märgitakse, et õigusnormidega täissööda jaoks ettenähtud maksimumsisaldust ei tohi ületada.

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		— A-vitamiin: 2000 IU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — D-vitamiin: 400 IU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — E-vitamiin: 35 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (kodulindude puhul), 10 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (mäletsejaliste puhul), 40 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (küülikute puhul) ja 20 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (sigade puhul) Täiendsööt võib sisaldada seleeni, tsinki, vaske, A- ja D-vitamiini kontsentratsioonis, mis on 100 korda suurem kui täissööda jaoks kehtestatud asjakohane maksimumsisaldus.				3. Sööda märgistusel tuleb esitada juhised olukordadeks, kus sööda kasutamine on asjakohane.
53	Toetus võõrutuse ajal	Dieetsööda kaudu omastatav miinimumkogus: — seleen: 0,1 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %,	Imetajad	Toidu lisaainete nimetus ja üldkogus, vajaduse korral	Kuni 4 nädalat võõrutamise ajal	1. Sööda kasutusjuhendis märgitakse, et õigusnormidega täissööda jaoks ettenähtud maksimumsisaldust ei tohi ületada. 2. Sööda märgistusel tuleb esitada juhised olukordadeks, kus sööda kasutamine on asjakohane.

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		ja/või — tsink: 15 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — vask: 2 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (lamaste puhul), ja 5 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (muude liikide puhul), ja/või — jood: 0,2 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — mangaan: 20 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — A-vitamiin: 1500 IU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — D-vitamiin: 400 IU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ja/või — E-vitamiin: 100 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (vasikate puhul), ja 50 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % (lambatallede, kitsetallede ja varssade puhul) Täiendsööt võib sisaldada seleeni, tsinki, vaske, joodi, mangaani ning A- ja D-vitamiini kontsentratsioon, mis on üle 100 korra suurem kui täissööda jaoks kehtestatud asjakohane maksimumsisaldus.				

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
54	Naha ja selle moodustiste taastumise toetamine	— Dieetsööda kaudu minimaalselt omastatavad tsingiühendid koguses, mis vastab 20 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %, ning — suur järgmiste koostisosade sisaldus: vask ja/või jood ja/või seleen ja/või B6-vitamiin ja/või E-vitamiin ja/või A-vitamiin ja/või metioniin ja/või tsüstiin ja/või biotiin vähemalt 0,4 mg täissööda kg kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 % (mäletsejaliste puhul), Täiendsööt võib sisaldada tsinki, vase, joodi, seleeni ja A-vitamiini kontsentratsioonis, mis on üle 100 korra suurem kui täissööda jaoks kehtestatud asjakohane maksimumsisaldus.	Imetajad ja kodulinnud	Toidu lisainete nimetus ja üldkogus, vajaduse korral	— Kuni 8 nädalat — Mäletsejalistele mõeldud täiendsööt, mis sisaldab biotiini: kuni 6 kuud	1. Sööda kasutusjuhendis märgitakse, et õigusnormidega täissööda jaoks ettenähtud maksimumsisaldust ei tohi ületada. 2. Sööda märgistusel tuleb esitada juhised olukordadeks, kus sööda kasutamine on asjakohane.
55	Vee ja elektrolyütide tasakaalu stabiliseerimine füsioloogilise seedetegevuse toetamiseks	— Peamiselt elektrolyüdid: naatrium, kaalium ja kloriidid — Puhverduisvõime ⁽¹⁹⁾ vedelsööda puhul: vähemalt 60 millimooli liitri valmissöödaleeme kohta — Kergestiseeduvad süsivesikud	Vasikad, sead, lambatallad, kitsetallad ja varsad	— Naatrium — Kaalium — Kloriidid — Süsivesikuallikas/-allikad — Vesinikkarbonaadid ja/või tsitraadid (kui on lisatud)	1–7 päeva	1. Soovitav elektrolyütide sisaldus liitri valmissöödaleeme kohta: naatrium: 1,7 g –3,5 g, kaalium: 0,4 g – 2 g, kloriidid: 1 g –2,8 g. 2. Tahke sööda puhul tuleks elektrolyütide soovitatav määr arvutada tavapärase päevas joodava veekoguse alusel.

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
						3. Märgitusel märgitakse: — „Seedehäirete (kõhulahtisuse) ohu korral, nende ajal või nendest taastumise ajal.“ — „Enne kasutamist või kasutusaaja pikendamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“ 4. Kasutusjuhendis märgitakse: — valmissegatud leeme ja piima soovitatav kogus (vajaduse korral). — Juhul kui vesinikkarbonaatide ja/või tsitraatide sisaldus ületab 40 millimooli ühe liitri valmis-söödaleeme kohta (mäletsejaliste puhul): „Libedikuprobleemiga loomade puhul tuleks vältida samaaegset piima sötmist.“
56	Tetaania (hüpomagneesemia) ohu vähendamine	Suur magneesiumisisaldus, kergesti omastatavad süsivesikud, keskmine valgusisaldus ja väike kaaliumisisaldus	Mäletsejalised	— Tähts — Suhkrud (kokku) — Magneesium — Naatrium — Kaalium	3–10 nädalat kiire rohu-kasvu ajal	1. On lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul. 2. Kasutusjuhendisse märgitakse juhised päevaratsiooni koostise kohta seoses kiudainete ja kergesti omastatavate energiaallikate lisamisega. 3. Lammaste sööda puhul märgitakse märgistusele: „Eelkõige lüpsiperioodil olevate uttede jaoks.“
57	Atsidoosiohu vähendamine	Kergesti kääritatavate süsivesikute väike sisaldus ja hea puhverduvõime	Mäletsejalised	— Tähts — Suhkrud (kokku)	Kuni kaks kuud ⁽¹⁵⁾	1. On lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul. 2. Kasutusjuhendisse märgitakse juhised päevaratsiooni koostise kohta seoses kiudainete ja kergesti kääritatavate süsivesikute allikate lisamisega. 3. Piimalehmade sööda puhul märgitakse märgistusele: „Eelkõige suure piimajõudlusega lehmade jaoks.“ 4. Nuumveiste sööda puhul märgitakse märgistusele: „Eelkõige intensiivse söötmise korral ⁽¹⁶⁾.“

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
58	Kusekivide ohu vähendamine	Väike fosfori- ja magneesiumisisaldus ning uriini happelisust soodustavad omadused	Mäletsejalised	— Kaltsium — Fosfor — Naatrium — Magneesium — Kaalium — Kloriidid — Väävel — Uriini happelisust soodustavad ained	Kuni 6 nädalat	1. Märgistusel märgitakse: „Eelkõige noorloomade intensiivse söötmise korral.“ 2. Kasutusjuhendis märgitakse: „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“.
59	Rohusööjate loomade pikaaegne varustamine mikroelementide ja/või vitamiinidega	Suur järgmiste koostisosade sisaldus: — mikroelemendid ja/või — vitamiinid, provitamiinid ja samalaadsete toimetega keemiliselt täpselt määratletud ained. Täiendsööt võib sisaldada sööda lisaineid koguses, mis on 100 korda suurem kui asjakohane kindlaksmääratud sisaldus täissöödas	Mäletsejalised, kellel on toimivats	— Iga lisatud mikroelemendi, vitamiini, provitamiini ja samalaadse toimega keemiliselt hästi määratletud aine nimetus ja lisatud kogus. — Booli kasutamise korral iga mikroelemendi ja/või vitamiini kohta päevas eralduv kogus. — Booli kasutamise korral suurim ajavahemik, mille vältel pidevalt eraldub mikroelemente või vitamiine.	Kuni 12 kuud	1. On lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul. 2. Sööda märgistusel märgitakse: — „Booli kasutamise korral vältige boolis olevaid aineid sisaldavate selliste muude söödalisandite samaaegset kasutamist, mis juba ise annavad lisaine maksimaalse lubatava sisalduse.“ — Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararsti või söödanõustajaga järgmistes küsimustes: a) mikroelementide sisalduse tasakaalustatus päevaratsioonis; b) olukord karja mikroelementidega varustatuse alal.
60	Tetaania ja subkliinilise hüpokaltseemia ohu vähendamine	Väike katioonide/anioonide suhe Kogu söödaratsiooni puhul: — Minimaalne happelisuse lisandamine erisööda kaudu: 100 mEq kg kuivaine kohta — Eesmärk: 0 < DCAD ⁽¹⁷⁾ (mEq kg kuivaine kohta) < 100	Piimalehmad	— Kaltsium — Fosfor — Magneesium — Naatrium — Kaalium — Kloriidid — Väävel	Kolm nädalat enne poegimist kuni poegimiseni	Kasutusjuhendis märgitakse: „Pärast poegimist erisööda manustamine lõpetada.“

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		või				
		Tseoliit (naatriumalumiiniumisiliikaat): 250 –500 g päevas		Naatriumalumiiniumisiliikaat	Kolm nädalat enne poegimist kuni poegimiseni	Kasutusjuhendis märgitakse: — „Söödakoguseid tuleb piirata, et päevane naatriumalumiiniumisiliikaadi kogus looma kohta ei ületaks 500 grammi.“ — Kasutada maksimaalselt kaks nädalat. — „Pärast poegimist erisööda manustamine lõpetada.“
		või Manustatakse vatsas lagundamatuid söödamaterjale, mille fütiinhappe sisaldus on suur (> 6 %) ja kaltsiumisisaldus on alla 0,2 %, et lehm omastaks vähemalt 28 g ja maksimaalselt 32 g kaltsiumit päevas või		— Kaltsium	Neli nädalat enne poegimist kuni poegimiseni	1.Kasutusjuhendis märgitakse: 2.„Pärast poegimist erisööda manustamine lõpetada.“
		Suur kaltsiumisisaldus kergesti omanduvate kaltsiumiallikate kujul: kaltsiumkloriid ja/või kaltsiumsulfaat ja/või kaltsiumdivesinikfosfaat ja/või kaltsiumkarbonaat ja/või kaltsiumpropionaat ja/või kaltsiumformiaat ja/või „mis tahes muu samalaadse toimega kaltsiumallikas“ Ühest või mitmest eespool nimetatud allikast saab lehm päevas vähemalt 50 grammi kaltsiumi või		— Kaltsium — Kaltsiumiallikad	Esimeste poegimise nähtude ilmnemisel ja kuni kaks päeva pärast poegimist	1. On lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul. 2. Kasutusjuhendis märkida manustamiskordade arv ning manustamise kestus enne ja pärast poegimist. 3. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida söödanõustajaga.“
		Kaltsiumpidolaat 5,5 g lehma kohta päevas või		— Kaltsium — Kaltsiumpidolaat	Esimeste poegimise nähtude ilmnemisel ja kuni kaks päeva pärast poegimist	1. On lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul.

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
						2. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida söödanõustajaga.“
		Maavitsaliste jahu, mis võimaldab omastada 38–46 µg 1,25 dihüdrosükoolkaltsiferool-glükosiiti päevas		— Maavitsaliste jahu — 1,25 dihüdrosükoolkaltsiferool-glükosiidi sisaldus — Toorkiud — Magneesium — Toorrasv — Tärklis — D3-vitamiin kolekalsiferoolina	Kaks päeva enne poegimist või esimeste poegimise nähtude ilmnemisel ja kuni kümme päeva pärast poegimist	1. On lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul. 2. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida söödanõustajaga.“
61	Ketoosi ohu vähendamine ⁽¹⁸⁾	— Propaan-1,2-diooli või propüleenglükooli vähemalt: 250 g päevas (piimalehmade puhul) 50 g päevas (uttede ja kitsede puhul) või — Propionaate (kaltsiumi- või naatriumisoolad) vähemalt: 110 g päevas (piimalehmade puhul) 22 g päevas (uttede ja kitsede puhul) või — Propaan-1,2-diooli ja propionaate (naatriumi- või kaltsiumisoolad) kokku vähemalt järgmises vahekorras: — propaan-1,2-diooli ja propionaatide segu piimalehmade jaoks järgmise koostisega: propionaadid + 0,44 x propaan-1,2-diooli > 110 g/päevas	Piimalehmad, uted ja kitsed	— Propaan-1,2-diool, kui on lisatud — Propionaadid naatriumi- või kaltsiumisooladena, kui on lisatud	Kolm nädalat enne poegimist kuni kuus nädalat peale poegimist (piimalehmade puhul) Kuus nädalat enne ja kolm nädalat pärast poegimist (uttede ja kitsede puhul)	1. On lubatud kasutada booli. Bool võib sisaldada energiasisalduse suurendamiseks kuni 20 % rauda, mis esineb inertselt, bioloogiliselt mitteomastataval kujul. 2. Märgistusel märgitakse: „Kaltsiumi või naatriumpropionaatide manustamisel tiinuse lõppjärgus tuleb hinnata mineraalset tasakaalu seoses hüpokaltseemia ohuga pärast poegimist.“

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		— propaan-1,2-diooli ja propionaatide segu uttede ja kitsede jaoks järgmise koostisega: propionaadid + 0,44 x propaan-1,2-diooli > 22 g/päevas				
62	Stressireaktsiooni vähendamine	— Suur magneesiumisisaldus ja/või — kergesti seeduvad komponendid	Sead	— Magneesium — Kergesti seeduvad komponendid, vajaduse korral ka nende töötlemisviis — n-3-rasvhapete sisaldus (kui neid on lisatud)	1–7 päeva	Märgistusel kirjeldatakse olukorda, millal asjaomast sööta kasutada.
63	Kõhukinnisuse ohu vähendamine	Soole läbitavust stimuleerivad koostisosad	Emised	Soole läbitavust stimuleerivad koostisosad	10–14 päeva enne ja 10–14 päeva pärast poegimist	
64	Raua ebapiisava sünnijärgse kättesaadavuse kompenseerimine	Rauaühendite suur sisaldus kategooria „toitainelised lisandid“ funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid“ alla kuuluvates lubatud söödalisandites, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisas. Täiendsööt võib sisaldada rauda kontsentratsioonis, mis on üle 100 korra suurem kui asjakohane kehtestatud maksimaalne sisaldus täissöödas.	Piimapõrsad ja -vasikad	Raud (kokku)	Kuni 3 nädalat pärast sündi	Sööda kasutusjuhendis märgitakse, et õigusnormidega täissööda jaoks ettenähtud raua maksimumsisaldust ei tohi ületada.

Kande number	Erisõotmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
65	Imendumishäirete kompenseerimine	Väike küllastunud rasvhapete sisaldus ja suur rasvlahustuvate vitamiinide sisaldus	Kodulin-nud, v.a ha-ned ja tuvid	— Küllastunud rasvhape-te protsendimäär kogu rasvhappesisaldusest — A-vitamiin (kokku) — D-vitamiin (kokku) — E-vitamiin (kokku) — K-vitamiin (kokku)	Esimesed 2 nädalat pärast koorumist	
66	Rasvmaksa sündroomi ohu vähendamine	Väike energiasisaldus ning sellise ainevahetuses tekkiva energia suur osakaal, mis on saadud suure polüküllastumata rasvhapete sisaldusega lipiididest	Munakanad	— Energiasisaldus (arvu-tatud EÜ meetodi järgi) — Ainevahetuses tekkiva energia protsendimäär lipiidide puhul — Polüküllastumata rasvhapete sisaldus	Kuni 12 nädalat	
67	Spordivõistluseks ettevalmistumise ja võist-lusest toibumise toetamine	Rohkesti seleeni ja vähemalt 50 mg E-vitamiini 12 % niiskusesisaldusega täissööda kg kohta. Täiendsööt võib sisaldada seleeniühendeid kontsentratsioonis, mis on üle 100 korra suurem kui asjakohane kehtestatud maksimaalne sisaldus täissöödas.	Hobuslased	— E-vitamiin (kokku) — Seleen (kokku)	Kuni 8 nädalat enne spordivõistlust, kuni 4 nädalat pärast võistlust	Sööda kasutusjuhendis märgitakse, et õigusnormidega täissööda jaoks ettenähtud seleeni maksimumsisaldust ei tohi ületada.
68	Elektrolüüdikaotuse kompen-seerimine pärast tugevat higista-mist	Peab sisaldama naatriumkloriidi ja võiks sisaldada kaaliumkloriidi. Väike magneesiumi-, kaltsiumi- ja fosforisisaldus. Muude elektrolüütsoolade lisamine on vabatahtlik.	Hobuslased	— Naatrium — Kloriidid — Kaalium — Kaltsium — Magneesium — Fosfor	Üks kuni kolm päeva pä-rast tugevat higistamist	1. Märgistusel kirjeldatakse olukordi, millal asjaomast sööta kasutada. 2. Kasutusjuhendis tuleb esitada manustusjuhised vastavalt sportliku tegevuse kestusele ja intensiivsusele ning sööda koostisele ja selle märgistusele.

Kande number	Erisöötmise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
						3. Märgistusel märgitakse: — „Joogivesi peab olema alati kättesaadav“. — Kui manustatakse vees lahustamata elektrolüüte (nt sööda sees või süstlaga): „Joogivesi peab olema kättesaadav vähemalt 20 minutit või eelistatavalt 1 tunni jooksul pärast manustamist.“ 4. Lisaks peab juhendis olema märgitud, et manustamisjärgset joomist tuleb jälgida, ning juhul, kui loom ei ole piisavalt vett joonud, tuleb pöörduda veterinaari poole. 5. Juhendis võib märkida vee koguse (liitrites) vastavalt sööda või süstimisega saadavatele elektrolüütidele.
69	Energia ainevahetuse ja lihaste talitluse toetamine rabdomüolüüsi korral	Tärglis ja suhkur, mitte üle 20 % kogu energiast Toorrasv, üle 20 % kogu energiast E-vitamiini 350 IU ühe kg täissööda kohta, kui täissööda niiskusesisaldus on 12 %	Hobuslased	— Tärglis — Suhkur — Toorrasv — E-vitamiin (kokku)	Esialgu vähemalt 3 kuud	1. Märgistusel kirjeldatakse olukordi, millal asjast sööta kasutada. 2. Kasutusjuhendis tuleb selgitada päevaratsiooni tasakaalu ja märkida päevas tarbitav kogus. 3. Märgistusel märgitakse: „Enne kasutamist soovitatakse konsulteerida veterinaararstiga.“
70	Jämesoole krooniliste seedefunktsiooni häirete kompenseerimine	— Vajalik tärglisesisaldus: üle 1 g kehamassi ühe kg kohta ühe toidukorra ajal (kõhulahtisuse korral üle 0,5 g kehamassi ühe kg kohta ühe toidukorra ajal) — Teravili, mis on läbinud hüdrotermaatilise töötuse, näiteks ekstrusioon, mikroniseerimine, ekspansioon või helvestamine, et parandada tärglise seeduvust peensooles	Hobuslased	— Tärglis — Toorrasv	Pikaajaliselt või probleemse olukorra lahendamiseni	1. Kasutusjuhendis kirjeldatakse — konkreetseid olukordi, millal sööda kasutamine on vajalik, eelkõige seda, kas toodet sobib kasutada kõhulahtisusega loomadel, — ning märgitakse ühe toidukorra ajal tarbitav erisööda ja taimse sööda kogus. 2. Kasutusjuhendis peab sõltuvalt ölisalisaldusest viitama võimalikule järkjärgulisele kasutamisele ning seal tuleb esitada soovitus kõhulahtisusega looma jälgimiseks.

Kande number	Erisöötamise eesmärk	Põhilised toiteomadused (GP1)	Loomaliik või -kategooria	Märgistamisel esitatavad andmed (GP2)	Soovitav kasutusaeg	Muud sätted
	1	2	3	4	5	6
		— Lisaks anda vees lahustuvaid vitamiine ja piisavalt mineraalaineid/elektrolüüte — Lisaks anda õli (v.a kõhulahtisuse korral)				3. Märgistusel esitatakse teravilja töötlemisviis.
71	Peensoole kroonilise funktsionaalse puudulikkuse kompenseerimine	— Kergesti seeduvad kiudained — Kvaliteetsed valguallikad ja lüsiin > 4,3 % toorvalgust — Suhkur ja tärklis kokku 0,5 g kehamassi ühe kg kohta ühe toidukorra ajal — Teravili, mis on läbinud hüdrotermaatilise töötlemise, näiteks ekstrusioon, mikroniseerimine, ekspansioon või helvestamine, et parandada seedimist enne umbsoolt	Hobuslased	— Kergesti seeduvad söödamaterjalid, vajaduse korral ka nende töötlemisviis — Suhkur ja tärklis kokku — Valguallikad	Pikaajaliselt või probleemse olukorra lahendamiseks	1. Kasutusjuhendis kirjeldatakse — konkreetseid olukordi, millal seda sööta kasutada, — ning märgitakse ühe toidukorra ajal tarbitav erisööda ja taimse sööda kogus. 2. Kasutusjuhendis peab sõltuvalt ölisaldusest viitama võimalikule järkjärgulisele kasutamisele ning seal tuleb esitada soovitus kõhulahtisusega looma jälgimiseks.
72	Füsioloogilise seedetegevuse stabiliseerimine	Funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained“ kuuluvad söödalisedid, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisas, või määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 10 osutatud loa uuendamise menetluse ajal rühma „mikroorganismid“ kuuluvad söödalisedid	Loomaliik, kelle puhul soolestiku mikrofloorat tasakaalustavat ainet või mikroorganismi on lubatud kasutada	Mikrofloorat tasakaalustava aine või mikroorganismi nimetus ja lisatud kogus	Kuni 4 nädalat	1. Märgistusel märgitakse: „Seedehäirete ohu korral, nende ajal või nendest taastumise ajal.“ 2. Sööda kasutusjuhendis märgitakse, et soolestiku mikrofloorat tasakaalustava aine või mikroorganismi suurimat lubatud sisaldust täissöödas ei tohi ületada.

(GP1) Arvuliste näitajate kontrollimisel kohaldatakse määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisas määratletud lubatud erinevusi.

(GP2) Need märgistusel esitatavad andmed tuleb esitada lisaks määruses (EÜ) nr 767/2009 sätestatud üldistele märgistusnõuetele.

(¹) Vajaduse korral võib tootja soovitada toodet kasutada ka ajutise neerupuudulikkuse korral.

(²) Aluseks on võetud dieet, kus kuivainete energiasisaldus 4 000 kcal ainevahetuse käigus tekkiva energia kg kohta on arvutatud valemiga, mis on esitatud FEDIAFi veebilehel „Nutritional Guidelines“ (<http://www.fediac.org/self-regulation/nutrition.html>). Neid väärtusi kohandatakse, kui energiasisaldus erineb väärtusest 4 000 kcal ainevahetuse käigus tekkiva energia kg kohta.

(³) Kui toodet soovitatatakse kasutada ajutise neerupuudulikkuse korral, on soovitatav kasutusaeg kaks kuni neli nädalat.

(⁴) onkreetse talumatuse jaoks mõeldud sööda puhul võib „koostisosa ja toitaine“ asemel viidata asjaomasele talumatusele.

(⁵) Kassitoidu puhul võib lisada märke „Kasside maksa rasvväärastus“.

(⁶) Kassitoidu puhul võib lisada märke „Kasside alumiste kuseteede haigus“ või „Kasside uroloogiline sündroom“.

(⁷) Küllastumist vähendavad omadused: uriini näidud viitavad kristallide ja kivide lahustumist soodustavatele omadustele ja/või uriini näidud viitavad kristallide teket ja kasvu ennetavatele omadustele.

(⁸) Uriini pH ≤ 6,5.

(⁹) Metastabiliseerivad omadused: uriini näidud viitavad kristallide teket ennetavatele omadustele.

(¹⁰) Võib lisada märke „Eksokriinne kõhunäärme puudulikkus“.

⁽¹¹⁾ Kõigi oluliste rasvhapete päevaratsiooni puhul tuleb järgida FEDIAFi („Nutritional Guidelines“ <http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>) esitatud soovitusi miinimumsisalduse kohta.

⁽¹²⁾ Aluseks on võetud dieet, kus kuivainete energiasisaldus 3 500 kcal ainevahetuse käigus tekkiva energia kg kohta on arvutatud valemiga, mis on esitatud FEDIAFi veebilehel „Nutritional Guidelines“ (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Neid väärtusi kohandatakse, kui energiasisaldus erineb väärtusest 3 500 kcal ainevahetuse käigus tekkiva energia kg kohta.

⁽¹³⁾ Ainevahetuse käigus tekkiv energia kg kohta on arvutatud valemiga, mis on esitatud veebilehel FEDIAF (2019) Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.

⁽¹⁴⁾ FEDIAF (2019) Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.

⁽¹⁵⁾ Piimalehmade sööda puhul: „Kuni kaks kuud alates lüpsiperioodi algusest“.

⁽¹⁶⁾ Märgitakse asjaomane mäletsejaliste kategooria.

⁽¹⁷⁾ $DCAD\ (mEq/kg\ kuivaines) = (Na + K) - (Cl + S)$.

⁽¹⁸⁾ Mõiste „ketoos“ asemel võib kasutada mõistet „atsetoneemia“ ning märgistuse eest vastutav isik võib lisada soovitusel erisööda kasutamiseks ketoosist taastumise korral.

⁽¹⁹⁾ Arvutatud vastavalt tugevate ioonide vahe (Strong Ion Difference, SID) meetodile: SID on tugevate kationide ja tugevate anioonide kontsentratsioonide summa erinevus; $[SID] = [mmol\ Na^+/l] + [mmol\ K^+/l] + [mmol\ Ca^{++}/l] + [mmol\ Mg^{++}/l] - [mmol\ Cl^-/l] - [mmol\ muid\ tugevaid\ anioone/l]$.