

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/354 RENDELETE

(2020. március 4.)

a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett felhasználásainak jegyzéke létrehozásáról és a 2008/38/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 10. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) A takarmányok forgalomba hozatalát és felhasználását a 767/2009/EK rendelet szabályozza. Az említett rendelet 9. cikkével összhangban különleges táplálkozási célokra szánt takarmány csak akkor hozható forgalomba, ha tervezett felhasználása szerepel a tervezett felhasználásoknak az e rendelet 10. cikkével összhangban létrehozott jegyzékében.
- (2) A 2008/38/EK bizottsági irányelv ⁽²⁾ létrehozta a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listáját.
- (3) A 2008/38/EK irányelv I. mellékletének A. része meghatározta a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokra vonatkozó általános rendelkezéseket. Figyelembe véve a tudományos és technológiai fejlődést, valamint a 767/2009/EK rendeletben megállapított címkézési követelményeket, az említett általános rendelkezéseket felül kell vizsgálni.
- (4) A 767/2009/EK rendelet 11–17. cikke új elveket és szabályokat állapított meg a takarmányok forgalomba hozatalára, többek között a címkézésre vonatkozóan. Ennek következtében a 2008/38/EK irányelv I. mellékletének B. részében szereplő, a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazásainak listáján több bejegyzés elavulttá vált, részben az „alapvető táplálkozási jellemzők” oszlopban szereplő, nem kielégítően megfogalmazott és túlzottan általános leírások miatt. Az ilyen bejegyzések esetében az ellenőrző hatóságok nagyon nehezen tudják ellenőrizni a 767/2009/EK rendelet rendelkezéseinek való megfelelést, ideértve azt is, hogy az érintett takarmány különleges összetétele megfelel-e az adott különleges táplálkozási célnak.
- (5) A 767/2009/EK rendelet 10. cikkével összhangban a Bizottsághoz több kérelem érkezett a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok számos olyan tervezett felhasználásával kapcsolatos feltételek módosítására és megváltoztatására vonatkozóan, amely már elavult. Azokat az elavult bejegyzéseket, amelyekre vonatkozóan nem nyújtottak be kérelmet, vagy a kérelmet visszavonták, törölni kell.

⁽¹⁾ HL L 229., 2009.9.1., 1. o.

⁽²⁾ A Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (HL L 62., 2008.3.6., 9. o.).

- (6) Ami a 2008/38/EK irányelv I. mellékletének B. részében felsorolt, különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok egyéb tervezett felhasználását illeti, a tudományos és technológiai fejlődéshez való hozzáigazítás, valamint a rendelkezések végrehajthatóságának javítása és egyértelműbbé tétele érdekében módosítani kell az alapvető táplálkozási jellemzőkre és a címkén feltüntetendő jellemzőkre vonatkozó rendelkezéseket.
- (7) A 767/2009/EK rendelet 10. cikkének megfelelően kérelmeket nyújtottak be továbbá a Bizottsághoz „az energiaanyagcsere és az izomfunkció támogatása *rhabdomyolosis* esetén” és „támogatás stresszhelyzetekben, ami a járulékos viselkedések csökkenését eredményezi” különleges táplálkozási céloknak a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett felhasználásainak jegyzékébe történő felvétele érdekében.
- (8) A Bizottság minden kérelmet a csatolt dokumentációval együtt a tagállamok rendelkezésére bocsátott.
- (9) A kérelmekben szereplő dokumentációk értékelését követően a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) elismerte, hogy a takarmányok sajátos összetétele megfelel a különleges táplálkozási céloknak, és nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem pedig a környezetre vagy az állatjólétre.
- (10) A fenti megfontolások alapján frissíteni kell a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett felhasználásainak jegyzékét.
- (11) mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az új általános rendelkezések és a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett felhasználásai frissített jegyzékének azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti intézkedésekről rendelkezni a kereskedelmi gyakorlatok szükségtelen megzavarásának elkerülésére, továbbá annak érdekében, hogy gazdasági szereplőket ne sújtsák felesleges adminisztratív terhek.
- (12) Az áttekinthetőség és az észszerűség érdekében a 2008/38/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, és egy olyan rendelettel kell felváltani, amely nem tartalmaz olyan elemeket, amelyeket a tagállamoknak át kellene ültetniük a nemzeti jogba. Az említett irányelv legutóbbi módosításaira már rendeletek formájában került sor, mivel nem volt szükség az érintett rendelkezések nemzeti jogba történő átültetésére. Emellett a 767/2009/EK rendelet rendelkezik a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó általános követelményekről.
- (13) Annak érdekében, hogy a tagállamok elvégezdhessék a szükséges kiigazításokat, e rendelet alkalmazását megelőzően elegendő időt kell biztosítani.
- (14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 767/2009/EK rendelet értelmében vett, különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok csak akkor hozhatók forgalomba, ha:

- teljesülnek az e rendelet mellékletének A. részében meghatározott, a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokra vonatkozó általános rendelkezések, és
- tervezett felhasználásuk szerepel e rendelet mellékletének B. részében, és teljesülnek az egyes bejegyzésekre vonatkozó rendelkezések.

2. cikk

Amennyiben a 767/2009/EK rendelet 10. cikkével összhangban 2021. március 25. előtt benyújtottak a Bizottsághoz egy, a tervezett felhasználásra irányuló kérelmet, a 2008/38/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelő, különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok – az 1. cikktől eltérve – továbbra is forgalomba hozhatók, amíg a Bizottság nem határoz az adott kérelemről.

3. cikk

Azok a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok, amelyeket 2022. március 25. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2020. március 25. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

4. cikk

A 2008/38/EK irányelv hatályát veszti.

5. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. december 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A. RÉSZ

A különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokra vonatkozó általános rendelkezések

1. Amennyiben a B. rész 2. oszlopában az ugyanahhoz a táplálkozási célhoz tartozó alapvető táplálkozási jellemzőknek több mint egy csoportja szerepel az „és/vagy” kifejezéssel elválasztva, a gyártó szabadon választhat a között, hogy e jellemzők valamely vagy mindkét csoportját alkalmazza a B. rész 1. oszlopában meghatározott táplálkozási cél elérése érdekében. Az egyes választási lehetőségeknek megfelelő címkén feltüntetendő jellemzők a B. rész 4. oszlopában szerepelnek.
2. Amennyiben a B. rész 2. oszlopában említett alapvető táplálkozási jellemző esetében mennyiség is fel van tüntetve, a 767/2009/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének rendelkezései és az említett rendelet IV. mellékletében megengedett eltérések alkalmazandók. Ha az említett melléklet nem állapít meg eltérést a címkén feltüntetendő adat tekintetében, akkor legfeljebb $\pm 15\%$ technikai eltérés megengedett.
3. Amennyiben egy takarmány-adalékanyag a B. rész 2. vagy 4. oszlopában van feltüntetve, a takarmány-adalékanyag(ok) ra vonatkozó engedélyezési rendelkezések az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ⁽¹⁾ megfelelően alkalmazandók, és ezen anyagokat a meghatározott alapvető táplálkozási jellemzőknek megfelelően kell felhasználni.
4. Amennyiben egy takarmány-adalékanyagként is engedélyezett anyagot a B. rész 4. oszlopában kell feltüntetni, és az „összesen” kifejezésnek kell követnie, az anyag teljes tartalmát az „analitikai összetevők” rovatban kell feltüntetni.
5. A B. rész 4. oszlopában feltüntetendő adatoknak kvantitatívnak kell lenniük, a 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽²⁾ sérelme nélkül.
6. A B. rész 5. oszlopában megadott ajánlott felhasználási időszak olyan időtartamot jelöl, amelyen belül a táplálkozási cél általában elérhető. A gyártók a megadott határokon belül pontosabban is megjelölhetik a felhasználási időszakot.
7. Amennyiben egy különleges táplálkozási célokra szánt takarmányt egynél több különleges táplálkozási célra szánnak, akkor meg kell felelnie a B. részben rögzített, az e céloknak megfelelő egyes rendelkezéseknek.
8. A különleges táplálkozási célra szánt kiegészítő takarmányok esetében a használati utasításban tájékoztatást kell adni a napi adag egyensúlyára vonatkozóan.
9. Amennyiben egy különleges táplálkozási célokra szánt, megfelelő felhasználási módú takarmányt bólusz formájában, szájon át történő egyéni felhasználásra szánnak, akkor ezt az adott takarmányra vonatkozó „egyéb rendelkezések” oszlopban kell meghatározni. Az ilyen takarmányok kizárólag a lehetséges bevonatot, a takarmány-alapanyagokat és a takarmány-adalékanyagokat tartalmazzák, kivéve, ha a vonatkozó bejegyzésben más szerepel. Ajánlott, hogy a szájon át történő egyéni felhasználásra szánt takarmány beadását állatorvos vagy más szakavatott személy végezze.
10. Amennyiben egy különleges táplálkozási célokra szánt takarmányt olyan bólusz formájában hoznak forgalomba, amely késleltetett – azaz 24 órát meghaladó – hatóanyag-leadású, szájon át történő egyéni felhasználásra szánt takarmány-alapanyag vagy kiegészítő takarmány, akkor az ilyen takarmány címkéjén – adott esetben – fel kell tüntetni a bólusz folyamatos hatóanyag-leadásának maximális időtartamát és a napi hatóanyag-leadási rátát minden olyan adalékanyag tekintetében, amely esetében a teljes értékű takarmány vonatkozásában megengedett maximális tartalmat határoztak meg. A takarmányipari vállalkozónak, amely bóluszt hoz forgalomba, bizonyítékokkal kell alátámasztania, hogy a napi hozzáférhető takarmányadalékanyag-szint az emésztőrendszerben adott esetben nem haladja meg a teljes értékű takarmány kilogrammjára vonatkozóan rögzített maximális adalékanyag-tartalmat a teljes takarmányozási időszak során (késleltetett hatóanyag-leadási hatás). Az ilyen bizonyítéknak szakmai értékelésen alapuló módszertanon vagy házon belüli elemzésen kell alapulnia.
11. Olyan tervezett felhasználások esetében, amelyeknél a 2. oszlopban szerepel, hogy egyes takarmány-adalékanyagok koncentrációja túllépheti a teljes értékű takarmány tekintetében megengedett, releváns maximális tartalom százszorosát, az említett takarmány-adalékanyagok koncentrációja nem haladhatja meg a teljes értékű takarmány tekintetében megengedett, releváns maximális tartalom ötszázszorosát, kivéve a 10. pontban említett bóluszok esetében. Az ilyen kiegészítő takarmányt úgy kell az állati takarmányba integrálni, hogy biztosított legyen, hogy az állat által felvett mennyiség megfelelően a teljes értékű takarmány tekintetében megengedett maximális tartalomnak.

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről (HL L 157., 2004.4.30., 45. o.).

B. RÉSZ

A tervezett felhasználások jegyzéke

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	Vesefunkció-segítése krónikus veseelégtelenség esetén ⁽¹⁾	Jó minőségű fehérjék és foszfor ≤ 5 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ és nyersfehérje ≤ 220 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák	– Fehérjeforrás(ok) – Kalcium – Foszfor – Kálium – Nátrium – Esszenciális zsírsavak (ha hozzáadott)	Kezdetben legfeljebb 6 hónap ⁽³⁾	1. A takarmányt teljes értékű takarmánnyként kell forgalomba hozni. 2. A fehérjék ajánlott emészthetősége: legalább 85 %. 3. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 4. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
		Csökkentett foszforfelszívódás lantán-karbonát-oktahidráttal	Felnőtt kutya	– Fehérjeforrás(ok) – Kalcium – Foszfor – Kálium – Nátrium – Esszenciális zsírsavak (ha hozzáadott) – Lantán-karbonát-oktahidráttal	Kezdetben legfeljebb 6 hónap ⁽³⁾	1. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 2. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
		Jó minőségű fehérjék és foszfor $\leq 6,5$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ és nyersfehérje ≤ 320 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Macskák	– Fehérjeforrás(ok) – Kalcium – Foszfor – Kálium – Nátrium – Esszenciális zsírsavak (ha hozzáadott)	Kezdetben legfeljebb 6 hónap ⁽³⁾	1. A takarmányt teljes értékű takarmánnyként kell forgalomba hozni. 2. A fehérjék ajánlott emészthetősége: legalább 85 %. 3. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 4. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
		Csökkentett foszforfelszívódás lantán-karbonát-oktahidráttal	Felnőtt macska	– Fehérjeforrás(ok) – Kalcium – Foszfor – Kálium – Nátrium	Kezdetben legfeljebb 6 hónap ⁽³⁾	1. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 2. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
				– Esszenciális zsírsavak (ha hozzáadott) – Lantán-karbonát-ok-tahidrárt		
		Nagy, több mint 8,8 MJ/kg energia-sűrűség 12 %-os nedvességtartalmú takarmányban. Könnyen emészthető és nagyon kellemes ízű keményítőforrás. Korlátozott fehérjetartalom: nyersfehérje ≤ 106 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú takarmányban. Nátriumszint: 2 g/100 kg testtömeg/nap. Az ejkozapentaénsav és a dokozahe- xaénsav magas összege, ≥ 0,2 g/kg testtömeg^{0,75} naponta	Lófélék	– Fehérje- és energiaforrás(ok) – Kalcium – Foszfor – Kálium – Magnézium – Nátrium – Eikozapentaénsav és dokozahe- xaénsav összesen	Kezdetben legfeljebb hat hónap. Hosszú távon, vagy a probléma megoldódásáig	1. A takarmányt kiegészítő takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” – A kiegészítő takarmány hipernatrémia és hiperklorémia esetén nem használható. – A kiegészítő takarmánynak legalább 10–20 %-kal kell hozzájárulnia a napi energiaellátáshoz (körülbelül napi 0,05–0,1 MJ/kg testtömeg^{0,75}). 3. Az adagnak több mint 0,62 MJ/kg testtömeg^{0,75} napi energiaellátást kell biztosítania. 4. Az adag naponta nem haladhatja meg az 50 mg kalcium/kg szárazanyag-tartalmat. 5. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
11.	Oxalátkő-képződés csökkenése	Alacsony kalciumtartalom, alacsony D-vitamintartalom, vizeletlúgosító tulajdonságok	Kutyák és macskák	– Foszfor – Kalcium – Nátrium – Magnézium – Kálium – Kloridok – Kén – D-vitamin (összesen) – Hidroxiprolin – Vizeletlúgosító anyagok	Legfeljebb 6 hónap	A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	Glükózellátás szabályozása (Diabetes mellitus)	Összes cukor (mono- és diszacharidok) ≤ 62 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák és macskák	– Szénhidrátforrás(ok) – Szénhidrátok előkezelése, ha szükséges – Keményítő – Összes cukor – Fruktóz (ha hozzáadott) – Esszenciális zsírsavak (ha hozzáadott) – Rövid és közepes szénláncú zsírsavforrás(ok) (ha hozzáadott)	Kezdetben legfeljebb 6 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmánnyként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Alacsony mono- és diszacharid-tartalom” – „Felhasználás előtt és a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
13.	Valamely összetevővel vagy táplálóanyaggal szembeni érzékenység csökkentésére ⁽⁴⁾	Válogatott és korlátozott számú fehérjeforrás(ok) és/vagy hidrolizált fehérjeforrás(ok) és/vagy válogatott szénhidrátforrás(ok)	Kutyák és macskák	– Fehérjeforrások, beleértve adott esetben a kezelést (ha hozzáadott) – Szénhidrátforrások, beleértve adott esetben a kezelést (ha hozzáadott) – Esszenciális zsírsavak (ha hozzáadott)	3–8 hét: ha az intolerancia jelei megszűnnek, ez a takarmány kezdetben legfeljebb egy évig használható.	1. A takarmányt teljes értékű takarmánnyként kell forgalomba hozni. 2. Ajánlott a fő fehérjeforrások számát 3-ra korlátozni. 3. A címkén feltüntetendő: – Az alapvető táplálkozási jellemzők megfelelő kombinációja, az esettől függően – „Felhasználás előtt és a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
14.	Cisztinkőképződés csökkentése	Vizeletlúgosító tulajdonságok és nyersfehérje ≤ 160 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ vagy A tisztin- és ciszteintartalom korlátozására kiválasztott fehérjék (pl. kazein, borsófehérje, szójafehérje), valamint nyersfehérje ≤ 220 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák	– Kéntartalmú aminosavak (összesen) – Fehérjeforrások – Nátrium – Kálium – Kloridok – Vizeletlúgosító anyagok (ha hozzáadott)	Kezdetben legfeljebb 6 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmánnyként kell forgalomba hozni. 2. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.” 3. A címkén feltüntetendő: – „Vizeletlúgosító tulajdonságok és alacsony fehérjetartalom” vagy „Alacsony válogatottfehérje-tartalom” (értelemszerűen). – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
						4. Az állatorvos vagy táplálkozási szakértő figyelmébe: A lúgosító tulajdonságok azt jelentik, hogy a takarmányt úgy kell összeállítani, hogy a vizelet pH-értéke $\text{pH} \geq 7$ legyen.
15.	Táplálkozással történő felépülés, gyógyulás ⁽²⁾	Könnyen emészthető összetevők, kg-onként ≥ 3520 kcal energiasűrűség és ≥ 250 g nyersfehérje 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák	– Könnyen emészthető összetevőforrások, és adott esetben azok kezelése – Energiaérték	Amíg a felépülés be nem következik	1. A szárazanyag és a szerves anyag ajánlott látszólagos emészthetősége legalább 80 %, illetve legalább 85 %. 2. Abban az esetben, ha a takarmányt egyenesen az emésztőszervi rendszerbe juttatják, a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő: „Alkalmazása állatorvosi felügyelet mellett.” 3. A címkén fel lehet tüntetni azokat a különleges körülmény(ek)et is, amelyek esetére a diétás takarmányt szánják. 4. A címkén feltüntetendő: „Magas energiatartalom, létfontosságú táplálóanyagok és jól emészthető összetevők magas koncentrációja”
		Könnyen emészthető összetevők, kg-onként ≥ 3520 kcal energiasűrűség és ≥ 270 g nyersfehérje 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Macskák			
16.	Urátkőképződés csökkentése	nyersfehérje ≤ 130 g 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ vagy nyersfehérje ≤ 220 g 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ és válogatott fehérjeforrások	Kutyák	– Fehérjeforrás(ok)	Legfeljebb 6 hónap, de a húgysavanyagcsere irreverzibilis (helyre nem állítható) zavara esetén a teljes élettartam folyamán adagolható	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A fehérjeforrás kiválasztásakor figyelembe kell venni a fehérje minőségét és a purintartalmát. Az alacsony purintartalmú, kiváló minőségű válogatott fehérjeforrások közé tartozik a tojás, a kazein, a szójafehérje és a kukoricaglutén. 3. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.” 4. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” – „Alacsony fehérjetartalom” vagy „Korlátozott mennyiségű fehérjetartalom és válogatott fehérjeforrások”.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		nyersfehérje ≤ 317 g 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Macskák			1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A fehérjeforrás kiválasztásakor figyelembe kell venni a fehérje minőségét és a purintartalmát. Az alacsony purintartalmú, kiváló minőségű válogatott fehérjeforrások közé tartozik a tojás, a kazein, a szójafehérje és a kukoricaglutén. 3. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” – „Korlátozott fehérjetartalom” 4. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
17.	Struvitkövek feloldása ⁽⁶⁾	A vizelet struvittelítettségét csökkentő ⁽⁷⁾ tulajdonságok és/vagy Vizeletsavasító tulajdonságok ⁽⁸⁾ és Magnézium $\leq 1,8$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák és macskák	– Foszfor – Kalcium – Nátrium – Magnézium – Kálium – Klorid – Kén	5–12 hét	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” – „A vizelet struvittelítettségét csökkentő tulajdonságok és/vagy vizeletsavasító tulajdonságok.” 3. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.” 4. A takarmány telítettségcsökkentő és/vagy savasító tulajdonságait alátámasztó megfelelőségi nyilatkozatot kérésre az érintett illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.
18.	Struvitkövek kiújulásának csökkentése ⁽⁶⁾	Teljes értékű takarmány a struvit tekintetében a vizelet telítettségét csökkentő ⁽⁷⁾ vagy metastabilizáló ⁽⁹⁾ tulajdonsággal és/vagy Vizeletsavasító tulajdonsággal rendelkező takarmány ⁽⁸⁾ és	Kutyák és macskák	– Foszfor – Kalcium – Nátrium – Magnézium – Kálium – Klorid – Kén	Kezdetben legfeljebb 6 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” – „A struvit tekintetében a vizelet telítettségét csökkentő vagy metastabilizáló tulajdonságok és/vagy vizeletsavasító tulajdonságok”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Magnézium $\leq 1,8$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾				3. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.” 4. A takarmány telítettséget csökkentő vagy metasztabilizáló és/vagy savasító tulajdonságait alátámasztó megfelelőségi nyilatkozatot kérésre az érintett illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.
19.	Rossz emésztés kiegyenlítése ⁽¹⁰⁾	Könnyen emészthető takarmány: látszólagosan emészthető – alacsony rosttartalmú takarmány (nyersrost ≤ 44 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾): nyersfehérje ≥ 85 % nyerszsír ≥ 90 % vagy – rosttal dúsított takarmány (nyersrost > 44 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾): nyersfehérje ≥ 80 % nyerszsír ≥ 80 %	Kutyák és macskák	– Könnyen emészthető összetevőforrások, és adott esetben azok kezelése	Kezdetben legfeljebb 12 hét, de krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén az egész élettartam folyamán alkalmazható	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Könnyen emészthető takarmány” – „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
20.	Bélrendszeri felszívódási (abszorpció) rendellenességek csökkentése	Könnyen emészthető takarmány: látszólagosan emészthető – alacsony rosttartalmú takarmány (nyersrost ≤ 44 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾): nyersfehérje ≥ 85 % nyerszsír ≥ 90 % vagy – rosttal dúsított takarmány (nyersrost > 44 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾): nyersfehérje ≥ 80 % nyerszsír ≥ 80 %	Kutyák és macskák	– Könnyen emészthető összetevőforrások, és adott esetben azok kezelése – Nátrium – Kálium	Legfeljebb 12 hét	A címkén feltüntetendő: – „Magas nátrium- és káliumtartalmú, könnyen emészthető takarmányok” – „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		és nátrium $\geq 1,8$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ és kálium ≥ 5 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾				
21.	Akut bélrendszeri felszívódási (abszorpció) rendellenességek csökkentése	Megnövelt elektrolittartalom: – nátrium: $\geq 1,8$ % – kálium: $\geq 0,6$ % és könnyen emészthető szénhidrátok: – ≥ 32 %	Kutyák és macskák	– Nátrium – Kálium – Szénhidrátforrás(ok)	1–7 nap	1. A takarmányt kiegészítő takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Akut hasmenés vagy abból való lábadozás idején” – „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 3. Szilárd takarmányok esetében az ajánlott elektrolittartományt a normál napi önkéntes vízbevitel alapján kell kiszámítani.
22.	Lipidanyagcsere támogatása hiperlipidémia esetén	Zsír ⁽¹¹⁾ ≤ 110 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽¹²⁾	Kutyák és macskák	– Nyerszsír	Kezdetben legfeljebb 2 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” – „Alacsony zsírtartalom”
23.	Májfunkciók segítése krónikus májelégtelenség esetén	Mérsékelt fehérjetartalom: nyersfehérje ≤ 279 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű, kutyáknak szánt takarmányban ⁽²⁾ nyersfehérje ≤ 370 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű, macskáknak szánt takarmányban ⁽²⁾ és válogatott fehérjeforrás(ok) és étrendi fehérje ajánlott emészthetősége: ≥ 85 %	Kutyák és macskák	– Fehérjeforrás(ok) – Réz (összesen) – Nátrium	Kezdetben legfeljebb 4 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. Példák válogatott fehérjeforrásokra a könnyen emészthetőség alapján: tejfehérjék (tejsavókazein, tej, túró, egyéb állati fehérjék (tojás, baromfi) és növényi fehérjék (szója) 3. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.” 4. A címkén feltüntetendő: – „Mérsékelt fehérjetartalom, válogatott és könnyen emészthető” – „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Alacsony fehérjetartalom, de jó minőségű és könnyen emészthető szénhidrátok	Lófélék	– Fehérje- és rostforrások. – Könnyen emészthető szénhidrátok, és adott esetben azok kezelése – Metionin – Kolin – 3-as szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)	Kezdetben legfeljebb 6 hónap	1. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 2. Iránymutatást kell adni az etetés módjára vonatkozóan, ideértve a napi többszöri, kisebb adagokban történő etetést is.
24.	Szív működése segítése krónikus szívelégtelenség esetén	Korlátozott nátriumtartalom: nátrium $\leq$ 2,6 g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák és macskák	– Magnézium – Kálium – Nátrium	Kezdetben legfeljebb 6 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
25.	Túlzott testtömeg csökkentése	Metabolizálható energia < 3060 kcal/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽¹³⁾ vagy Metabolizálható energia < 560 kcal/kg 85 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽¹³⁾	Kutyák	– Energiaérték	A meghatározott testtömeg eléréséig, és azt követően, ha szükséges, a testtömeg fenntartása érdekében	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A minimális követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a túlzott testtömeg csökkentésére használt takarmány tápanyagszintjét megfelelően növelni kell a korlátozott napi energiabevitel kompenzálása céljából ⁽¹⁴⁾ . 3. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” – „A macskák esetében az étrend megkezdésekor átmeneti időszak javasolt.” – „A hatékony testsúlycsökkenés vagy az optimális testsúly megtartása érdekében az ajánlott napi energiabevitel nem léphető túl.”
		Metabolizálható energia < 3190 kcal/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽¹³⁾ vagy < 580 kcal/kg metabolizálható energia 85 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽¹³⁾	Macskák			

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	Bőrfunkció erősítése dermatózis és erős szőrhullás esetén	Linolénsav $\geq 12,3$ g/kg, valamint összes eikozapentaénsav és dokozahexaénsav $\geq 2,9$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák és macskák	- Linolénsav - Eikozapentaénsav és dokozahexaénsav összesen	Kezdetben legfeljebb 2 hónap	A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” „Magas linolénsav-tartalom (LA), valamint az eikozapentaénsav (EPA) és a dokozahexaénsav (DHA) összege”
		Linolénsav $\geq 18,5$ g/kg, valamint összes eikozapentaénsav és dokozahexaénsav $\geq 0,39$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák			
		Linolénsav $\geq 18,5$ g/kg, valamint összes eikozapentaénsav és dokozahexaénsav $\geq 0,09$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Macskák			
27.	Ízületi funkciók elősegítése ízületi gyulladás (ostheoarthritis) esetén	összes omega-3 zsírsav ≥ 29 g/kg és eikozapentaénsav $\geq 3,3$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ és megfelelő E-vitamin-tartalmak	Kutyák	- Omega-3 zsírsavak (összesen) - Eikozapentaénsav (összesen) - E-vitamin (összesen)	Kezdetben legfeljebb 3 hónap	A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
		összes omega-3 zsírsav $\geq 10,6$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ és dokozahexaénsav $\geq 2,5$ g/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾ és magasabb metionin- és mangántartalom megfelelő E-vitamin-tartalom.	Macskák	- Omega-3 zsírsavak (összesen) - Dokozahexaénsav (összesen) - Metionin (összesen) - Mangán (összesen) - E-vitamin (összesen)		

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	Réztartalom csökkentése a májban	Korlátozott mennyiségű réz: réz $\leq 8,8$ mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák	Réz (összesen)	Kezdetben legfeljebb 6 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
29.	A takarmány jódtartalmának csökkentése pajzsmirigy-túlműködés esetén	Korlátozott jódtartalom: jód $\leq 0,26$ mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Macskák	Jód (összesen)	Kezdetben legfeljebb 3 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
30.	Támogatás stresszhelyzetekben, ami a járvékos viselkedések csökkenését eredményezi	1–3 g/kg tripszinnel hidrolizált szarvasmarha-kazein 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban ⁽²⁾	Kutyák	Tripszinnel hidrolizált szarvasmarha-kazein	Kezdetben legfeljebb 2 hónap	1. A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni. 2. A címkén feltüntetendő: – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
50.	Az ivarzási időszakra és a szaporodásra való felkészülés elősegítése	– Magas szeléntartalom és sertések esetében 50 mg, nyulak esetében 35 mg, kutyák, macskák és vidramenyét esetében 88 mg minimum E-vitamin-tartalom, a 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmány egy kilogrammjában; juhfélék esetében 100 mg, szarvasmarhák esetében 300 mg és lovak esetében 1 100 mg minimum E-vitamin-tartalom állatonként és naponta vagy – magas A- és/vagy D-vitamin-tartalom és/vagy állatonként és naponta minimum 300 mg béta-karotin-tartalom.	Emlősök	Az egyes hozzáadott nyomelemek és vitaminok nevei és teljes mennyiségei.	– Tehenek: a vemhesség végét megelőző két héttől az új vemhesség megerősítéséig – Kocák: Az ellést megelőző 7. naptól az ellés utáni 3. napig, valamint a párzást megelőző 7. naptól a párzás utáni 3. napig – Egyéb nőtény emlősök: a vemhesség utolsó szakaszától az új vemhesség megerősítéséig	1. A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. 2. A takarmány használati utasításának biztosítása kell a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított, releváns maximális tartalom betartását. 3. A takarmány címkézésén fel kell tüntetni azokat a helyzeteket, amelyekben a takarmány felhasználása helyénvaló.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.			– Hímek: szaporító tevékenység időszakai-ban	
		– Jelentős A-vitamin-tartalom és/vagy D-vitamin-tartalom vagy – magas szelén- és/vagy cinktartalom és/vagy minimum 40 mg/kg E-vitamin-tartalom 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban. A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, cinket, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.	Madarak	Az egyes hozzáadott nyomelemek és vitaminok nevei és teljes mennyiségei.	– Nőstények: az ivarzás időszakában – Hímek: szaporító tevékenység időszakai-ban	
51.	Pata, köröm és bőr regenerálódásának elősegítése	Magas cinktartalom. A kiegészítő takarmány tartalmazhat cinket a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.	Lovak, kérődzők, sertések	– Cink (összesen) – Metionin (összesen) – Biotin (ha hozzáadott)	Legfeljebb 8 hét	1. A takarmány használati utasításának biztosítása kell a cinkre vonatkozóan a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását. 2. A bólusz formájában történő alkalmazás kérődzők esetében engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából.
52.	Az étrendiátállás során fellépő táplálkozási egyenlőtlenségek támogatása	Minimális ellátás a következő diétás takarmányok révén: – szelén: 0,1 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban és/vagy – cink: 15 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban és/vagy	Kérődzők Sertések Nyulak Baromfi	A tápértékkel rendelkező adalékanyagok neve és teljes mennyisége, ha szükséges	2–15 nap	1. A bólusz formájában történő alkalmazás kérődzők és sertések esetében engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. 2. A takarmány használati utasításának biztosítása kell a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított, releváns maximális tartalom betartását.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		– réz: 2 mg/kg, 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmány juhok esetében és 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban más fajok esetében és/vagy – A-vitamin: 2000 IU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban és/vagy – D-vitamin 400 IU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban és/vagy – E-vitamin: 35 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban baromfi esetében, 10 mg/kg, 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban kérődzők esetében, 40 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban nyulak esetében és 20 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban sertések esetében. A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, cinket, rezet, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.				3. A takarmány címkézésén fel kell tüntetni azokat a helyzeteket, amelyekben a takarmány felhasználása helyénvaló.
53.	Az elválasztás támogatása	Minimális ellátás a következő diétás takarmányok révén: – szelén: 0,1 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban	Emlősök	A tápértékkel rendelkező adalékanyagok neve és teljes mennyisége, ha szükséges	Legfeljebb 4 hét az elválasztás idején	1. A takarmány használati utasításának biztosítása kell a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított, releváns maximális tartalom betartását. 2. A takarmány címkézésén fel kell tüntetni azokat a helyzeteket, amelyekben a takarmány felhasználása helyénvaló.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		és/vagy – cink: 15 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban és/vagy – réz: 2 mg/kg, 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmány juhok esetében és 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban más fajok esetében és/vagy – jód: 0,2 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban és/vagy – mangán: 20 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban és/vagy – A-vitamin: 1500 IU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban és/vagy – D-vitamin 400 IU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban és/vagy – E-vitamin: 100 mg/kg, 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmány borjak esetében és 50 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban bárányok, gidák és malacok esetében. A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, cinket, rézet, jódot, mangánt, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.				

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
54.	A bőr és a végtagok regenerációjának elősegítése	- Minimálisan biztosítandó cinkvegyületek olyan diétás takarmány révén, amely legalább 20 mg/kg-nak felel meg a 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban - és - nagy mennyiségben tartalmazza az alábbiakat: réz és/vagy jód és/vagy szelén - és/vagy B6-vitamin és/vagy E-vitamin és/vagy A-vitamin - és/vagy metionin és/vagy cisztin és/vagy minimálisan biztosítandó 0,4 mg biotin 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű, kérődzőknek szánt takarmányban. A kiegészítő takarmány tartalmazhat cinket, rezet, jódot, szelént, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.	Emlősök és baromfi	A tápértékkal rendelkező adalékanyagok neve és teljes mennyisége, ha szükséges	- Legfeljebb 8 hét - A kérődzőknek szánt, biotint tartalmazó kiegészítő takarmányok: Legfeljebb 6 hónap	- A takarmány használati utasításának biztosítania kell a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított, releváns maximális tartalom betartását. - A takarmány címkézésén fel kell tüntetni azokat a helyzeteket, amelyekben a takarmány felhasználása helyénvaló.
55.	A víz- és elektrolit-egyensúly stabilizálása a fiziológiai emésztés segítése érdekében	- Főként elektrolitok: nátrium, kálium és kloridok - Pufferkapacitás (¹⁹) folyékony takarmány esetén: legalább 60 mmol/l felhasználásra előkészített ital - Könnyen emészthető szénhidrátok	Borjak, malacok, bárányok, gidák, csikók	- Nátrium - Kálium - Kloridok - Szénhidrátforrás(ok) - Bikarbonátok és/vagy citrátok (ha hozzáadott)	1–7 nap	- A felhasználásra előkészített ital literenkénti javasolt elektrolittartománya: nátrium: 1,7–3,5 g kálium: 0,4–2 g kloridok: 1 g–2,8 g - Szilárd takarmányok esetében az ajánlott elektrolittartományt a normál napi önkéntes vízbevitel alapján kell kiszámítani.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
						3. A címkén feltüntetendő: – „Emésztési zavarok (hasmenés) veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.” – „Felhasználás előtt vagy a felhasználási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.” 4. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: – A felhasználásra előkészített ital és adott esetben tej javasolt bevitel. – Ha a kérődzők takarmányozására előkészített ital bikarbonát- és/vagy citráttartalma meghaladja a 40 mmol/l-t: „Oltógyomorral (abomasum) rendelkező állatoknál ne alkalmazza tejjel együtt.”
56.	Tetánia kockázatának csökkentése (hypomagnesaemia)	Magas magnéziumtartalom, könnyen hozzáférhető szénhidrátok, mérsékelt fehérjetartalom és alacsony káliumtartalom	Kérődzők	– Keményítő – Cukor (összesen) – Magnézium – Nátrium – Kálium	3–10 hétig a gyors fűnövekdedési szakaszok alatt	1. A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. 2. A megfelelő használatra vonatkozó utasításban iránymutatást kell adni a rost és könnyen hozzáférhető energiaforrások napi adagjának kiegyensúlyozását illetően. 3. Juhoknak szánt takarmányok esetében a címkén feltüntetendő: „Különösen tejelő anyajuhok számára.”
57.	Acidózis kockázatának csökkentése	Könnyen fermentálható szénhidrátok alacsony szintje és magas pufferkapacitás	Kérődzők	– Keményítő – Cukor (összesen)	Legfeljebb 2 hónap ⁽¹⁵⁾	1. A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. 2. A megfelelő használatra vonatkozó utasításban iránymutatást kell adni a rost és könnyen fermentálható energiaforrások napi adagjának kiegyensúlyozását illetően. 3. Tejelő teheneknek szánt takarmányok esetében a címkén feltüntetendő: „Különösen nagy tejhozamú tehenek számára.” 4. Hízalásra tartott kérődzőknek szánt takarmányok esetében a címkén feltüntetendő: „Különösen intenzíven takarmányozott számára ⁽¹⁶⁾.”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
58.	Húgykőképződés kockázatának csökkentése	Alacsony foszfortartalom és magnéziumtartalom, vizeletsavasító tulajdonságok	Kérődzők	– Kalcium – Foszfor – Nátrium – Magnézium – Kálium – Kloridok – Kén – Vizeletsavasító anyagok	Legfeljebb 6 hét	1. A címkén feltüntetendő: „Különösen intenzíven takarmányozott fiatal állatok számára.” 2. A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
59.	Legelő állatok nyomelemekkel és/vagy vitaminokkal való hosszú távú ellátása	Nagy mennyiségben tartalmazza az alábbiakat: – nyomelemek és/vagy – vitaminok, provitaminok és olyan kémiai jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatásai vannak. A kiegészítő takarmány tartalmazhat takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmányra megállapított maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.	Kifejlett bődélvel rendelkező kérődzők	– Az egyes hozzáadott nyomelemek, vitaminok, provitaminok és hasonló hatással bíró, kémiai jól meghatározott anyagok neve és teljes mennyiségei – Bólusz használata esetén az egyes nyomelemek és/vagy vitaminok napi hatóanyag-leadási rátája – Bólusz használata esetén a nyomelemek vagy vitaminok folyamatos leadásának maximális időtartama	Legfeljebb 12 hónap	1. A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiai nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. 2. A címkén feltüntetendő: – „Adott esetben elkerülendő a bóluszban található adalékanyagoktól eltérő forrásokból származó maximális tartalommal rendelkező adalékanyagok egyidejű adása. – Használat előtt ajánlott kikérni állatorvos vagy táplálkozási szakértő tanácsát az alábbiakról: a) a nyomelemek egyensúlya a napi adagban; b) az állomány státusza a nyomelemek tekintetében”.
60.	Az ellési bérulás és a tünetmentes hipokalcémia kockázatának csökkentése	Alacsony kation/anion arány A teljes adagra vonatkozóan: – a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok általi savasodás minimuma: 100 mEq/kg szárazanyag – cél: $0 < \text{DCAD}^{(1)}$ (mEq/kg szárazanyag) < 100	Tejelő tehenek	– Kalcium – Foszfor – Magnézium – Nátrium – Kálium – Kloridok – Kén	3 héttel az ellés előtt kezdve egészen az ellésig	A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Az adagolását ellés után be kell szüntetni.”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		vagy				
		Zeolit (nátrium-alumínium-szilikát): 250–500 g/nap		Nátrium-alumínium-szilikát	3 héttel az ellés előtt kezdve egészen az ellésig	A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: – „A takarmány mennyiségének meghatározásakor biztosítani kell, hogy a nátrium-alumínium-szilikát napi bevétele ne lépje túl az állatonkénti 500 grammot.” – A felhasználást időtartamát legfeljebb 2 hétre kell korlátozni. – „Az adagolását ellés után be kell szüntetni.”
		vagy Fitinsavban gazdag (> 6 %), < 0,2 %-os kalciumtartalmú, bendővédett takarmányalapanyag-ellátás, tehenenként napi legalább 28 g és legfeljebb 32 g rendelkezésre álló kalcium eléréséhez. vagy		– Kalcium	4 héttel az ellés előtt kezdve egészen az ellésig	A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Az adagolását ellés után be kell szüntetni.”
		Magas kalciumtartalom nagy mennyiségben rendelkezésre álló kalciumforrások formájában: kalcium-klorid és/vagy kalcium-szulfát és/vagy dikalcium-foszfát és/vagy kalcium-karbonát és/vagy kalcium-propionát és/vagy kalcium-formiát és/vagy „egyéb, hasonló hatású kalciumforrás”, amely tehenenként és naponta legalább napi 50 g kalciumot biztosít e források egy vagy több kombinációja által vagy		– Kalcium – Kalciumforrások	Az ellés első jeleitől két-napos korig Ellés után	1. A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. 2. A használati utasításban meg kell adni az alkalmazások számát, valamint az ellés előtti és utáni időszakot. 3. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt takarmányozási szakértő véleményének kikérése javasolt.”
		Kalcium-pidolát: minimum 5,5 g per tehén/nap vagy		– Kalcium – Kalcium-pidolát	Az ellés első jeleitől az ellést követő két napig	1. A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
						2. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt takarmányozási szakértő véleményének kikérése javasolt.”
		Dél-amerikai csucsorból készült dara, amely naponta 38–46 µg 1,25 dihidroxi-kolekalciferol-glikozid leadását teszi lehetővé		– Dél-amerikai csucsorból készült dara – 1,25 dihidroxi-kolekalciferol-glikozid tartalom – Nyersrost – Magnézium – Nyerszsír – Keményítő – D3-vitamin kolekalciferol formájában (összesen)	Az ellés előtti két naptól vagy az első jeleitől kezdve az ellést követő két napig	1. A bólsz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólsz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. 2. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt takarmányozási szakértő véleményének kikérése javasolt.”
61.	Ketózis kockázatának csökkentése ⁽¹⁸⁾	– minimálisan biztosítandó propán-1,2-diol vagy propilénlikol: tejelő tehenek esetében 250 g/nap anyajuhok vagy kecskék esetében 50 g/nap - vagy – minimálisan biztosítandó propionátok (kalciumsók vagy nátriumsók): tejelő tehenek esetében 110 g/nap anyajuhok vagy kecskék esetében 22 g/nap - vagy – propán-1,2-diolból és propionátokból (nátrium- vagy kalciumsók) együttesen biztosítandó minimum, úgy, hogy teljesüljön a következő: – a propán-1,2-diol és a propionátok tejelő teheneknek szánt kombinációja a következő: propionátok + 0,44 x propán-1,2-diol > 110 g/nap	Tejelő tehenek, anyajuhok és kecskék	– Propán-1,2-diol, ha hozzáadott – Propionátok nátrium- vagy kalciumsók formájában, ha hozzáadott	Tejelő tehenek esetében az ellés előtti három hét és az ellés utáni hat hét közötti időszak Anyajuhok és kecskék esetében az ellése előtti hat hét és az ellés utáni három hét közötti időszak	1. A bólsz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólsz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából. 2. A címkén feltüntetendő: „Kalcium- vagy nátrium-propionátokkal a vemhesség végén történő ellátás során a hipokalcémiára tekintettel értékelni kell az ásványianyagok egyensúlyát.”

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		– a propán-1,2-diol és a propionátok anyajuhoknak és kecskéknél szánt kombinációja a következő: propionátok + 0,44 x propán-1,2-diol > 22 g/nap.				
62.	Stresszreakciók csökkentése	– Magas magnéziumtartalom és/vagy – könnyen emészthető összetevők	Sertések	– Magnézium – Könnyen emészthető összetevők és adott esetben azok kezelése. – 3-as szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)	1–7 nap	Iránymutatást kell adni az olyan helyzetekről, amikor helyénvaló e takarmány felhasználása.
63.	Szorulás kockázatának csökkentése	Bélcsatornán való áthaladást serkentő anyagok	Kocák	Bélcsatornán való áthaladást serkentő anyagok	10–14 napig ellés előtt és 10–14 napig ellés után	
64.	Születés utáni vashiány kompenzálása	Jelentős mennyiségben tartalmaz az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” kategória „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportja tekintetében engedélyezett vasvegyületeket. A kiegészítő takarmány tartalmazhat vasat a teljes értékű takarmányra megállapított releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.	Szopós malacok és borjak	Vas (összesen)	Születés után legfeljebb 3 hétig	A használati utasításának biztosítása kell a vas tekintetében a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
65.	Rossz felszívódás (malabszorpció) kiegyenlítése	Alacsony telített zsírsavtartalom és magas zsírban oldódó vitamintartalom	Baromfi, li-ba és galamb kivételével	– Telített zsírsavak százalékos aránya az összes zsírsavak vonatkozásában – A-vitamin (összesen) – D-vitamin (összesen) – E-vitamin (összesen) – K-vitamin (összesen)	Kelés után az első 2 hétben	
66.	A zsírmáj szindróma kockázatának csökkentése	Alacsony energiatartalom és sok többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazó zsírokból származó metabolizálható energia	Tojótúkok	– Energiaérték (az EK-módszerrel számítva) – Zsírokból származó metabolizálható energia százalékos aránya – Többszörösen telítetlen zsírsavtartalom	Legfeljebb 12 hét	
67.	Sportteljesítményre való felkészülés és sportteljesítményt követő felépülés támogatása	Magas szeléntartalom és minimum 50 mg/kg E-vitamin-tartalom 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban. A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelénvegyületeket a teljes értékű takarmány tekintetében rögzített, vonatkozó maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.	Lófélék	– E-vitamin (összesen) – Szelén (összesen)	A sportteljesítmény előtt legfeljebb 8 hétig – a sportteljesítmény után legfeljebb 4 hétig	A takarmány használati utasításának biztosítása kell a szelénre vonatkozóan a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
68.	Erős izzadásra visszavezethető elektrolitvesztés pótlása	Nátrium-kloridot kell tartalmaznia, és jó, ha kálium-kloridot is tartalmaz. Alacsony magnézium-, kalcium- és a foszfortartalom Más elektrolit sók alkalmazása választható.	Lófélék	– Nátrium – Kloridok – Kálium – Kalcium – Magnézium – Foszfor	Erős izzadást követően egytől három napig	1. Iránymutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben helyénvaló a takarmány felhasználása. 2. A használati utasításnak a takarmány formulációja és kiszemelése szempontjából releváns erőfelfejtés időtartama és intenzitása alapján a beadásra vonatkozó iránymutatásokat kell tartalmaznia.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
						3. A címkén feltüntetendő: – „Víz mindig álljon rendelkezésre.” – Vízrel nem kevert elektrolitok beadása esetében (pl. takarmányban vagy fecskendőben): „A beadás után legalább 20 percig, de lehetőleg 1 órán át biztosítani kell, hogy víz álljon rendelkezésre.” 4. Ezen túlmenően iránymutatást kell adni a későbbi ivás nyomon követésére vonatkozóan; amennyiben elégtelen vízfelvételt figyelnek meg, mérlegelni kell egy állatorvos véleményének kikérését.
						5. Opcionálisan iránymutatást lehet adni az elektrolitok takarmányban vagy fecskendőben történő beadása melletti vízmennyiségre (literben kifejezett) vonatkozóan.
69.	Az energia-anyagcsere és az izomfunkció támogatása rhabdomyolosis esetén	A keményítő és a cukor a rendelkezésre álló energia legfeljebb 20 %-át teheti ki A nyerszsír a rendelkezésre álló energia több mint 20 %-át teszi ki Legalább 350 IU/kg E-vitamin 12 %-os nedvességtartalmú, teljes értékű takarmányban	Lófélék	– Keményítő – Cukor – Nyerszsír – E-vitamin (összesen)	Kezdetben legalább 3 hónapig	1. iránymutatást kell adni az olyan esetekre, amikor az ilyen jellegű takarmány felhasználása helyénvaló. 2. A használati utasításnak a napi adagnak és a megfelelő napi bevitelnek az egyensúlyára vonatkozó iránymutatást kell tartalmaznia. 3. A címkén feltüntetendő: „Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
70.	A vastagbél krónikus emésztési rendellenességeinek javítása	– Keményítőtartalom < 1 g/kg testtömeg/étkezés (< 0,5 g/kg BW/étkezés hasmenés esetén) – Hidrotermikus kezeléssel – például extrudálás, mikronizálás, expandálás vagy pelyhesítés – feldolgozott gabonamagvak, a keményítő vékonybélbeli emésztésének javítása érdekében	Lófélék	– Keményítő – Nyerszsír	Hosszú távon, vagy a probléma megoldódásáig	1. iránymutatást kell adni – azon pontosan meghatározott helyzetekre vonatkozóan, amikor helyénvaló a takarmány használata, különösen tekintettel arra, hogy a termék használható-e olyan állatokban, amelyek hasmenésük van. – az étkezés méretére és a takarmányfelvételre vonatkozóan. 2. A használati utasításnak az olajtartalomtól függően hivatkozni kell a lehetséges fokozatos felhasználásra, és ajánlania kell a hasmenés nyomon követését.

A bejegyzés száma	Különleges táplálkozási cél	Alapvető táplálkozási jellemzők (GP1)	Állatfaj vagy -kategória	A címkén feltüntetendő jellemzők (GP2)	Ajánlott időszak	Egyéb rendelkezések
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		- További vízdíszítő vitaminok és megfelelő ásványi anyagok/elektrolittartalom biztosítása - Olajjal történő további ellátás, ha nem áll fenn hasmenés esete				3. A címkézéssel fel kell tüntetni a gabonamagvak esetében alkalmazott feldolgozás módját.
71.	Vékonybél-funkció krónikus elégtelenségének javítása	- Könnyen emészthető rostok - Kiváló minőségű fehérjeforrások és a nyersfehérje több mint 4,3 %-a lizin - Összes cukor és keményítő legfeljebb 0,5 g/kg testtömeg/étkezés - Hidrotermikus kezeléssel – például extrudálás, mikronizálás, expandálás vagy pelyhesítés – feldolgozott gabonamagvak, a vakbél előtti bélszakasz emésztésének javítása érdekében	Lófélék	- Könnyen emészthető takarmány-alapanyagok, és adott esetben azok kezelése - Összes cukor és keményítő - Fehérjeforrások	Hosszú távon, vagy a probléma megoldódásáig	- Iránymutatást kell nyújtani - azokra a konkrét esetekre vonatkozóan, amelyekben helyénvaló a takarmány felhasználása - az étkezés méretére és a takarmányfelvételre vonatkozóan. - A használati utasításnak az olajtartalomtól függően hivatkozni kell a lehetséges fokozatos felhasználásra, és ajánlania kell a hasmenés nyomon követését.
72.	A fiziológiai emésztés stabilizálása	Az 1831/2003/EK rendelet I. mellékletében említett „bélflóra-stabilizáló” funkcionális csoportba tartozó takarmány-adalékanyagok, vagy – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkében említett, az engedélyezés megújítására irányuló eljárástól függően – a „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok	Állatfajok, amelyek tekintetében a bélflóra-stabilizáló vagy mikroorganizmusok engedélyezettek	A bélflóra-stabilizáló vagy mikroorganizmus neve és hozzáadott mennyisége	Legfeljebb 4 hét	- A címkén feltüntetendő: „Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor. - A takarmány használati utasításának biztosítása kell a bélflóra-stabilizáló vagy mikroorganizmus vonatkozásában a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.

(GP1) A mennyiségi adatok ellenőrzése tekintetében a 767/2009/EK rendelet IV. mellékletében megállapított eltérések alkalmazandók.

(GP2) Ezek a címkén feltüntetendő jellemzők a 767/2009/EK rendeletben meghatározott általános címkézési követelmények mellett alkalmazandók.

(1) Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.

(2) egy 4 000 kcal metabolizálható energia/kg energiasűrűségű szárazanyag-takarmány alapján, amelyet a FEDIAF vonatkozó táplálkozási iránymutatásában ismertetett egyenlet segítségével számíthat ki (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Az értékeket ki kell igazítani, ha az energiasűrűség eltér a 4 000 kcal metabolizálható energia/kg értéktől.

(3) Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási időszak kettő-négy hét.

(4) Speciális érzékenységre alkalmazható takarmány esetén az „összetevő és táplálékanyag” kifejezés helyébe a speciális érzékenységre való hivatkozás lép.

(5) Macskák esetében kiegészíthető a „macskafélék zsírmájára” való hivatkozással.

(6) Macskák esetében kiegészíthető az „macskák alsó húgyúti megbetegedésére” vagy „macskák urológiai szindrómájára – F. U. S.” történő hivatkozással.

(7) Vizelet telítettségét csökkentő tulajdonságok: a vizeletben képződő kristályok és kövek oldását és/vagy kristályok képződését és növekedésének megelőzését elősegítő tulajdonságok.

(8) Legfeljebb 6,5 pH-jú vizelet.

(9) Metastabilizáló tulajdonságok: a vizeletben történő kristályképződés megelőzését elősegítő tulajdonságokkal függ össze.

(10) Kiegészíthető az „exokrin hasnyálmirigy-elégtelenségre” való hivatkozással.

⁽¹¹⁾ A napi adagokban be kell tartani az összes esszenciális zsírsavra vonatkozó, a FEDIAF táplálkozási iránymutatásai (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>) szerinti minimális ajánlásokat.

⁽¹²⁾ Egy 3500 kcal metabolizálható energia/kg energiasűrűségű szárazanyag-takarmány alapján, amelyet a FEDAF vonatkozó táplálkozási iránymutatásában ismertetett egyenlet segítségével számítanak ki. (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Az értékeket ki kell igazítani, ha az energiasűrűség eltér a 3500 kcal metabolizálható energia/kg értéktől.

⁽¹³⁾ Metabolizálható energia/kg, amelyet a FEDIAF macskáknak és kutyáknak szánt hobbiállat-eledelre vonatkozó táplálkozási iránymutatásaiban (2019) ismertetett egyenlet segítségével számítanak ki.

⁽¹⁴⁾ FEDIAF macskáknak és kutyáknak szánt hobbiállat-eledelre vonatkozó táplálkozási iránymutatásai (2019).

⁽¹⁵⁾ Tejelő tehenek takarmánya esetében: „a laktáció kezdetétől számított legfeljebb két hónap”.

⁽¹⁶⁾ Fel kell tüntetni az érintett kérődzőkatagóriát.

⁽¹⁷⁾ $DCAD \text{ (mEq/kg szárazanyag)} = (Na + K) - (Cl + S)$.

⁽¹⁸⁾ A „ketózis” kifejezés helyébe a „acetonémia” kifejezés léphet, és a címkézésért felelős személy ketózisból való lábadozás esetére is ajánlhatja.

⁽¹⁹⁾ A számítás az erőszion-differencia módszere (SID-érték) alapján történt: A SID az erős kationok és az erős anionok koncentrációi összegének a különbsége; $[SID] = [mmol Na^+/l] + [mmol K^+/l] + [mmol Ca^{++}/l] + [mmol Mg^{++}/l] - [mmol Cl^-/l] - [mmol \text{ egyéb erős anionok}/l]$.