

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/415 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2022 година

за разрешаване на употребата на ябълчна киселина, лимонена киселина, получена от *Aspergillus niger* DSM 25794 или CGMCC 4513/CGMCC 5751 или CICC 40347/CGMCC 5343, сорбинова киселина и калиев сорбат, оцетна киселина, натриев диацетат и калциев ацетат, пропионова киселина, натриев пропионат, калциев пропионат и амониев пропионат, мравчена киселина, натриев формат, калциев формат и амониев формат, и млечна киселина, получена от *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 или DSM 23965), *Bacillus smithii* (LMG S-27890) или *Bacillus subtilis* (LMG S-27889), и калциев лактат като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ⁽²⁾.
- (2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на DL-ябълчна киселина, лимонена киселина, сорбинова киселина и калиев сорбат, оцетна киселина, натриев диацетат и калциев ацетат, пропионова киселина, натриев пропионат, калциев пропионат и амониев пропионат, мравчена киселина, натриев формат, калциев формат и амониев формат, както и млечна киселина и калциев лактат като фуражни добавки за всички животински видове. Впоследствие посочените добавки бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент бяха подадени заявления за повторна оценка на DL-ябълчна киселина, лимонена киселина, получена от *Aspergillus niger* DSM 25794 или CGMCC 4513/CGMCC 5751 или CICC 40347/CGMCC 5343, сорбинова киселина и калиев сорбат, оцетна киселина, натриев диацетат и калциев ацетат, пропионова киселина, натриев пропионат, калциев пропионат и амониев пропионат, мравчена киселина, натриев формат, калциев формат и амониев формат, и млечна киселина, получена от *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 или DSM 23965), *Bacillus smithii* (LMG S-27890) или *Bacillus subtilis* (LMG S-27889), и калциев лактат като фуражни добавки за всички животински видове.
- (4) Заявителите поискаха добавките да бъдат класифицирани в категория „технологични добавки“ и във функционална група „консерванти“ или „регулатори на киселинността“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (5) В становището си от 29 януари 2014 г. ⁽³⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба DL-ябълчната киселина не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че добавката дразни кожата, лигавиците и очите, както и че експозицията чрез вдишване представлява риск. Поради това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Органът също така стигна до заключението, че е тя е ефективна като консервант за фуражи.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

⁽²⁾ Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014;12(2):3563.

- (6) В становището си от 27 януари 2015 г. ⁽⁴⁾ Органът заключи, че при предложените условия на употреба лимонената киселина, получена от *Aspergillus niger* DSM 25794, CGMCC 4513/CGMCC 5751 или CICC 40347/CGMCC 5343, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че добавката има потенциално опасно въздействие върху кожата, лигавиците и очите и че експозицията чрез вдишване представлява риск. Поради това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Органът също така заключи, че веществото може да има потенциал да действа като регулатор на киселинността във фуражите. Въпреки това неговата ефикасност като консервант, макар и добре позната в храните, не е доказана в достатъчна степен поради липсата на статистически анализ, предоставен от проектното проучване.
- (7) Въпреки че статистическите доказателства от предоставените изследвания са неубедителни, вече издаденото разрешение за употреба на лимонена киселина в храни за същата функция се счита за достатъчно доказателство за ефективността на веществото като консервант при спазване на условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията ⁽⁵⁾.
- (8) В становищата си от 1 юли 2014 г. ⁽⁶⁾ и 8 септември 2015 г. ⁽⁷⁾ Органът заключи, че при предложените условия на употреба сорбиновата киселина и калиевият сорбат не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че добавките дразнят кожата, очите и дихателните пътища. Поради това Комисията счита, че е необходимо да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавките. Органът също така стигна до заключението, че сорбиновата киселина и калиевият сорбат са разрешени добавки в храните за употреба като консерванти в Съюза. Разумно е да се очаква, че ефектът в храните ще бъде наблюдаван и във фуражите, когато те се използват в сравними концентрации и при сходни условия.
- (9) В становищата си от 1 февруари 2012 г. ⁽⁸⁾ и 6 май 2021 г. ⁽⁹⁾ Органът заключи, че при предложените условия на употреба оцетната киселина, натриевият диацетат и калциевият ацетат не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че разредената киселина се счита за дразнител, докато при по-високи концентрации тя е корозивна и има особен риск за очите. Поради това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Органът също така стигна до заключението, че оцетната киселина, натриевият диацетат и калциевият ацетат са разрешени добавки в храните за употреба като консерванти в Съюза. Разумно е да се очаква, че ефектът в храните ще бъде наблюдаван и във фуражите, когато те се използват в сравними концентрации и при сходни условия.
- (10) В становището си от 16 ноември 2011 г. ⁽¹⁰⁾ Органът заключи, че при предложените условия на употреба пропионовата киселина, натриевият пропионат, калциевият пропионат и амониевият пропионат не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че пропионовата киселина, натриевият пропионат, калциевият пропионат и амониевият пропионат са корозивни за кожата, лигавиците и очите. Поради това Комисията счита, че е необходимо да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавките. Органът също така заключи, че пропионовата киселина, натриевият пропионат, калциевият пропионат и амониевият пропионат могат да имат потенциал да действат като консерванти във фуражите.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(2):4009 и EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(2):4010.

⁽⁵⁾ Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 57).

⁽⁶⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014;12(7):3792.

⁽⁷⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015;13(9):4239.

⁽⁸⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012;10(2):2571.

⁽⁹⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2021;19(5):6615.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011;9(12):2446.

- (11) В становищата си от 17 септември 2014 г. ⁽¹¹⁾, 11 март 2015 г. ⁽¹²⁾, 18 март 2020 г. ⁽¹³⁾, 7 май 2020 г. ⁽¹⁴⁾, 19 март 2020 г. ⁽¹⁵⁾, 24 октомври 2014 г. ⁽¹⁶⁾ и 7 май 2020 г. ⁽¹⁷⁾ Органът заключи, че при предложените условия на употреба мравчената киселина, натриевият формат, калциевият формат и амониевият формат не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че мравчената киселина, натриевият формат и амониевият формат са корозивни. Калциевият формат и натриевият формат не дразнят кожата, но са леко дразнещи за очите и са дразнещи за дихателните пътища с потенциал за сенсibiliзация. Поради това Комисията счита, че е необходимо да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавките. Органът също така заключи, че мравчената киселина, натриевият формат, калциевият формат и амониевият формат имат потенциала да действат като консерванти във фуражите.
- (12) В становищата си от 9 юли 2015 г. ⁽¹⁸⁾, 5 юли 2017 г. ⁽¹⁹⁾ и 12 ноември 2019 г. ⁽²⁰⁾ Органът заключи, че при предложените условия на употреба млечната киселина, получена от *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 или DSM 23965), *Bacillus smithii* (LMG S-27890) или *Bacillus subtilis* (LMG S-27889), и калциевият лактат не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и безопасността на потребителите, нито върху околната среда. Той също така заключи, че млечната киселина е дразнител за очите, корозивна е за кожата и дразни дихателните пътища. Калциевият лактат следа да се счита за дразнител за кожата, очите и дихателните пътища. Поради това Комисията счита, че е необходимо да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавките. Органът също така стигна до заключението, че тъй като млечната киселина и калциевият лактат се използват като консерванти в храни, е разумно да се очаква, че ефектът, наблюдаван в храните, ще бъде наблюдаван и във фуражите, когато тези добавки се използват в сравними концентрации и при сходни условия.
- (13) Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери докладите относно методите за анализ на фуражните добавки във фуражите, представени от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (14) При оценките на DL-ябълчна киселина, лимонена киселина, получена от *Aspergillus niger* DSM 25794 или CGMCC 4513/CGMCC 5751 или CICC 40347/CGMCC 5343, сорбинова киселина и калиев сорбат, оцетна киселина, натриев диацетат и калциев ацетат, пропионова киселина, натриев пропионат, калциев пропионат и амониев пропионат, мравчена киселина, натриев формат, калциев формат и амониев формат, и млечна киселина, получена от *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 или DSM 23965), *Bacillus smithii* (LMG S-27890) или *Bacillus subtilis* (LMG S-27889), и калциев лактат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на DL-ябълчна киселина, лимонена киселина, сорбинова киселина и калиев сорбат, оцетна киселина, натриев диацетат и калциев ацетат, пропионова киселина, натриев пропионат, калциев пропионат и амониев пропионат, мравчена киселина, натриев формат, калциев формат и амониев формат, както и млечна киселина и калциев лактат като фуражни добавки за всички животински видове следва да бъде разрешена.
- (15) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията за разрешаване на DL-ябълчна киселина, лимонена киселина, сорбинова киселина и калиев сорбат, оцетна киселина, натриев диацетат и калциев ацетат, пропионова киселина, натриев пропионат, калциев пропионат и амониев пропионат, мравчена киселина, натриев формат, калциев формат и амониев формат, както и млечна киселина и калциев лактат, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.
- (16) Фактът, че лимонената киселина, сорбиновата киселина и калиевият сорбат, оцетната киселина, пропионовата киселина, натриевият пропионат, амониевият пропионат, мравчената киселина, амониевият формат, натриевият формат, калциевият формат и млечната киселина не са разрешени за употреба като консерванти във вода за пиене, а също и лимонената киселина като регулатор на киселинността, не изключва употребата им в комбинирани фуражи, които се приемат с вода.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014;12(10):3827.

⁽¹²⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015;13(5):4056.

⁽¹³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020;18(4):6076.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020;18(5):6139.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020;18(4):6077.

⁽¹⁶⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014;12(11):3898.

⁽¹⁷⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020;18(5):6137.

⁽¹⁸⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015;13(12):4198.

⁽¹⁹⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(7):4938.

⁽²⁰⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019;17(12):5914.

- (17) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочените в приложението добавки, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „консерванти“ или „регулатори на киселинността“, като добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Посочените в приложението добавки и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 3 октомври 2022 г. в съответствие с правилата, приложими преди 3 април 2022 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на съществуващите запаси.
2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението добавки и са произведени и етикетирани преди 3 април 2023 г. в съответствие с правилата, приложими преди 3 април 2022 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на съществуващите запаси, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.
3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението добавки и са произведени и етикетирани преди 3 април 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 3 април 2022 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на съществуващите запаси, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“.								
Функционална група: „консерванти“								
1a296	DL-ябълчна киселина	Състав на добавката DL-ябълчна киселина ≥ 99,5 % Характеристика на активното вещество DL-ябълчна киселина ≥ 99,5 % C₄H₆O₅ CAS № 6915-15-7 (или 617-48-1) Сулфатна пепел ≤ 0,02 % Фумарова киселина ≤ 1 % Малеинова киселина ≥ 0,05 % Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на ябълчна киселина като общо количество ябълчна киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински видове	-	-	-	1. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 2. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“.								
Функционална група: „консерванти“								
1a330	Лимонена киселина	Състав на добавката Лимонена киселина ≥ 99,5 % (в сухо вещество) Характеристика на активното вещество Лимонена киселина ≥ 99,5 % Безводна форма: C₆H₈O₇ CAS № 77-92-9 Монохидратна форма: C₆H₈O₇·H₂O CAS № 5949-29-1 Сулфатна пепел < 0,05 % Оксалова киселина < 100 mg/kg Получена от: — <i>Aspergillus niger</i> DSM 25794 или — <i>Aspergillus niger</i> CGMCC 4513/CGMCC 5751 или — <i>Aspergillus niger</i> CICC 40347/CGMCC 5343 Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на лимонена киселина като общо количество лимонена киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински и видове	-	-	15 000	1. При смесването на различни източници на лимонена киселина не трябва да се надвишават разрешените максимални количества в пълноценни фуражи. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, които се отглеждат за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „регулатори на киселинността“

1a330	Лимонена киселина	<i>Състав на добавката</i> Лимонена киселина $\geq 99,5$ % (в сухо вещество) <i>Характеристика на активното вещество</i> Лимонена киселина $\geq 99,5$ % Безводна форма: $C_6H_8O_7$ CAS № 77-92-9 Монохидратна форма: $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ CAS № 5949-29-1 Сулфатна пепел $< 0,05$ % Оксалова киселина < 100 mg/kg Получена от: — <i>Aspergillus niger</i> DSM 25794 или — <i>Aspergillus niger</i> CGMCC 4513/CGMCC 5751 или — <i>Aspergillus niger</i> CICC 40347/CGMCC 5343 <i>Метод за анализ</i> ⁽¹⁾ За определянето на лимонена киселина като общо количество лимонена киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински и видове	-	-	15 000	- При смесването на различни източници на лимонена киселина не трябва да се надвишават разрешените максимални количества в пълноценни фуражи. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. - В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
-------	-------------------	--	----------------------------	---	---	--------	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1a200	Сорбинова киселина	Състав на добавката Сорбинова киселина ≥ 99 % В твърдо състояние Активно вещество Сорбинова киселина ≥ 99 % C₆H₈O₂ CAS № 110-44-1 Сулфатна пепел ≤ 0,2 % Алдехиди ≤ 0,1 % Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на сорбинова киселина като общо количество сорбинова киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: високоэффективна течна хроматография с ултравиолетова детекция, HPLC-UV (EN 17298)	Всички животински видове, различни от преживни животни с нефункциониращ търбух Преживни животни с нефункциониращ търбух	-	-	2 500	1. При смесването на различни източници на сорбинова киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
					-	6 700		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1k202	Калиев сорбат	<i>Състав на добавката</i> Калиев сорбат ≥ 99 % В твърдо състояние <i>Активно вещество</i> Калиев сорбат ≥ 99 % C₆ H₇ KO₂ CAS № 24634-61-5 Получен чрез химичен синтез <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на калий във фуражната добавка: — EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектроскопия (AAS), или — EN 15510: атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) За определянето на калиев сорбат като общо количество сорбинова киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: високоэффективна течна хроматография с ултравиолетова детекция, HPLC-UV (EN 17298)	Всички животински видове, различни от преживни животни с нефункционираща търбух Преживни животни с нефункционираща търбух	-	-	2 500 (като сорбинова киселина)	1. Сместа от различни източници на калиев сорбат не трябва да надвишава максимално допустимите стойности в пълноценен фураж. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
-------	---------------	--	---	---	---	------------------------------------	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1a260	Оцетна киселина	Състав на добавката	Домашни птици Прасета Домашни любимци	-	-	2 500	1. При смесването на различни източници на оцетна киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
		Оцетна киселина $\geq 99,8\%$ В точно състояние Характеристика на активното вещество Оцетна киселина $\geq 99,8\%$ $C_2H_4O_2$ CAS № 64-19-7 Вода $\leq 0,15\%$ Нелетливи вещества $\leq 30\text{ mg/kg}$ Мравчена киселина, нейните соли и други окисляеми вещества $\leq 0,5\text{ g/kg}$ Получена чрез химичен синтез включващ производство на целулоза (като страничен продукт) Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на оцетна киселина като общо количество оцетна киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички други животински видове, различни от рибите		-	-		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „консерванти“								
1a262	Натриев диацетат	Състав на добавката Натриев диацетат ≥ 58 % В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Натриев диацетат (безводен и трихидрат) ≥ 58 % NaC₄H₇O₄ CAS № 126-96-5 Оцетна киселина ≥ 39 % Вода ≤ 2 % Нелетливи вещества ≤ 30 mg/kg Мравчена киселина, нейните соли и други окисляеми вещества ≤ 1 g/kg Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на натрий във фуражната добавка: — EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектрометрия (AAS), или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) За определянето на натриев диацетат като общо количество оцетна киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Домашни птици Прасета Домашни любимци Всички други животински видове, различни от рибите	-	-	2 500 (като оцетна киселина)	1. При смесването на различни източници на оцетна киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1a263	Калциев ацетат (безводен и монохидрат)	<i>Състав на добавката</i> Калциев ацетат $\geq 98,7\%$ В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Калциев ацетат $\geq 98,7\%$ $\text{C}_4\text{H}_6\text{CaO}_4$ CAS № 62-54-4 Вода $\leq 6\%$ Нелетливи вещества $\leq 30\text{ mg/kg}$ Мравчена киселина, нейните соли и други окисляеми вещества $\leq 1\text{ g/kg}$ Желязо $\leq 0,5\text{ mg/kg}$ Получен чрез химичен синтез <i>Метод за анализ</i> ⁽¹⁾ За определянето на калций във фуражната добавка: — EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектрометрия (AAS), или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) За определянето на калциев ацетат като общо количество оцетна киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Домашни птици Прасета Домашни любимци	-	-	2 500 (като оцетна киселина)	- При смесването на различни източници на оцетна киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. - В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
			Всички други животински и видове, различни от рибите		-	-		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „консерванти“								
1k280	Пропионова киселина	Състав на добавката Пропионова киселина ≥ 99,5 % В течно състояние Характеристика на активното вещество Пропионова киселина ≥ 99,5 % C₃H₆O₂ CAS № 79-09-4 Нелетливи остатъчни вещества ≤ 0,01 % след изсушаване при температура 140 °C до постоянно тегло. Алдехиди ≤ 0,1 %, изразени като пропионалдехид Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За количественото определяне на пропионова киселина като общо количество пропионова киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински-и видове, различни от прасета и домашни птици Прасета Домашни птици	-	-	-	1. При смесването на различни източници на пропионова киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за свързаните видове. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимите стойности или близки до тях.“	3 април 2032 г.

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1k281	Натриев пропионат	Състав на добавката	Всички животински видове, различни от прасета и домашни птици	-	-	-	1. При смесването на различни източници на пропионова киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за свързаните видове. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
		Натриев пропионат ≥ 98,5 % В твърдо състояние	Прасета		-	30 000 (като пропионова киселина)		
		Характеристика на активното вещество Натриев пропионат ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na CAS № 137-40-6 Загуба при сушене ≤ 4 %, определена чрез изсушаване в продължение на 2 часа при температура 105 °C Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на натрий във фуражната добавка: — EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектроскопия (AAS), или — EN 15510: атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES). За количественото определяне на натриев пропионат като общо количество пропионова киселина във фуражната добавка, премиксите, фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Домашни птици		-	10 000 (като пропионова киселина)		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1a282	Калциев пропионат	Състав на добавката Калциев пропионат ≥ 98 % в сухо вещество В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Калциев пропионат ≥ 98 % C₆H₁₀O₄Ca CAS № 4075-81-4 Загуба при сушене ≤ 6 %, определена чрез изсушаване в продължение на 2 часа при температура 105 °C Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на калций във фуражната добавка: — EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектроскопия (AAS), или — EN 15510: атомноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) За количественото определяне на калциев пропионат като общо количество пропионова киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински и видове, различни от прасета и домашни птици Прасета Домашни птици	-	-	-	1. При смесването на различни източници на пропионова киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
					-	30 000 (като пропионова киселина)		
					-	10 000 (като пропионова киселина)		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1k284	Амониев пропионат	Състав на добавката	Всички животински видове, различни от прасета и домашни птици	-	-	-	1. При смесването на различни източници на пропионова киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
		Препарат от амониев пропионат ≥ 19 %, пропионова киселина ≤ 80 %; вода ≤ 30 % В течно състояние	Прасета		-	30 000 (като пропионова киселина)		
		Характеристика на активното вещество Амониев пропионат $C_3H_9O_2N$ CAS № 17496-08-1 Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на амониевия йон във фуражната добавка: ISO 5664: дестилация и титруване За определянето на амониев пропионат като общо количество пропионова киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Домашни птици		-	10 000 (като пропионова киселина)		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1k236	Мравчена киселина	<i>Състав на добавката</i> Мравчена киселина ($\geq 84,5\%$) В течно състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Мравчена киселина ($\geq 84,5\%$) H_2CO_2 CAS № 64-18-6 Получен чрез химичен синтез <i>Метод за анализ</i> ⁽¹⁾ За определянето на мравчена киселина във фуражни добавки, премикси и фуражи: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински видове	-	-	10 000	- При смесването на различни източници на мравчена киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. - В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
-------	-------------------	---	--------------------------	---	---	--------	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1k237i	Натриев формат	<i>Състав на добавката</i> Натриев формат ≥ 98 % В твърдо състояние Натриев формат ≥ 15 % Мравчена киселина ≥ 75 % Вода ≤ 25 % В точно състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Натриев формат HCO_2Na CAS № 141-53-7 Получен чрез химичен синтез <i>Метод за анализ</i> ⁽¹⁾ За определянето на натрий във фуражните добавки: — EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектрометрия (AAS), или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма (ICP-AES). За определянето на натриев формат като общо количество мравчена киселина във фуражните добавки, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински видове	-	-	10 000 (като мравчена киселина)	1. При смесването на различни източници на мравчена киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за свързаните видове. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременно употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
--------	----------------	--	--------------------------	---	---	---------------------------------	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1a238	Калциев формат	Състав на добавката Калциев формат $\geq 98\%$ В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Калциев формат $\text{Ca}(\text{HCO})_2$ CAS № 544-17-2 Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на калций във фуражната добавка: EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектрометрия (AAS), или EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма (ICP-AES). За определянето на калциев формат като общо количество мравчена киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински видове	-	-	10 000 (като мравчена киселина)	- При смесването на различни източници на мравчена киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за свързаните видове. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. - В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременно употребата на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
-------	----------------	---	--------------------------	---	---	---------------------------------	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1a295	Амониев формат	<i>Състав на добавката</i> Амониев формат $\geq 35\%$ Мравчена киселина $\leq 64\%$ В течно състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Амониев формат $\geq 35\%$ HCO_2NH_4 CAS № 540-69-2 Формамид $< 3\,000\text{ mg/kg}$ Получен чрез химичен синтез <i>Метод за анализ</i> ⁽¹⁾ За определянето на амониев йон във фуражната добавка: ISO 5664: дестилация и титруване За определянето на амониев формат като общо количество мравчена киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински видове, различни от кокошки носачки, свине майки, млекодайки преживни животни, домашни любимци и животни, които не се отглеждат за производство на храни	-	-	2 000 (като мравчена киселина)	1. При смесването на различни източници на мравчена киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за свързаните видове. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
-------	----------------	--	--	---	---	-----------------------------------	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „консерванти“								
1a270	Млечна киселина	Състав на добавката Млечна киселина ≥ 72 % (w/w) В течно състояние Характеристика на активното вещество Млечна киселина: D-млечна киселина ≥ 5 % L-млечна киселина ≥ 95 % C₃H₆O₃ CAS № 79-33-4 Получена чрез ферментация на: <i>Bacillus coagulans</i> (LMG S-26145 или DSM 23965), или <i>Bacillus smithii</i> (LMG S-27890) или <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-27889). Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на млечна киселина като общо количество млечна киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински-и видове, различни от прасета и преживни животни с функционираща търбух Прасета и преживни животни, различни от преживни животни с нефункционираща търбух	-	-	20 000	1. При смесването на различни източници на млечна киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за свързаните видове. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“.

Функционална група: „консерванти“

1a327	Калциев лактат	<i>Състав на добавката</i> Калциев лактат ≥ 98 % (като сухо вещество w/w) В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Калциев лактат ≥ 98 % (C₃H₅O₂)₂ • nH₂O CAS № 814-80-2 Получен чрез химичен синтез <i>Метод за анализ</i> ⁽¹⁾ За определянето на калциев лактат във фуражната добавка: — EN ISO 6869: атомноабсорбционна спектрометрия (AAS), или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) За определянето на калциев лактат като общо количество млечна киселина във фуражната добавка, премиксите и фуражите: йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост IC-CD (EN 17294);	Всички животински видове, различни от прасета и преживни животни с функциониращ търбух	-	-	20 000 (като млечна киселина)	- При смесването на различни източници на млечна киселина не трябва да се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите. - В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимата стойност или близка до нея.“	3 април 2032 г.
					-	30 000 (като млечна киселина)		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>