

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/565,

10. märts 2023,

millega antakse luba kasutada etüülheptanaati, etüül-2-metüülbutanaati, isopentüülatsetaati, 3-metüülbutüül-3-metüülbutanaati, 2-metüülpropioonhapet, 3-metüülbutüülbutanaati, 2-metüülbutüülatsetaati, heks-2-een-1-ooli, heks-2(*trans*)-enaali, allüülheksanaati, allüülheptanaati, linalooli, 2-metüül-1-fenüülpropaan-2-ooli, α -jonooni, β -damaskooni, nootkatooni, β -jonooni, α -irooni, β -damaskenooni, (E)- β -damaskooni, pentadekano-1,15-laktooni, 2-fenüületaani-1-ooli, fenetüülisovaleraati, 4-(*p*-hüdoksüfenüül)butaan-2-ooni, 2-metoksünaftaleeni, 2-isopropüül-4-metüültiasooli ja valentseeni kõigi loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba kasutada etüülheptanaati, etüül-2-metüülbutanaati, isopentüülatsetaati, 3-metüülbutüül-3-metüülbutanaati, 2-metüülpropioonhapet, 3-metüülbutüülbutanaati, 2-metüülbutüülatsetaati, heks-2-een-1-ooli, heks-2(*trans*)-enaali, allüülheksanaati, allüülheptanaati, linalooli, 2-metüül-1-fenüülpropaan-2-ooli, α -jonooni, β -damaskooni, nootkatooni, β -jonooni, α -irooni, β -damaskenooni, (E)- β -damaskooni, pentadekano-1,15-laktooni, 2-fenüületaani-1-ooli, fenetüülisovaleraati, 4-(*p*-hüdoksüfenüül)butaan-2-ooni, 2-metoksünaftaleeni, 2-isopropüül-4-metüültiasooli ja valentseeni kõigi loomaliikide söödalisandina. Seejärel kanti need ained vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b söödalisandite registrisse kui funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“ kuuluvad olemasolevad tooted.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud mitu taotlust lubada eespool nimetatud aineid kasutada kõigi loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (4) Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite kasutamise lubamist ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seepärast võttis taotleja tagasi taotluse lubada kasutada kõiki kõnealuseid aineid joogivees.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 7. märtsi 2012. aasta, ⁽³⁾ 25. aprilli 2012. aasta, ⁽⁴⁾ 17. oktoobri 2012. aasta, ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 13. novembri 2012. aasta, ⁽⁷⁾ 12. märtsi 2013. aasta, ⁽⁸⁾ 10. märtsi 2015. aasta, ⁽⁹⁾ 8. märtsi 2016. aasta, ⁽¹⁰⁾ 20. aprilli 2016. aasta, ⁽¹¹⁾ 12. juuli 2016. aasta, ⁽¹²⁾ 28. veebruari 2019. aasta, ⁽¹³⁾ 18. novembri 2020. aasta ⁽¹⁴⁾ ja 23. märtsi 2022. aasta ⁽¹⁵⁾ arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda kõnealused söödalisandid kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et 2-metüül-1-fenüülpropaan-2-ooli, β -damaskooni, α -irooni, (E)- β -damaskooni, fenüületüülisovaleraadi, 4-(p-hüdroksüfenüül)butaan-2-ooni ja 2-isopropüül-4-metüültiasooli merekeskkonnale ohutu kasutuskogus on hinnanguliselt 0,05 mg sööda kg kohta.
- (6) Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõiki neid aineid tuleks käsitada nahka ja silmi ärritavate ainetena ning vastuvõtlike inimeste puhul võimalike naha ja hingamiselundite sensibilisaatoritena. Kuna heks-2-een-1-ooli, heks-2 (*trans*)-enaali, allüülheksanaadi ja allüülheptanaadi kohta andmed puudusid, ei saanud toiduohutusamet teha järeldust, et nende ainete käitlemine on kasutajatele ohutu. Taotleja koostas siiski nõuetekohaselt ohutuskardi, millel on kirjeldatud nende ainete kasutajate jaoks kaasnevaid ohte. Ohutuskardil kirjeldatud ohud on eelkõige seotud naha, silmade ja hingamisteede kokkupuutega heks-(2-*trans*)-enaali puhul ning naha ja silmade kokkupuutega heks-2-een-1-ooli ja allüülheptanaadi puhul; allüülheksanaat on allaneelamisel kahjulik ja nahale sattumisel mürgine.
- (7) Lõpuks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõik kõnealused ained on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus. Seepärast ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimise meetodite kohta.
- (8) Kõigi nende ainete hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seetõttu peaks nende ainete kasutamine olema lubatud. Komisjon leiab, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele.
- (9) Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandite märgistusele märkida aine suurim soovitatav sisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu märgistusel esitada teatav teave.
- (10) Asjaolu, et kõnealuseid aineid ei ole lubatud kasutada lõhna- ja maitseainena joogivees, ei välista nende kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.
- (11) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (12) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(3):2625.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(5):2678.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(10):2927.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012; 10(10):2928.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012; 10(11):2966.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2013; 11(4):3169.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015; 13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016; 14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016; 14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016; 14(8):4557.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5654.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal 2020; 18(12):6338.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal 2022; 20(4):7248.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada lisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas kirjeldatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 2. oktoobrit 2023 kooskõlas enne 2. aprilli 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 2. aprilli 2024 kooskõlas enne 2. aprilli 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 2. aprilli 2025 kooskõlas enne 2. aprilli 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2023

Komisjoni nimel
president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-	Maksi-	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mumsisaldus	mumsisaldus		
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b09093	Etüülheptanaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Etüülheptanaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Etüülheptanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₉H₁₈O₂ CASi number: 106-30-9 FLAVISi number: 09.093 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Etüülheptanaadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 32 mg.“ - Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033
---------	----------------	---	------------------	---	---	---	--	----------------

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09409	Etüül-2-metüülbutanaat	Söödalisandi koostis Etüül-2-metüülbutanaat Toimeaine kirjeldus Etüül-2-metüülbutanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₇H₁₄O₂ CASi number: 7452-79-1 FLAVISi number: 09.409 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Etüül-2-metüülbutanaadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09024	Isopentüülatsetaat	Söödalisandi koostis Isopentüülatsetaat Toimeaine kirjeldus Isopentüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₇H₁₄O₂ CASi number: 123-92-2 FLAVISi number: 09.024 Analüüsimetod (1) Isopentüülatsetaadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 125 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09463	3-metüülbutüül-3-metüülbutanaat	Söödalisandi koostis 3-metüülbutüül-3-metüülbutanaat Toimeaine kirjeldus 3-metüülbutüül-3-metüülbutanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₀H₂₀O₂ CASi number: 659-70-1 FLAVISi number: 09.463 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3-metüülbutüül-3-metüülbutanaadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-	Maksi-	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mumsisaldus	mumsisaldus		
mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta								
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b08006	2-metüülpropioonhape	Söödalisandi koostis 2-metüülpropioonhape Toimeaine kirjeldus 2-metüülpropioonhape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C₄H₈O₂ CASi number: 79-31-2 FLAVISi number: 08.006 Analüüsimetod ⁽¹⁾ 2-metüülpropioonhappe sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09055	3-metüülbutüülbutanaat	Söödalisandi koostis 3-metüülbutüülbutanaat Toimeaine kirjeldus 3-metüülbutüülbutanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₉H₁₈O₂ CASi number: 106-27-4 FLAVISi number: 09.055 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 3-metüülbutüülbutanaadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09286	2-metüülbutüülatsetaat	Söödalisandi koostis 2-metüülbutüülatsetaat Toimeaine kirjeldus 2-metüülbutüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C₇H₁₄O₂ CASi number: 624-41-9 FLAVISi number: 09.286 Analüüsimetod ⁽¹⁾ 2-metüülbutüülatsetaadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b02020	Heks-2-een-1-ool	Söödalisandi koostis Heks-2-een-1-ool Toimeaine kirjeldus Heks-2-een-1-ool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₆H₁₂O CASi number: 2305-21-7 FLAVISi number: 02.020 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Heks-2-een-1-ooli sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b05073	Heks-2(trans)-enaal	Söödalisandi koostis Heks-2(trans)-enaal Toimeaine kirjeldus Heks-2(trans)-enaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 92 % Keemiline valem: C₆H₁₀O CASi number: 6728-26-3 FLAVISi number: 05.073 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Heks-2(trans)-enaali sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09244	Allüülheksanaat	Söödalisandi koostis Allüülheksanaat Toimeaine kirjeldus Allüülheksanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₉H₁₆O₂ CASi number: 123-68-2 FLAVISi number: 09.244 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Allüülheksanaadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonija järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09097	Allüülheptanaat	Söödalisandi koostis Allüülheptanaat Toimeaine kirjeldus Allüülheptanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₁₀H₁₈O₂ CASi number: 142-19-8 FLAVISi number: 09.097 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Allüülheptanaadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse allaneelamisest, sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan-dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b02013	Linalool	Söödalisandi koostis Linalool Toimeaine kirjeldus Linalool Toodetud keemilise sünteesi teel või Cayenne'i roosipuust, Brasiilia roosipuust, Mehhiko burserast, kampripuust ja koriandriseemnetest saadud õli fraktsioneerival destillatsiooni ja sellele järgneva rektifitseerimise teel. Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₁₀H₁₈O CASi number: 78-70-6 FLAVISi number: 02.013 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Linaloolisisalduse määramine söödalisan-dis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 30 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan-di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan-di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan-di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ ¹ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

							5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“ 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07007	α-jonoon	Söödalisandi koostis α-jonoon Toimeaine kirjeldus α-jonoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt > 85 % Keemiline valem: C₁₃H₂₀O CASi number: 127-41-3 FLAVISi number: 07.007 Analüüsimetod ⁽¹⁾ α-jonooni sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

							5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“ 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) ¹ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07089	Nootkatoon	Söödalisandi koostis Nootkatoon Toimeaine kirjeldus Nootkatoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt > 93 % Keemiline valem: C₁₅H₂₂O CASi number: 4674-50-4 FLAVISi number: 07.089 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Nootkatoonisisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonija järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutustes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

(1) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan-dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07008	β-jonoon	Söödalisandi koostis β-jonoon Toimeaine kirjeldus β-jonoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt > 95 % Keemiline valem: C₁₃H₂₀O CASi number: 14901-07-6 FLAVISi number: 07.008 Analüüsimetod ⁽¹⁾ β-jonooni sisalduse määramine söödalisan-dis ja sööda lõhna-ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeet-ria retentsioonaja järgi hää-lestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishistest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — lõhilased, lihavasikad ja koerad: 5 mg; — muud loomaliigid ja -kategooriad: 1 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan-di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan-di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan-di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b07011	α-iroon	<i>Söödalisandi koostis</i> α-iroon <i>Toimeaine kirjeldus</i> α-iroon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt > 98 % Keemiline valem: C₁₄H₂₂O CASi number: 79-69-6 FLAVISi number: 07.011	Kõik loomaliigid	–	–	–	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavad loomad: 0,05 mg; — maismaa vesiviljelussüsteemides kasvatatavad loomad: 5 mg; — muud loomaliigid ja -kategooriad: 5 mg.“ - Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	2. aprill 2033
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ α-irooni sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

							5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“ 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-	Maksi-	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mumsisaldus	mumsisaldus		
mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta								
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07108	β-damaskenoon	Söödalisandi koostis β-damaskenoon Toimeaine kirjeldus β-damaskenoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt > 98 % Keemiline valem: C₁₃H₁₈O CASi number: 23696-85-7 FLAVISi number: 07.108 Analüüsimetod ⁽¹⁾ β-damaskenooni sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — nuumveised, lõhilased ja mittetoiduloomad: 1,5 mg; — muud loomaliigid ja -kategooriad: 1 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b07224	(E)-β-damaskoon	<i>Söödalisandi koostis</i> (E)-β-damaskoon <i>Toimeaine kirjeldus</i> (E)-β-damaskoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt > 90 % Keemiline valem: C₁₃H₂₀O CASI number: 23726-91-2 FLAVIS number: 07.224 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ (E)-β-damaskooni sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavad loomad: 0,05 mg; — maismaa vesiviljelussüsteemides kasvatatavad loomad: 5 mg; — muud loomaliigid ja -kategooriad: 5 mg.“ - Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	2. aprill 2033
---------	-----------------	---	------------------	---	---	---	--	----------------

							5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“ 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-	Maksi-	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mumsisaldus	mumsisaldus		
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b10004	Pentadekano-1,15-laktoon	Söödalisandi koostis Pentadekano-1,15-laktoon Toimeaine kirjeldus Pentadekano-1,15-laktoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₅H₂₈O₂ CASi number: 106-02-5 FLAVISi number: 10.004 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Pentaadekano-1,15-laktooni sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b02019	2-fenüületaan-1-ool	Söödalisandi koostis 2-fenüületaan-1-ool Toimeaine kirjeldus 2-fenüületaan-1-ool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₈H₁₀O CASi number: 60-12-8 FLAVISi number: 02.019 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2-fenüületaan-1-ooli sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutustes määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b09466	Fenetüülisovaleraat	<i>Söödalisandi koostis</i> Fenetüülisovaleraat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Fenetüülisovaleraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt > 97 % Keemiline valem: $C_{13}H_{18}O_2$ CASI number: 140-26-1 FLAVIS number: 09.466 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Fenetüülisovaleraadi sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavad loomad: 0,05 mg; — maismaa vesiviljelussüsteemides kasvatatavad loomad: 30 mg; — muud loomaliigid ja -kategooriad: 30 mg.“ - Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	2. aprill 2033
---------	---------------------	--	------------------	---	---	---	--	----------------

							5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“ 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b07055	4-(p-hüdroksüfenüül)butaan-2-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> 4-(p-hüdroksüfenüül)butaan-2-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> 4-(p-hüdroksüfenüül)butaan-2-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt > 96 % Keemiline valem: C₁₀H₁₂O₂ CASi number: 5471-51-2 FLAVISi number: 07.055	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharudes määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavad loomad: 0,05 mg; — maismaa vesiviljelussüsteemides kasvatatavad loomad: 25 mg — muud loomaliigid ja -kategooriad: 25 mg.“ - Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	2. aprill 2033
		<i>Analüüsimeetod</i> (1) 4-(p-hüdroksüfenüül)butaan-2-ooni sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

							5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“ 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04074	2-metoksünaftaleen	Söödalisandi koostis 2-metoksünaftaleen Toimeaine kirjeldus 2-metoksünaftaleen Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C₁₁H₁₀O CASi number: 93-04-9 FLAVISi number: 04.074 Analüüsimetod ⁽¹⁾ 2-metoksünaftaleeni sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutustes määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 1,2 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b15026	2-isopropüül-4-metüültiasool	<i>Söödalisandi koostis</i> 2-isopropüül-4-metüültiasool <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-isopropüül-4-metüültiasool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 96 % Keemiline valem: C₇H₁₁NS CASi number: 15679-13-7 FLAVISi number: 15.026	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutustes määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavad loomad: 0,05 mg; — maismaa vesiviljelussüsteemides kasvatatavad loomad: 1,5 mg; — muud loomaliigid ja -kategooriad: 1,5 mg.“ - Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	2. aprill 2033
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ 2-isopropüül-4-metüültiasooli sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)						

							5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“ 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b01017	Valentseen	Söödalisandi koostis Valentseen Toimeaine kirjeldus Valentseen Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 94 % Keemiline valem: C₁₅H₂₄ CASi number: 4630-07-3 FLAVISi number: 01.017 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Valentseenisisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	2. aprill 2033

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en