



2024/2899

21.11.2024.

KOMISIJAS REGULA (ES) 2024/2899

(2024. gada 20. novembris),

ar kuru groza Regulu (ES) 2020/354, ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 10. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Ar Komisijas Regulu (ES) 2020/354 ⁽²⁾ izveidoto sarakstu, kurā iekļauti tādas barības paredzētie lietojumi, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, var atjaunināt saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 767/2009 noteiktajiem noteikumiem un procedūrām.
- (2) Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 10. pantu ir saņēmusi pieteikumu atjaunināt paredzēto lietojumu sarakstu, lietojumu īpašajam barošanas mērķim "Piena triekas un subklīniskās hipokalcēmijas riska mazināšana" papildināt ar glikozilētu 1,25-dihidroksihoīkalciferolu, kas iegūts no *Solanum glaucophyllum* ekstrakta. Šis pieprasījums tika izskatīts, ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ("Iestāde") 2022. gada 29. jūnija atzinumu ⁽³⁾ par šo barības piedevu, kurā norādīts, ka glikozilēts 1,25-dihidroksihoīkalciferols, kas iegūts no *Solanum glaucophyllum* ekstrakta, piena govis var pasargāt no hipokalcēmijas, ja tas, lietots tādā veidā, kā izvērtētajos pētījumos ar dzīvniekiem, perorāli, lietojot bolu, ar papildbarību dots laikā no 9 dienām pirms atnešanās līdz brīdim tieši pirms atnešanās. Šajos pētījumos bolu papildināja barība, kas attiecīgā līmenī saturēja kalciju un magniju.
- (3) Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2009 10. pantu saņēma vēl vienu pieteikumu atjaunināt paredzēto lietojumu sarakstu, mainot nosacījumus, kas saistīti ar tādas barības paredzēto lietojumu, kura paredzēta īpašam barošanas mērķim "Piena triekas un subklīniskās hipokalcēmijas riska mazināšana", proti, ar uztura katjonu un anjonu starpību (DCAD) saistītās būtiskās uzturīpašības mainīt, slejā "Būtiskās uzturīpašības" ieviešot negatīvas katjonu-anjonu līdzsvara vērtības. Pašreizējā paredzēto lietojumu sarakstā DCAD atrodas pozitīvā diapazonā, proti, vairāk par nulli un mazāk par 100. Pieteikuma iesniedzējs ierosināja būtiskajās uzturīpašībās iekļaut negatīvu DCAD vērtību. Tas nozīmē, ka negatīvo jonu (anjonu) līmenis var būt augstāks par pozitīvo jonu (katjonu) līmeni. Ierosinātās izmaiņas ļauj samazināt pH līmeni dzīvnieka urīnā, kas savukārt izraisa kalcija ekskrēciju ar urīnu un samazina seruma koncentrāciju dzīvnieka asinīs. Kalcija koncentrācijas samazināšanās serumā stimulē paratiroīdā hormona (PTH) sekrēciju, kura savukārt palielina kalcija izdalīšanos no kauliem un aktivizē D vitamīnu nierēs (kas savukārt uzlabo kalcija absorbciju gremošanas traktā). Turklāt negatīvais DCAD palielina mērķdzīvnieku uzņemto barības daudzumu.

⁽¹⁾ OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Regula (ES) 2020/354 (2020. gada 4. marts), ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, un atceļ Direktīvu 2008/38/EK (OV L 67, 5.3.2020., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2022; 20(8):7434.

- (4) Komisija šos divus pieteikumus, arī dokumentāciju, nekavējoties darīja pieejamus dalībvalstīm.
- (5) Novērtējums, kas sagatavots par pieteikumu uz tādu būtisko uzturīpašību mainīšanu, kuras saistītas ar DCAD, kā arī par pieteikumu uz to, ka paredzēto lietojumu sarakstā tiek iekļauts no *Solanum glaucophyllum* ekstrakta glikozilēts 1,25-dihidroksihoлекаlциferols, kuru lieto tādā veidā, kā izvērtētajos pētījumos ar dzīvniekiem, liecina, ka abu attiecīgo barības veidu īpašais sastāvs atbilst konkrētajam paredzētajam barošanas mērķim un ka tiem nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēka veselību, vidi vai dzīvnieku labturību.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, ar Regulu (ES) 2020/354 izveidoto sarakstu, kurā iekļauti tādas barības paredzētie lietojumi, kas paredzēti īpašiem barošanas mērķiem, ir lietderīgi atjaunināt attiecībā uz īpašo barošanas mērķi "Piena triekas un subklīniskās hipokalcēmijas riska mazināšana".
- (7) Tāpēc Regula (ES) 2020/354 būtu attiecīgi jāgroza.
- (8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2020/354 pielikuma B daļas 60. ierakstu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Ieraksta numurs	Īpašais barošanas mērķis	Būtiskās uzturīpašības (GP1)	Dzīvnieku suga vai kategorija	Marķējuma norādes (GP2)	Ieteicamais ilgums	Citi noteikumi
"60	Piena triekas un subklīniskās hipokalcēmijas riska mazināšana	Zema katjonu/anjonu attiecība Attiecībā uz kopējo attiecību: — minimālā paskābināšanās, izmantojot īpašam barošanas mērķim paredzētu barību: 100 mEq/kg sausnas, — mērķis: diapazons no negatīvām DCAD ¹⁷ vērtībām līdz < 100 (mEq/kg sausnas) DCAD vērtībām vai	Piena govīs	— Kalcijs — Fosfors — Magnijs — Nātrijs — Kālijs — Hlorīdi — Sērs	No 3 nedēļām pirms atnešanās līdz atnešanās brīdim	Norādījumos par pareizu lietošanu norāda: "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."
		Ceolīts (nātrija alumīnija silikāts): 250–500 g dienā vai		Nātrija alumīnija silikāts	No 3 nedēļām pirms atnešanās līdz atnešanās brīdim	Norādījumos par pareizu lietošanu norāda: — "Barības daudzums ir jāierobežo tā, lai nodrošinātu, ka viens dzīvnieks dienā neuzņem vairāk par 500 g nātrija alumīnija silikāta.", — lietošanas ilgums ne ilgāks kā 2 nedēļas, — "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."
		Apgāde ar tādām barības sastāvdaļām, kurām veikta pretspurekļa apstrāde un kurās ir augsts fitīnskābes saturs (> 6 %) un kalcija saturs < 0,2 %, lai sasniegtu minimālos 28 g un maksimālos 32 g pieejamā kalcija vienai govij dienā vai		Kalcijs	No 4 nedēļām pirms atnešanās līdz atnešanās brīdim	Norādījumos par pareizu lietošanu norāda: "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."
		Augsts kalcija saturs plaši pieejamu kalcija avotu veidā: kalcija hlorīds un/vai kalcija sulfāts, un/vai dikalcija fosfāts, un/vai kalcija karbonāts, un/vai kalcija propionāts, un/vai kalcija formiāts, un/vai "jebkāds cits kalcija avots ar līdzīgu iedarbību". Kalcijs, ko nodrošina viens no minētajiem avotiem vai to		— Kalcijs — Kalcija avoti	No pirmajām dzemdību pazīmēm līdz divām dienām pēc dzemdībām	— Atļauts lietot bolu veidā. Lai palielinātu bola blīvumu, tas var saturēt līdz 20 % dzelzs inertā, bionepieejamā veidā. — Norādījumos par pareizu lietošanu norāda lietošanas reizes un laiku pirms un pēc atnešanās.

⁽¹⁷⁾ DCAD (uztura katjonu un anjonu starpība; izteikta mEq/kg sausnas) = (Na+K) – (Cl +S).

Ieraksta numurs	Īpašais barošanas mērķis	Būtiskās uzturīpašības (GP1)	Dzīvnieku suga vai kategorija	Marķējuma norādes (GP2)	Ieteicamais ilgums	Citi noteikumi
		kombinācija ar ne mazāk kā 50 g vienai govij dienā vai				— Marķējumā norāda: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar uztura speciālistu.”
		Apgāde ar kalciju kalcija pidolāta veidā ne mazāk kā 5,5 g vienai govij dienā vai		— Kalcijs — Kalcija pidolāts	No pirmajām dzemdību pazīmēm līdz divām dienām pēc dzemdībām	— Atļauts lietot bolu veidā. Lai palielinātu bola blīvumu, tas var saturēt līdz 20 % dzelzs inertā, bionepieejamā veidā. — Marķējumā norāda: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar uztura speciālistu.”
		Vasklapainās naktenes milti, kas dienā izdala 38–46 µg 1,25 dihidroksiholekalciferolglikozīda vai		— Vasklapainās naktenes milti — 1,25 dihidroksiholekalci-ferolglikozīda saturs — Kopšķiedra — Magnijs — Koptauki — Ciete — D ₃ vitamīns (kopējais saturs) kā holekalciferols	No divām dienām pirms atnešanās vai pirmajām dzemdību pazīmēm līdz 10 dienām pēc dzemdībām	— Atļauts lietot bolu veidā. Lai palielinātu bola blīvumu, tas var saturēt līdz 20 % dzelzs inertā, bionepieejamā veidā. — Marķējumā norāda: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar uztura speciālistu.”
		No <i>Solanum glaucophyllum</i> ekstrakta iegūts glikozilēts 1,25-dihidroksiholekalciferols, kas dienā izdala 15–80 µg glikozilēta 1,25-dihidroksiholekalciferola.	Piena govīs	— No <i>Solanum glaucophyllum</i> ekstrakta iegūts glikozilēts 1,25-dihidroksiho-lekalciferols — D ₃ vitamīns (kopējais saturs) kā holekalciferols	Vienu bolu, kas satur no <i>Solanum glaucophyllum</i> ekstrakta iegūtu glikozilētu 1,25-dihidroksiholekal-ciferolu, perorāli ievada pirmsdzemdību periodā (laikā no 9 dienām pirms atnešanās līdz brīdim tieši pirms atnešanās)	1. No <i>Solanum glaucophyllum</i> ekstrakta iegūtu glikozilētu 1,25-dihidroksiholekalciferolu dod vienreiz perorāli bola veidā, dienā dodot: — vismaz 60 g kalcija vienai govij nedēļā pirms atnešanās un 84 g kalcija vienai govij līdz trešās laktācijas nedēļas beigām, — vismaz 18 g magnija vienai govij nedēļā pirms atnešanās un 26 g magnija vienai govij līdz trešās laktācijas nedēļas beigām.

Ieraksta numurs	Īpašais barošanas mērķis	Būtiskās uzturīpašības (GP1)	Dzīvnieku suga vai kategorija	Marķējuma norādes (GP2)	Ieteicamais ilgums	Citi noteikumi
						2. Barības marķējumā norāda: “Bolu ievada tikai vienreiz pirmsdzemdību periodā – laikā no 9 dienām pirms atnešanās līdz brīdim tieši pirms atnešanās. Kalciju un magniju katru dienu ievada šādā koncentrācija: — vismaz 60 g kalcija vienai govij nedēļā pirms atnešanās un 84 g kalcija vienai govij līdz trešās laktācijas nedēļas beigām, — vismaz 18 g magnija vienai govij nedēļā pirms atnešanās un 26 g magnija vienai govij līdz trešās laktācijas nedēļas beigām.” Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu vai uztura speciālistu.”