



2026/1243

15.6.2026 г.

ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2026/1243 НА КОМИСИЯТА

от 11 юни 2026 година

относно мониторинга на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ се определят максимално допустимите граници за някои нежелани вещества, включително мораво рогче (*Claviceps purpurea*), във фуражите.
- (2) В Препоръка 2012/154/ЕС на Комисията ⁽²⁾ се препоръчва мониторинг на наличието на алкалоиди от мораво рогче в зърнените храни и зърнените продукти, предназначени за хранене на животни, в пасища / фуражни треви за хранене на животни и в комбинирани фуражи.
- (3) На 28 юни 2012 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) прие становище относно алкалоидите от мораво рогче в храните и фуражите ⁽³⁾. Органът базира оценката си на риска на основните алкалоиди от мораво рогче *Claviceps purpurea*, а именно ергометрин, ерготамин, ергозин, ергокристин, ергокриптин, ергокорнин, както и съответстващите им „-инин“ епимери. Тъй като *Claviceps africana* и *Claviceps fusiformis* могат да бъдат от значение за внасяните в Съюза фуражи, наличието на преобладаващите им алкалоиди от мораво рогче, по-специално дихидроергозин и агроклавин съответно, следва да подлежи на мониторинг. Ерговалин е един от алкалоидите на моравото рогче, които обикновено се срещат при заразени с ендوفити видове трева, като например тръстиковидна власатка или многогодишен райграс.
- (4) На 6 юли 2017 г. Органът публикува научен доклад относно експозицията на алкалоиди от мораво рогче чрез храната при хора и животни ⁽⁴⁾. В доклада се препоръчва събирането на аналитични данни за алкалоидите от мораво рогче в съответните фуражни продукти да продължи. Освен това следва да продължи едновременно събиране на данни за наличието на склероции на мораво рогче и за съдържанието на алкалоиди от мораво рогче в различни фуражни продукти, за да се спомогне за по-доброто разбиране на връзката между тези две променливи. За целите на мониторинга следва да се използват наличните аналитични методи с достатъчна чувствителност.
- (5) На 30 ноември 2023 г. Органът прие становище относно риска за здравето на животните, свързан с наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите ⁽⁵⁾. Органът счете, че наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите поражда опасения за здравето при едър рогат добитък и свине (прасенца, свине за утаяване и свине майки). Органът подчерта, че са необходими повече данни за наличието на алкалоиди от мораво рогче, по-специално във фуражите и соргото, и на ерговалин/-инин във фуражите. Данните за наличието, предоставени на Органа, следва да съдържат подходяща информация за анализиранияте проби от фуражи, включително съдържанието на влага, целевите животни и вида на комбинирания фураж (пълноценен/допълващ), като за анализа следва да се използват чувствителни методи.
- (6) Поради това е целесъобразно да се препоръча мониторинг на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите в целия Съюз,

⁽¹⁾ Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj>).

⁽²⁾ Препоръка 2012/154/ЕС на Комисията от 15 март 2012 г. за наблюдение на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите и храните (ОВ L 77, 16.3.2012 г., стр. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2012/154/oj>).

⁽³⁾ Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed (Научно становище относно алкалоидите от мораво рогче във фуражите и храните). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012, 10(7):2798. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2798>.

⁽⁴⁾ Arcella, D., Gomez Ruiz, J-A., Innocenti, ML и Roldán, R., 2017 г.. Scientific report on human and animal dietary exposure to ergot alkaloids (Научен доклад относно експозицията на алкалоиди от мораво рогче чрез храната при хора и животни.) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017:15(7):4902, стр. 53. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4902>.

⁽⁵⁾ Scientific Opinion on the risk for animal health related to the presence of ergot alkaloids in feed (Научно становище относно риска за здравето на животните, свързан с наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2024; 22(1):e8496. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8496>.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1. Препоръчва се държавите членки, с активното участие на операторите в сектора на фуражите, да извършват мониторинг на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите.
2. Следва да се анализират най-малко следните алкалоиди от мораво рогче:
 - ергокристин/ергокристинин;
 - ерготамин/ерготаминин;
 - ергокриптин/ергокриптинин (α - и β -форма);
 - ергометрин/ергометринин;
 - ергозин/ергозинин;
 - ергокорнин/ергокорнинин.

Препоръчва се също анализ на ерговалин /ерговалинин, агроклавин, дихидроергозин и лолитрем В.

3. Когато е възможно, следва да се определи съдържанието на склероции в пробата, за да могат да се подобрят познанията за връзката между съдържанието на склероции и нивото на отделните алкалоиди от мораво рогче.
4. Препоръчваният метод за анализ е течна хроматография / тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS). Могат да се прилагат и други методи за анализ, при условие че са налице доказателства, показващи, че те дават надеждни резултати за отделни алкалоиди (или двойка епимери) от мораво рогче. Границата на количествено определяне (LOQ) за определянето на всеки алкалоид от мораво рогче, която трябва да бъде постигната, следва да бъде 5 $\mu\text{g/kg}$ или по-ниска.
5. По-специално се препоръчва да се вземат проби от следното:
 - зърнени култури и получавани от тях продукти;
 - треви и получавани от тях продукти, включително фуражи;
 - комбиниран фураж.
6. С цел да се гарантира, че пробите са представителни за партидата, от която са взети, държавите членки следва да спазват процедурата за вземане на проби, установена в Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията ⁽⁶⁾.
7. На държавите членки се препоръчва да гарантират, че резултатите от анализите се предоставят редовно и най-късно до 30 юни 2028 г. на Органа във формата на ЕОБХ за предаване на данни в съответствие с изискванията на насоките на ЕОБХ „Guidance on Standard Sample Description (SSD2) for Food and Feed“ ⁽⁷⁾ и с допълнителните специални изисквания за докладване на ЕОБХ.

⁽⁶⁾ Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ Л 54, 26.2.2009 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj>).

⁽⁷⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0>.

8. Настоящата препоръка заменя Препоръка 2012/154/ЕС на Съвета.

Съставено в Брюксел на 11 юни 2026 година.

За Комисията
Olivér VÁRHELYI
Член на Комисията
