



2026/1243

15.6.2026

RECOMANDAREA (UE) 2026/1243 A COMISIEI

din 11 iunie 2026

privind monitorizarea prezenței alcaloizilor ergotici în hrana pentru animale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

- (1) Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾ stabilește nivelul maxim pentru anumite substanțe indezirabile, inclusiv ergotul secarei (*Claviceps purpurea*), din hrana pentru animale.
- (2) Recomandarea 2012/154/UE a Comisiei ⁽²⁾ a recomandat monitorizarea prezenței alcaloizilor ergotici în cereale și în produsele pe bază de cereale destinate hrănirii animalelor, în ierburile prezente pe pășuni/în furaje destinate hrănirii animalelor și în hrană combinată pentru animale.
- (3) La 28 iunie 2012, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a adoptat un aviz privind alcaloizii ergotici din alimente și din hrana pentru animale ⁽³⁾. Autoritatea și-a bazat evaluarea riscului pe principalii alcaloizi ergotici din *Claviceps purpurea* și anume: ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina, ergocornina, precum și epimerii -inină corespunzători. Întrucât *Claviceps africana* și *Claviceps fusiformis* pot fi relevante pentru hrana pentru animale importată în Uniune, este necesar ca prezența alcaloizilor lor ergotici predominanți, în special dihidroergosina și, respectiv, agroclavina, să fie monitorizată. Ergovalina este unul dintre alcaloizii ergotici care se găsesc de obicei la speciile de iarbă infectate cu endofite, cum ar fi păiușul înalt sau zizania.
- (4) La 6 iulie 2017, autoritatea a publicat un raport științific privind expunerea prin alimentație a oamenilor și a animalelor la alcaloizii ergotici ⁽⁴⁾. În raport se recomandă continuarea colectării de date analitice privind alcaloizii ergotici din produsele relevante care reprezintă hrană pentru animale. În plus, este necesar să fie continuată colectarea simultană de date privind prezența scleroșilor ergotici și conținutul de alcaloizi ergotici în diferite produse care reprezintă hrană pentru animale, pentru a ajuta la o mai bună înțelegere a relației dintre aceste două variabile. Este necesar ca în scop de monitorizare să fie utilizate metode analitice disponibile care au sensibilitate suficientă.
- (5) La 30 noiembrie 2023, autoritatea a adoptat un aviz privind riscul pentru sănătatea animală legat de prezența alcaloizilor ergotici în hrana pentru animale ⁽⁵⁾. Autoritatea a considerat că prezența alcaloizilor ergotici în hrana pentru animale generează îngrijorări în ceea ce privește sănătatea bovinelor și a porcinelor (purceli, porci pentru îngrășare și scroafe). Autoritatea a evidențiat că sunt necesare mai multe date privind prezența alcaloizilor ergotici, în special în furaje și în sorg, precum și a ergovalinei/ergovalininei în furaje. Este necesar ca datele transmise autorității privind prezența lor să conțină informații adecvate privind eşantioanele analizate de hrană pentru animale, inclusiv conținutul de umiditate, animalele vizate și tipul de hrană combinată pentru animale (completă/complementară) și ca pentru analizare să se utilizeze metode sensibile.
- (6) Prin urmare, este adecvat să se recomande monitorizarea în întreaga Uniune a prezenței alcaloizilor ergotici în hrana pentru animale,

⁽¹⁾ Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10, ELI <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj>).

⁽²⁾ Recomandarea 2012/154/UE a Comisiei din 15 martie 2012 privind monitorizarea prezenței alcaloizilor din cornul secarei în hrana pentru animale și produsele alimentare (JO L 77, 16.3.2012, p. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2012/154/oj>).

⁽³⁾ *Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed* (Aviz științific privind alcaloizii ergotici din alimente și din hrana pentru animale). EFSA Journal 2012;10(7):2798. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2798>.

⁽⁴⁾ Arcella, D., Gomez Ruiz, J-A., Innocenti, ML and Roldán, R., 2017. *Scientific report on human and animal dietary exposure to ergot alkaloids* (Raport științific privind expunerea prin alimentație a oamenilor și a animalelor la alcaloizi ergotici). EFSA Journal 2017;15(7):4902, 53 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4902>.

⁽⁵⁾ *Scientific Opinion on the risk for animal health related to the presence of ergot alkaloids in feed* (Aviz științific privind riscul pentru sănătatea animală determinat de prezența alcaloizilor ergotici în hrana pentru animale) EFSA Journal 2024;(22):e8496. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8496>.

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. Statelor membre li se recomandă, cu implicarea activă a operatorilor din sectorul hranei pentru animale, să efectueze monitorizarea prezenței alcaloizilor ergotici în hrana pentru animale.
2. Este necesar să fie analizați cel puțin următorii alcaloizi ergotici:
 - ergocristina/ergocristinina;
 - ergotamina/ergotaminina;
 - ergocriptina/ergocriptinina (izomeri α și β);
 - ergometrina/ergometrinina;
 - ergosina/ergosinina;
 - ergocornina/ergocorninina.

Se recomandă, în plus, analizarea ergovalinei/ergovalininei, a agroclavinei, a dihidroergosinei și a lolitremului B.

3. Ori de câte ori este posibil, este necesar să fie determinat conținutul de scleroși din eșantion pentru a putea îmbunătăți cunoștințele privind relația dintre conținutul de scleroși și nivelul de alcaloizi ergotici individuali.
4. Metoda de analiză recomandată este cromatografie în fază lichidă cuplată cu spectrometrie de masă în tandem (LC-MS/MS). Pot fi aplicate și alte metode de analiză, cu condiția să existe dovezi care să arate că ele generează rezultate fiabile pentru alcaloizi ergotici individuali sau pentru perechile de epimeri ai acestora. Este necesar ca limita de cuantificare (LOQ) pentru determinarea fiecărui alcaloid ergotic care trebuie atinsă să fie de 5 $\mu\text{g/kg}$ sau mai mică.
5. În particular, se recomandă prelevarea de eșantioane din următoarele:
 - cereale și produse derivate;
 - ierburi și produse derivate, inclusiv furaje;
 - hrană combinată pentru animale.
6. Pentru a se asigura faptul că eșantioanele sunt reprezentative pentru lotul care face obiectul eșantionării este necesar ca statele membre să urmeze procedura de prelevare de eșantioane prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei ⁽⁶⁾.
7. Statelor membre li se recomandă să asigure faptul că rezultatele analizelor sunt furnizate autorității în mod regulat și până la 30 iunie 2028, în formatul EFSA de transmitere a datelor, în conformitate cu cerințele Orientărilor EFSA privind descrierea standard a probelor ⁽⁷⁾ (*Standard Sample Description – SSD2*) pentru alimente și hrană pentru animale și cu cerințele specifice suplimentare ale EFSA în materie de raportare.

⁽⁶⁾ Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj>).

⁽⁷⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0>.

8. Prezenta recomandare înlocuiește Recomandarea 2012/154/UE.

Adoptată la Bruxelles, 11 iunie 2026.

Pentru Comisie
Olivér VÁRHELYI
Membru al Comisiei
