



2026/1018

8.5.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1018,

7. mai 2026,

milles käsitletakse loa andmist *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasööttades kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparaadi kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisisandina ning taotletakse selle klassifitseerimist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. septembri 2025. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparaat on kõigile loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Mis puudutab kasutajate ohutust, siis jõudis toiduohutusamet järeldusele, et preparaati tuleks käsitada naha ja hingamiselundite sensibilisaatorina ning igasugust kokkupuudet naha ja hingamisteede kaudu käsitatakse riskina. Toiduohutusametil ei olnud võimalik teha järeldust söödalisisandi võimaliku silmi ärritava toime kohta. Lisaks järeldas toiduohutusamet, et sellise koguse preparaadi lisamine värsketele taimsele materjalile, mille puhul lisatud *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 sisaldus on vähemalt 4×10^2 CFU ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 sisaldus vähemalt $3,2 \times 10^6$ CFU taimse materjali kg kohta, võib parandada kergesti kuni keskmiselt sileeritavast värskest taimsest materjalist saadava silo tootmist. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisisandi analüüsimise meetodi kohta.
- (5) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 ja *Lactocaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kasutada kõnealust preparaati kõikide loomaliikide puhul. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisisandi kasutajate tervisele.
- (6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2025;23(10):e9698, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698>.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värske materjali kg kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid								
1k1803	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ja <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425	Söödalisandi koostis <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ja <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 preparaat, milles on vähemalt 5 × 10³ CFU <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ja 4 × 10² CFU <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 söödalisandi ml kohta Vedelik Toimeaine kirjeldus <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ja <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 elujõulised rakud Analüüsimeetod ⁽¹⁾ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 identifitseerimine: — DNA järjestamise meetodid või polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) meetod – CEN/TS 15790 <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 identifitseerimine: — DNA järjestamise meetodid või impulssvälja-geelektroforees (PFGE) – CEN/TS 17697 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 loendamine söödalisandis: — süvis- või pindkülvimeetod YGC-agariga – EN 15789	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina toimivate mikroorganismide ja/või ensüümidega: 4,0 × 10² CFU <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 ja 3,2 × 10⁶ CFU <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 värske taimse materjali kg kohta. 3. Söödalisandit tuleb kasutada ainult kergesti ja keskmiselt sileeritava värske taimse materjaliga ⁽²⁾. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda	28. mai 2036

Söödalisandi identifitseerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal- dus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes värske materjali kg kohta			
		<i>Lactiacaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 loendamine söödalisandis: — süvis- või pindkülvimeetod MRS-agariga – EN 15787					võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahen- deid.	

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis; keskmiselt sileeritav sööt: 1,5–3,0 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).