



2026/1234

12.6.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1234,

11. juuni 2026,

milles käsitletakse loa andmist vermikuliidi kasutamiseks kanabroilerite, munalindudeks või taastootmise eesmärgil kasvatatavate noorkanade ning täiskasvanud kanade söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus vermikuliidi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse vermikuliidi lubamist kõigi kodulinnuliikide ja dekoratiivlindude, kõigi sealiikide, hobuslaste, jänestlaste, kaamellaste, lemmikloomade ja muude toiduks mittekasutatavate loomade söödalisandina ning taotletakse selle söödalisandi klassifitseerimist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „paakumisvastased ained“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis 20. märtsi 2025. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et vermikuliiti käsitletakse ohutuna, kui selle sisaldus kanabroilerite, munalindudeks või aretuskanadeks kasvatatavate noorkanade ja munakanade täissöödas on 10 000 mg/kg ning piima- ja võordepõrsaste ja nuumsigade täissöödas 5 000 mg/kg. Võttes arvesse hinnatud uuringute piiratud ja ühtse ohutuspäi puudumist, ei olnud võimalik teha järeldust vermikuliidi ohutuse kohta muude kodulinnuliikide, dekoratiivlindude, emiste, muude sealiikide, hobuslaste, jänestlaste, kaamellaste, lemmikloomade ja muude toiduks mittekasutatavate loomade puhul. Lisaks järeldas toiduohutusamet, et söödalisand on kavandatud kasutustingimuste juures tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Mis puudutab kasutajate ohutust, siis jõudis toiduohutusamet järeldusele, et söödalisandit tuleks käsitada naha ja hingamiselundite sensibilisaatorina ning sissehingamist ja nahakaudset kokkupuudet tuleks käsitada riskina. Andmete puudumise tõttu ei olnud võimalik teha järeldust söödalisandi võimaliku silmi ärritava toime kohta. Samuti järeldas toiduohutusamet, et vermikuliit on tõhus sööda paakumise vastane aine, kui selle kontsentratsioon täissöödas on 10 000 mg/kg, ja märkis, et tõhusaks osutunud kontsentratsioon on suurem kui maksimaalne ja ohutu kasutuskogus võordepõrsaste ja nuumsigade puhul. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori muudetud aruande ⁽³⁾ söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.
- (5) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et vermikuliit vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kasutada kõnealust ainet kanabroilerite, munalindudeks või taastootmise eesmärgil kasvatatavate noorkanade ning täiskasvanud kanade söödalisandina. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2025;23:e9362, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9362>.

⁽³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/events/185th-plenary-meeting-feed-panel-open-observers>.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud vermikuliiti, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „paakumisvastased ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuni 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnum- ber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisal- dus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: paakumisvastased ained								
1i561	Vermikuliit	<i>Söödalisandi koostis</i> ≥ 87,0 % alumiiniummagneesiumraudsilikaati (vermikuliiti), ≥ 1,0 % hüdrosüapatiiti ja ≥ 2,4 % diopsiidi (Fe⁺²-sisaldusega) Pulber. <i>Toimeaine kirjeldus</i> Vermikuliit (alumiiniummagneesiumraudsilikaat): saadud kaevandamisest ja sellele järgneval soojuspaisutamisel Keemiline valem: (Mg,Fe²⁺,Al)₃(Al, Si)₄O₁₀(OH)₂·4(H₂O)₂. Nikkel ≤ 148 mg/kg Kristalliline ränidioksiid ≤ 0,06 % Kroom ≤ 199 mg/kg Asbestivaba (¹) <i>Analüüsimetod (²)</i> Söödalisandi kirjeldamine: — röntgendifraktsioon (XRD) (EN 13925) ja — röntgenfluorestsentspektromeet- ria (XRF) (EN ISO 12677)	Kanabroilerid	—	10 000	10 000	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Kui söödalisandit kasutatakse paakumisvastase ainena otse söödamaterjalis või täiendsöödas, peab selle minimaalne kasutuskogus olema 10 000 mg sööda kg kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid silmade, naha ja hingamiselundite kaitsmiseks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et järgitakse liidu õigusakte, mis käsitlevad töötajate kaitset sissehingamisest tulenevate riskide eest seoses kristalse ränidioksiidi ja nikliga.	2. juuli 2036

⁽¹⁾ Polarisatsioon(valgus)mikroskoopia (PLM) ja dispersioonvärvimismikroskoopia.

⁽²⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.