



2026/1772

24.7.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1772

(2026. gada 23. jūlijs)

par atļauju ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas endo-1,4-bēta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu gaļas tītariem un vaislai audzētiem tītariem (atļaujas turētājs: *Industrial Técnica Pecuaria, S.A.*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju lietot ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* (iepriekš klasificēta kā suga *Trichoderma longibrachiatum*) CBS 139997 ražotas endo-1,4-bēta-ksilanāzes preparātu. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikums attiecas uz atļauju ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas endo-1,4-bēta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu gaļas tītariem un vaislai audzētiem tītariem un lūgumu šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) savā 2025. gada 19. novembra atzinumā ⁽²⁾ secināja, ka ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas endo-1,4-bēta-ksilanāzes preparāts ir drošs gaļas tītariem un vaislai audzētiem tītariem, lietots maksimālajā ieteicamajā daudzumā 20 alfa-galaktozidāzes aktivitātes vienības (GALU) un 25 endo-1,4-bēta-ksilanāzes aktivitātes (AXC) vienības uz kg kompleksās barības, kā arī patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas endo-1,4-bēta-ksilanāzes preparāts tiek uzskatīts par elpceļu sensibilizatoru un ka inhalatīva eksponētība tiek uzskatīta par risku. Par piedevas potenciālu kairināt ādu vai acis vai būt par ādas sensibilizatoru secinājumi netika izdarīti. Iestāde secināja arī to, ka ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas endo-1,4-bēta-ksilanāzes preparāts var potenciāli būt iedarbīgs gaļas tītariem un vaislai audzētiem tītariem, lietots minimālajā ieteicamajā lietošanas daudzumā 14 GALU un 18 AXC vienības uz kg kompleksās barības. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal 2025;23:e9796, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9796>.

- (5) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas sniegti iepriekšējā novērtējumā par citu tādu pieteikumu uz tās pašas piedevas atļauju, ko Iestāde verificējusi 2020. gada 19. marta atzinumā ⁽³⁾, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽⁴⁾ 5. panta 4. punkta a) apakšpunktu references laboratorijas novērtēšanas ziņojums nebija vajadzīgs.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas endo-1,4-bēta-ksilanāzes preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tātad minēto preparātu būtu jāatļauj dot gaļas tītariem un vaislai audzētiem tītariem. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(4):6086, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6086>.

⁽⁴⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš	
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %				
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji										
4a33	Industrial Técnica Pecuaria, S.A.	Endo-1,4-bēta-ksilanāze (EC 3.2.1.8) un alfa-galaktozidāze (EC 3.2.1.22)	Piedevas sastāvs Endo-1,4-bēta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8), ražotas ar <i>Trichoderma orientale</i> CBS 139997, un alfa-galaktozidāzes (EC 3.2.1.22), ražotas ar <i>Aspergillus tubingensis</i> ATCC SD 6740, preparāts, kura minimālā fermentu aktivitāte ir: 50 AXC ⁽¹⁾/g piedevas un 40 GALU ⁽²⁾/g piedevas Cieta viela Aktīvās vielas raksturojums Endo-1,4-bēta-ksilanāze (EC 3.2.1.8), kas ražota ar <i>Trichoderma orientale</i> CBS 139997, un alfa-galaktozidāze (EC 3.2.1.22), kas ražota ar <i>Aspergillus tubingensis</i> ATCC SD 6740 Analītiskā metode ⁽³⁾ Kvantitatīvai endo-1,4-bēta-ksilanāzes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetriska metode, kuras pamatā ir endo-1,4-bēta-ksilanāzes fermentatīvā reakcija i) uz kviešu arabinoksilāna substrāta (barības piedevai un premiksiem) un ii) uz azo-ksilāna substrāta (kompleksajai barībai).	Gaļas tītari	Vaislai audzēti tītari	—	18 AXC 14 GALU	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti pret termisko apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no piedevas un premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2036. gada 13. augusts

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Kvantitatīvai alfa-galaktozidāzes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetriska metode, kuras pamatā ir alfa-galaktozidāzes fermentatīvā reakcija uz para-nitrofenil-alpha-D-galaktopiranozīda substrāta.						

(¹) Viena *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes aktivitātes (AXC) vienība ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no kviešu arabinoksilāna substrāta pie pH 4,7 un 30 °C temperatūrā atbrīvo 0,058 mikromolus reducējošo cukuru, kas izteikti kā ksilozes ekvivalenti.

(²) Viena alfa-galaktozidāzes aktivitātes vienība (GALU) tiek definēta kā fermenta daudzums, kas pie pH 5,5 un 37 °C temperatūrā noārda vienu mikromolu para-nitrofenil-alfa-D-galaktopiranozīda minūtē.

(³) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.