



2026/1822

27.7.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/1822

af 24. juli 2026

om godkendelse af pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L. som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ⁽¹⁾, særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10, stk. 2, indeholder bestemmelser om en ny vurdering af de tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF ⁽²⁾.
- (2) Stofferne pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L. blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter. Stofferne blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.
- (3) Der er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 indgivet en ansøgning om godkendelse af pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L. som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter med anmodning om, at tilsætningsstofferne klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »aromastoffer«. Ansøgningen var ledsaget af de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.
- (4) Ansøgeren anmodede om, at de pågældende stoffer også blev godkendt til anvendelse i drikkevand. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan »aromastoffer« imidlertid ikke godkendes til anvendelse i drikkevand. Det bør derfor ikke være tilladt at anvende disse tilsætningsstoffer i drikkevand.
- (5) Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 24. juni 2025 ⁽³⁾ og 25. juni 2025 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, at pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L. er sikre for hver dyreart ved visse maksimumskoncentrationer, der er nærmere angivet i disse udtalelser. Autoriteten konkluderede endvidere, at anvendelsen af pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L. under de foreslåede betingelser er sikker for forbrugerne og miljøet. Autoriteten konkluderede også, at pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L. bør betragtes som irriterende for hud og øjne samt som hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende stoffer, og at enhver

⁽¹⁾ EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025, 23(7) e9544. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025, 23(7) e9551. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2025, 23(7) e9545. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

eksponering betragtes som en risiko. Autoriteten konkluderede derudover, at der ikke kræves yderligere dokumentation for effektiviteten, eftersom blade af *Mentha × piperita* L., *Thymus serpyllum* L., *Salvia officinalis* L. og præparater heraf er anerkendt som aroma i fødevarer, og deres funktion i foder i alt væsentligt er den samme som i fødevarer. Autoriteten verificerede ligeledes den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstofferne i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

- (6) På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L. opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning. Kommissionen mener desuden, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre sundhedsskadelige virkninger hos brugerne af tilsætningsstofferne.
- (7) Kommissionen mener ikke, at der af sikkerhedsmæssige årsager er behov for at fastsætte grænseværdier for pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L. Det anbefalede maksimumsindhold bør angives på mærkningen af fodertilsætningsstofferne for at muliggøre bedre kontrol. Hvis det anbefalede maksimumsindhold overskrides, bør visse oplysninger angives på mærkningen af de pågældende forblandinger.
- (8) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.
- (9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører kategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, godkendes som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1. Fodertilsætningsstofferne pebermyntetinktur af *Mentha × piperita* L., tinktur af vild timian af *Thymus serpyllum* L. og salvietinktur af *Salvia officinalis* L., som godkendt i henhold til direktiv 70/524/EØF, samt forblandinger, der indeholder disse tilsætningsstoffer, og som er produceret og mærket før den 16. februar 2027 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 16. august 2026, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt.
2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i stk. 1 omhandlede fodertilsætningsstoffer, og som er produceret og mærket før den 16. august 2027 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 16. august 2026, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.
3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i stk. 1 omhandlede fodertilsætningsstoffer, og som er produceret og mærket før den 16. august 2028 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 16. august 2026, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de pågældende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

*Artikel 3***Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b282-t	Pebermyntetinktur	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning:</i> Tinktur fra tørrede blade eller overjordiske dele af <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. (basionym: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Flydende form <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Pebermyntetinktur: Tinktur, som defineret af Europarådet ⁽¹⁾, udvundet fra de tørrede blade eller de overjordiske dele af <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. ved forlænget ekstraktion med en blanding af vand/ethanol, presning og filtrering. EF-nr.: 282-015-4 CAS-nr.: 84082-70-2 CoE-nr.: 282 Specifikationer Tørstofindhold: 1,84 %-1,85 % Polyphenoler i alt ⁽²⁾: ≤ 0,1020 % Flavonoider ⁽³⁾: ≤ 0,0261 % Mentol: ≤ 0,0021 % Menthon: ≤ 0,0010 % Rosmarinsyre: ≤ 0,00099 %	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding. 2. Oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling angives i brugsvejledningen til tilsætningsstoffet og forblandinger. 3. Følgende angives på mærkningen af tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 86 mg til slagtekalkuner — 64 mg til slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning — 64 mg til alle fjerkræarter opdrættet til æglægning eller avl — 64 mg til prydfugle	16. august 2036

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
		<i>Analysemetode (*)</i> Til karakterisering af fodertilsætningsstoffet: — Spektrofotometri til bestemmelse af det samlede indhold af henholdsvis polyfenoler og flavonoider — Gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) til bestemmelse af mentol og menthon — Højtryksvæskeskromatografi med spektrofotometrisk (UV) detektion til bestemmelse af rosmarinsyre.					— 95 mg til alle fjerkræarter opdrættet til æglægning eller avl — 138 mg til slagtesvin — 115 mg til pattegrise og fravænnede grise af alle dyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 115 mg til slagtesvin af mindre udbredte dyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 168 mg til alle avlsdyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 287 mg til slagtekalve op til 6 måneder — 253 mg til får og geder — 253 mg til slagtekvæg, andre drøvtyggere bestemt til slagtning, undtagen får, geder og slagtekalve op til 6 måneder, og til dyr af kamelfamilien bestemt til slagtning (<i>Camelidae</i>) — 164 mg til alle andre drøvtyggere og alle andre dyr af kamelfamilien (<i>Camelidae</i>) — 253 mg til dyr af hestefamilien (<i>Equidae</i>) — 101 mg til dyr af hareordenen (<i>Leporidae</i>) — 289 mg til laksefisk og mindre udbredte fisk — 303 mg til hunde — 253 mg til katte	

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							— 500 mg til prydfisk — 64 mg til andre arter og kategorier.» 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på mærkningen af forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på mærkningen af forblandingen vil medføre overskridelse af det i punkt 3 omhandlede niveau. 5. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandinger med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandinger anvendes med personlige værnemidler i form af hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).

⁽²⁾ Udtrykt som gallussyreækvivalenter (GAE).

⁽³⁾ Udtrykt som hyperosidækvivalenter.

⁽⁴⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstof- fets identifikations- nummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi- mumsalder	Minimums- indhold	Maksimums- indhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b455-t	Tinktur af vild timian	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning:</i> Tinktur fra tørrede blade eller overjordiske dele af <i>Thymus serpyllum</i> L. Flydende form <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Tinktur af vild timian Tinktur, som defineret af Europarådet ⁽¹⁾, udvundet fra de tørrede blade af <i>Thymus serpyllum</i> L. ved forlænget ekstraktion med en blanding af vand/ethanol, presning og filtrering. EF-nr.: 284-023-3 CAS-nr.: 84776-98-7 CoE-nr.: 455 Specifikationer Tørstofindhold: 1 % Polyphenoler i alt ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Flavonoider ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Thymol: ≤ 0,000020 % Carvacrol: ≤ 0,000043 % Rosmarinsyre: ≤ 0,00107 % <i>Analysemetode ⁽⁴⁾</i> Til karakterisering af fodertilsætningsstoffet: — Spektrofotometri til bestemmelse af det samlede indhold af henholdsvis polyfenoler og flavonoider	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding. 2. Oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling angives i brugsvejledningen til tilsætningsstoffet og forblandinger. 3. Følgende angives på mærkningen af tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 96 mg til slagtekalkuner — 71 mg til slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning — 71 mg til alle fjerkræarter opdrættet til æglægning eller avl — 71 mg til prydfigle — 106 mg til alle fjerkræarter opdrættet til æglægning eller avl — 154 mg til slagtesvin	16. august 2036

Tilsætningsstof- fets identifikations- nummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi- mumsalder	Minimums- indhold	Maksimums- indhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
		— Gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) til bestemmelse af thymol og carvacrol — Højtryksvæskerkromatografi med spektrofotometrisk (UV) detektion til bestemmelse af rosmarinsyre.					— 128 mg til pattegrise og fravænnede grise af alle dyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 128 mg til slagtesvin af mindre udbredte dyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 187 mg til alle avlsdyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 321 mg til slagtekalve op til 6 måneder — 282 mg til får og geder — 282 mg til slagtekvæg, andre drøvtyggere bestemt til slagtning, undtagen får, geder og slagtekalve op til 6 måneder, og til dyr af kamelfamilien bestemt til slagtning (<i>Camelidae</i>) — 183 mg til alle andre drøvtyggere og alle andre dyr af kamelfamilien (<i>Camelidae</i>) — 282 mg til dyr af hestefamilien (<i>Equidae</i>) — 113 mg til dyr af hareordenen (<i>Leporidae</i>) — 322 mg til laksefisk og mindre udbredte fisk — 338 mg til hunde — 282 mg til katte — 500 mg til prydfisk — 71 mg til andre arter og kategorier.«	

Tilsætningsstof- fets identifikations- nummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi- mumsalder	Minimums- indhold	Maksimums- indhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på mærkningen af forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på mærkningen af forblandingen vil medføre overskridelse af det i punkt 3 omhandlede niveau. 5. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandinger med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandinger anvendes med personlige værnemidler i form af hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).

⁽²⁾ Udtrykt som gallussyreækvivalenter (GAE).

⁽³⁾ Udtrykt som hyperosidækvivalenter.

⁽⁴⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b414-t	Salvietinktur	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning:</i> Tinktur fra tørrede blade af <i>Salvia officinalis</i> L. Flydende form <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Salvietinktur: Tinktur, som defineret af Europarådet ⁽¹⁾, udvundet fra de tørrede blade af <i>Salvia officinalis</i> L. ved forlænget ekstraktion med en blanding af vand/ethanol, presning og filtrering. EF-nr.: 282-025-9 CAS-nr.: 84082-79-1 CoE-nr.: 414 Specifikationer Tørstofindhold: 1,75 %-1,78 % Polyphenoler i alt ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Flavonoider ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Thujoner: ≤ 0,0132 % Kamfer: ≤ 0,0130 % 1,8-Cineol (eucalyptol): ≤ 0,0070 % Rosmarinsyre: ≤ 0,0662 % <i>Analysemetode ⁽⁴⁾</i> Til karakterisering af fodertilsætningsstoffet: — Spektrofotometri til bestemmelse af det samlede indhold af henholdsvis polyfenoler og flavonoider	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding. 2. Oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling angives i brugsvejledningen til tilsætningsstoffet og forblandinger. 3. Følgende angives på mærkningen af tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 47 mg til slagtekalkuner — 35 mg til slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning — 35 mg til alle fjerkræarter opdrættet til æglægning eller avl — 35 mg til prydfigle — 52 mg til alle fjerkræarter opdrættet til æglægning eller avl — 75 mg til slagtesvin	16. august 2036

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
		— Gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) til bestemmelse af thujoner, kamfer og 1,8-cineol — Højtryksvæskerkromatografi med spektrofotometrisk (UV) detektion til bestemmelse af rosmarinsyre.					— 62 mg til pattegrise og fravænnede grise af alle dyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 62 mg til slagtesvin af mindre udbredte dyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 91 mg til alle avlsdyr af svinefamilien (<i>Suidae</i>) — 156 mg til slagtekalve op til 6 måneder — 137 mg til får og geder — 137 mg til slagtekvæg, andre drøvtyggere bestemt til slagtning, undtagen får, geder og slagtekalve op til 6 måneder, og til dyr af kamelfamilien bestemt til slagtning (<i>Camelidae</i>) — 89 mg til alle andre drøvtyggere og alle andre dyr af kamelfamilien (<i>Camelidae</i>) — 137 mg til dyr af hestefamilien (<i>Equidae</i>) — 55 mg til dyr af hareordenen (<i>Leporidae</i>) — 156 mg til laksefisk og mindre udbredte fisk — 164 mg til hunde — 137 mg til katte — 500 mg til prydfisk — 35 mg til andre arter og kategorier.«	

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstoffets navn	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
							4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på mærkningen af forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på mærkningen af forblandingen vil medføre overskridelse af det i punkt 3 omhandlede niveau. 5. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandinger med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandinger anvendes med personlige værnemidler i form af hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).

⁽²⁾ Udtrykt som gallussyreækvivalenter (GAE).

⁽³⁾ Udtrykt som hyperosidækvivalenter.

⁽⁴⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.