



2026/1822

27.7.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1822,

24. juuli 2026,

milles käsitletakse loa andmist piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud tinktuuri, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum* L.) saadud tinktuuri ja salveist (*Salvia officinalis* L.) saadud tinktuuri kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba kasutada piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud tinktuuri, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum* L.) saadud tinktuuri ja salveist (*Salvia officinalis* L.) saadud tinktuuri kõikide loomaliikide söödalisandina. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktiga b kanti need ained seejärel olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes sama määruse artikliga 7 on esitatud taotlus piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud tinktuuri, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum* L.) saadud tinktuuri ja salveist (*Salvia officinalis* L.) saadud tinktuuri lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning palutud klassifitseerida need söödalisandid kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Taotleja taotles luba kasutada kõnealuseid aineid ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada neid söödalisandeid joogivees kasutada.
- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 24. juuni 2025. aasta ⁽³⁾ ja 25. juuni 2025. aasta, ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ arvamustes järeldusele, et piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud tinktuur, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum* L.) saadud tinktuur ja salveist (*Salvia officinalis* L.) saadud tinktuur on ohutud teatavate maksimumsisalduse juures, mis on arvamustes iga loomaliigi jaoks kindlaks määratud. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud tinktuuri, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum* L.) saadud tinktuuri ja salveist (*Salvia officinalis* L.) saadud tinktuuri kasutamine kavandatud tingimustel on tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Samuti järeldas toiduohutusamet, et piparmündist (*Mentha × piperita*) L. saadud tinktuuri, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum*) L. saadud tinktuuri ja salveist (*Salvia officinalis*) L. saadud tinktuuri tuleks käsitada

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9544. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9551. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2025;23(7):e9545. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

nahka ja silmi ärritavana ning naha ja hingamisteede sensibilisaatorina ning igasugust asjaomast kokkupuudet käsitatakse riskina. Toiduohutusamet jõudis veel järeldusele, et kuna piparmündi (*Mentha × piperita* L.), nõmm-liivatee (*Thymus serpyllum* L.) ja salvei (*Salvia officinalis* L.) lehed ning neist saadud preparaadid on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

- (6) Eespool toodut arvesse võttes leiab komisjon, et piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud tinktuur, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum* L.) saadud tinktuur ja salveist (*Salvia officinalis* L.) saadud tinktuur vastavad määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealuseid aineid käesoleva määruse lisas kirjeldatud viisil. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.
- (7) Komisjon leiab, et ohutusnõuetest ei tulene vajadust kehtestada piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud tinktuuri, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum* L.) saadud tinktuuri ja salveist (*Salvia officinalis* L.) saadud tinktuuri piirnorme. Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks nimetatud söödalisandite märgistusel märkida soovitatav maksimumsisaldus. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral tuleks asjaomaste eelsegude märgistusel esitada sellekohane teave.
- (8) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperioodi, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (9) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisanditena loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt lubatud söödalisandeid piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud tinktuuri, nõmm-liivateest (*Thymus serpyllum* L.) saadud tinktuuri ja salveist (*Salvia officinalis* L.) saadud tinktuuri ning neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 16. veebruari 2027 kooskõlas enne 16. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 16. augustit 2027 kooskõlas enne 16. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 16. augustit 2028 kooskõlas enne 16. augustit 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

*Artikkel 3***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifitseeri- misnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategoo- ria	Vanuse ülempiir	Miinimum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b282-t	Piparmündi- tinktuur	<i>Söödalisandi koostis</i> Liigi <i>Mentha × piperita</i> L. kuivatatud lehtedest või maapealsetest osadest saadud tinktuur (basionüüm: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.). Vedelik <i>Toimeaine kirjeldus</i> Piparmünditinktuur: Euroopa Nõukogu määratletud tinktuur, ⁽¹⁾ mis on saadud taime <i>Mentha × piperita</i> L. kuivatatud lehtedest või maapealsetest osadest vee ja etanooli seguga (lahusti) pikendatud ekstraheerimise, pressimise ja filtrimise teel. EÜ number: 282-015-4 CASi number: 84082-70-2 Euroopa Nõukogu number: 282 Spetsifikatsioon Kuivainesisaldus: 1,84 % – 1,85 % Polüfenoolide üldsisaldus ⁽²⁾ : ≤ 0,1020 % Flavonoidid ⁽³⁾ : ≤ 0,0261 % Mentool: ≤ 0,0021 % Mentoon: ≤ 0,0010 % Rosmariinhape: ≤ 0,00099 %	Kõik loomalii- gid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — 86 mg kalkunibroilerite puhul; — 64 mg kanabroilerite ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude puhul; — 64 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude puhul; — 64 mg dekoratiivlindude puhul;	16. august 2036

Söödali- sandi identifitseeri- misnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategoo- ria	Vanuse ülempiir	Minimum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimetod</i>) (*) Söödalisandi kirjeldamine: — spektrofotomeetria polüfenoolide üldsisalduse ja flavonoidide üldsisalduse määramiseks; — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) mentooli ja mentooni sisalduse määramiseks; — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos spektrofotomeetrilise (UV) detektoriga rosmariinhappe sisalduse määramiseks.					— 95 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindude puhul; — 138 mg nuumsigade puhul; — 115 mg kõigi sigalaste piima- ja võõrdepörsaste puhul; — 115 mg vähemtähtsate sigalaste nuumloomade puhul; — 168 mg kõigi karja taastootmiseks ettenähtud sigalaste puhul; — 287 mg kuni 6 kuu vanuste nuumvasikate puhul; — 253 mg lammaste ja kitsede puhul; — 253 mg nuumveiste ja muude mäletsejaliste nuumloomade puhul, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni 6 kuu vanused nuumvasikad; kaamellaste nuumloomad; — 164 mg kõigi muude mäletsejaliste ja kõigi muude kaamellaste puhul; — 253 mg hobuslaste puhul; — 101 mg jänestlaste puhul; — 289 mg lõhelaste ja vähemtähtsate kalade puhul; — 303 mg koerte puhul; — 253 mg kasside puhul;	

Söödali- sandi identifitseeri- misnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategoo- ria	Vanuse ülempiir	Miinimum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							— 500 mg dekoratiivkalade puhul; — 64 mg muude liikide ja kategooriate puhul.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

⁽²⁾ Väljendatud gallushappe ekvivalentides (GAE).

⁽³⁾ Väljendatud hüperosiidi ekvivalentides.

⁽⁴⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Minimumsisal- dus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b455-t	Nõmm-liivatee tinktuur	<i>Söödalisandi koostis</i> Liigi <i>Thymus serpyllum</i> L. kuivatatud lehtedest või maapealsetest osadest saadud tinktuur. Vedelik <i>Toimeaine kirjeldus</i> Nõmm-liivatee tinktuur: Euroopa Nõukogu määratletud tinktuur, ⁽¹⁾ mis on saadud taime <i>Thymus serpyllum</i> L. kuivatatud lehtedest või maapealsetest osadest vee ja etanooli seguga (lahusti) pikendatud ekstraheerimise, pressimise ja filtrimise teel. EÜ number: 284-023-3 CASi number: 84776-98-7 Euroopa Nõukogu number: 455 Spetsifikatsioon Kuivainesisaldus: 1 % Polüfenoolide üldsisaldus ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Flavonoidid ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Tümol: ≤ 0,000020 % Karvakrool: ≤ 0,000043 % Rosmariinhape: ≤ 0,00107 % <i>Analüüsimetod</i> ⁽⁴⁾ Söödalisandi kirjeldamine: — spektrofotomeetria polüfenoolide üldsisalduse ja flavonoidide üldsisalduse määramiseks;	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — 96 mg kalkunibroilerite puhul; — 71 mg kanabroilerite ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude puhul; — 71 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude puhul; — 71 mg dekoratiivlindude puhul; — 106 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindude puhul; — 154 mg nuumsigade puhul;	16. august 2036

Söödalisandi identifitseerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal- dus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		— gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) tümooli ja karvakrooli sisalduse määramiseks; — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos spektrofotomeetrilise (UV) detektoriga rosmariinhappe sisalduse määramiseks.					— 128 mg kõigi sigalaste piima- ja võõrdepörsaste puhul; — 128 mg vähemtähtsate sigalaste nuumloomade puhul; — 187 mg kõigi karja taastootmiseks ettenähtud sigalaste puhul; — 321 mg kuni 6 kuu vanuste nuumvasikate puhul; — 282 mg lammaste ja kitsede puhul; — 282 mg nuumveiste ja muude mäletsejaliste nuumloomade puhul, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni 6 kuu vanused nuumvasikad; kaamellaste nuumloomad; — 183 mg kõigi muude mäletsejaliste ja kõigi muude kaamellaste puhul; — 282 mg hobuslaste puhul; — 113 mg jänestaste puhul; — 322 mg lõhelaste ja vähemtähtsate kalade puhul; — 338 mg koerte puhul; — 282 mg kasside puhul; — 500 mg dekoratiivkalade puhul; — 71 mg muude liikide ja kategooriate puhul.“	

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal-dus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

⁽²⁾ Väljendatud gallushappe ekvivalentides (GAE).

⁽³⁾ Väljendatud hüperosiidi ekvivalentides.

⁽⁴⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b414-t	Salveitinktuur	Söödalisandi koostis Liigi <i>Salvia officinalis</i> L. kuivatatud lehtedest saadud tinktuur. Vedelik Toimeaine kirjeldus Salveitinktuur: Euroopa Nõukogu määratletud tinktuur, ⁽¹⁾ mis on saadud taime <i>Salvia officinalis</i> L. kuivatatud lehtedest vee ja etanooli seguga (lahusti) pikendatud ekstraheerimise, pressimise ja filtrimise teel. EÜ number: 282-025-9 CASi number: 84082-79-1 Euroopa Nõukogu number: 414 Spetsifikatsioon Kuivainesisaldus: 1,75 % – 1,78 % Polüfenoolide üldsisaldus ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Flavonoidid ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Tujoonid: ≤ 0,0132 % Kamper: ≤ 0,0130 % 1,8-tsineool (eukalüptool): ≤ 0,0070 % Rosmariinhape: ≤ 0,0662 % Analüüsimetod) ⁽⁴⁾ Söödalisandi kirjeldamine: — spektrofotomeetria polüfenoolide üldsisalduse ja flavonoidide üldsisalduse määramiseks;	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — 47 mg kalkunibroilerite puhul; — 35 mg kanabroilerite ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude puhul; — 35 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude puhul; — 35 mg dekoratiivlindude puhul; — 52 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindude puhul; — 75 mg nuumsigade puhul;	16. august 2036

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisal-dus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		— gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) tujoonide, kampri ja 1,8-tsineooli sisalduse määramiseks; — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos spektrofotomeetrilise (UV) detektoriga rosmariinhappe sisalduse määramiseks.					— 62 mg kõigi sigalaste piima- ja võõrdepörsaste puhul; — 62 mg vähemtähtsate sigalaste nuumloomade puhul; — 91 mg kõigi karja taastootmiseks ettenähtud sigalaste puhul; — 156 mg kuni 6 kuu vanuste nuumvasikate puhul; — 137 mg lammaste ja kitsede puhul; — 137 mg nuumveiste ja muude mäletsejaliste nuumloomade puhul, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni 6 kuu vanused nuumvasikad; kaamellaste nuumloomad; — 89 mg kõigi muude mäletsejaliste ja kõigi muude kaamellaste puhul; — 137 mg hobuslaste puhul; — 55 mg jäneslaste puhul; — 156 mg lõhelaste ja vähemtähtsate kalade puhul; — 164 mg koerte puhul; — 137 mg kasside puhul; — 500 mg dekoratiivkalade puhul; — 35 mg muude liikide ja kategooriate puhul.“	

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

⁽²⁾ Väljendatud gallushappe ekvivalentides (GAE).

⁽³⁾ Väljendatud hüperosiidi ekvivalentides.

⁽⁴⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.