



РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/157 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2025 година

за разрешаване на употребата на микрокристална целулоза, метилцелулоза, етилцелулоза, хидроксипропилцелулоза, метилхидроксипропилцелулоза и натриева карбоксиметилцелулоза като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена в съответствие с Директива 70/524/ЕИО на Съвета ⁽²⁾.
- (2) С Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на веществата микрокристална целулоза, метилцелулоза, етилцелулоза, хидроксипропилцелулоза, метилхидроксипропилцелулоза и натриева карбоксиметилцелулоза като фуражни добавки за всички видове животни. Впоследствие в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003 посочените вещества бяха включени в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти.
- (3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент бяха подадени заявления за извършване на повторна оценка на веществата микрокристална целулоза, метилцелулоза, етилцелулоза, хидроксипропилцелулоза, метилхидроксипропилцелулоза и натриева карбоксиметилцелулоза като фуражни добавки за всички видове животни. Заявителите поискаха веществата микрокристална целулоза, метилцелулоза, метилхидроксипропилцелулоза и натриева карбоксиметилцелулоза да бъдат класифицирани в категорията „технологични добавки“ и във функционалните групи „емулгатори“, „стабилизатори“, „сгъстители“ и „желиращи агенти“, веществото етилцелулоза — в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „стабилизатори“, а веществото хидроксипропилцелулоза — в категорията „технологични добавки“ и във функционалните групи „емулгатори“, „стабилизатори“, „сгъстители“ и „желиращи агенти“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (4) Освен това, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени заявления за разрешаване на употребата на микрокристална целулоза, метилцелулоза, метилхидроксипропилцелулоза и натриева карбоксиметилцелулоза като фуражни добавки за всички видове животни, с искане те да бъдат класифицирани в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „свързващи вещества“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (5) В становищата си от 2 юли 2020 г.⁽³⁾ и 31 януари 2024 г.⁽⁴⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба веществата микрокристална целулоза, метилцелулоза, етилцелулоза, хидроксипропилцелулоза, метилхидроксипропилцелулоза и натриева карбоксиметилцелулоза са безопасни за всички видове животни, за потребителите и за околната среда. Поради липсата на данни той не беше в състояние да направи заключение относно безопасността за ползвателите. Не бяха предоставени конкретни данни за ефикасността на посочените добавки във фуражите, но тъй като всички изброени добавки са разрешени за употреба като добавки в храните, Органът стигна до заключението, че наблюдаваното при употребата на посочените вещества въздействие може да се очаква и когато те се използват като добавки във фуражи. Той също така провери докладите относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (6) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че веществата микрокристална целулоза, метилцелулоза, етилцелулоза, хидроксипропилцелулоза, метилхидроксипропилцелулоза и натриева карбоксиметилцелулоза отговарят на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена. Освен това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответни предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавките.
- (7) Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, доколкото те принадлежат към функционалните групи „емулгатори“, „стабилизатори“, „сгъстители“ и „желиращи агенти“, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да се съобразят с новите изисквания, произтичащи от разрешението.
- (8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и към функционалните групи „емулгатори“, „стабилизатори“, „сгъстители“, „желиращи вещества“ и „свързващи вещества“, като добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

- Фуражните добавки микрокристална целулоза, метилцелулоза, етилцелулоза, хидроксипропилцелулоза, метилхидроксипропилцелулоза и натриева карбоксиметилцелулоза, разрешени съгласно Директива 70/524/ЕИО, и съдържащите ги премикси, произведени и етикетирани преди 19 август 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 февруари 2025 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на съответните складови наличности.
- Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат упоменатите в параграф 1 добавки и са произведени и етикетирани преди 19 февруари 2026 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 февруари 2025 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на съответните складови наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

⁽³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(7):6209; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(7):6212; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(7):6210; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(7):6213; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(7):6234; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(7):6211.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2024; 22:e8625; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2024; 22:e8637; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2024; 22:e8636; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2024; 22:e8626.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат упоменатите в параграф 1 добавки и са произведени и етикетирани преди 19 февруари 2027 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 февруари 2025 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на съответните складови наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентифи- кационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „емулгатори“								
1с460i	Микрокристална целулоза	Състав на добавката Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база) В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база), произведена от дървесна маса, частично деполимеризирана чрез процес на хидролизиране, предизвикан с помощта на топлина и минерална киселина CAS №: 9004-34-6 Загуба при сушене: ≤ 7 % Водоразтворими вещества: ≤ 0,24 % Сулфатна пепел: ≤ 0,5 % Нишесте: не се открива Карбоксилни групи ≤ 1 % Размер на частиците: ≤ 10 % частици с размер под 5 µm	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на микрокристална целулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията ⁽²⁾ за микрокристална целулоза и съответните методи от монография „микрокристална целулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД						

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „стабилизатори“								
1с460i	Микрокристална целулоза	<i>Състав на добавката</i> Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база) В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база), произведена от дървесна маса, частично деполимеризирана чрез процес на хидролизиране, предизвикан с помощта на топлина и минерална киселина CAS №: 9004-34-6 Загуба при сушене: ≤ 7 % Водоразтворими вещества: ≤ 0,24 % Сулфатна пепел: ≤ 0,5 % Карбоксилни групи ≤ 1 % Размер на частиците: ≤ 10 % частици с размер под 5 μm <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За идентифициране/характеризиране на микрокристална целулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за микрокристална целулоза и съответните методи от монография „микрокристална целулоза“ на	Всички видове животни	—	—	—	1. В утъването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД						

(⁴) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „сгъстителни“

1с460i	Микрокристална целулоза	<i>Състав на добавката</i> Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база) В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база), произведена от дървесна маса, частично деполимеризирана чрез процес на хидролизиране, предизвикан с	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят	19 февруари 2035 г.
--------	-------------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		помощта на топлина и минерална киселина CAS №: 9004-34-6 Загуба при сушене: ≤ 7 % Водоразтворими вещества: ≤ 0,24 % Сулфатна пепел: ≤ 0,5 % Карбоксилни групи ≤ 1 % Размер на частиците: ≤ 10 % частици с размер под 5 µm Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на микрокристална целулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за микрокристална целулоза и съответните методи от монография „микрокристална целулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД					организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „желиращи агенти“

1с460i	Микрокристална целулоза	<i>Състав на добавката</i> Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база) В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база), произведена от дървесна маса, частично деполимеризирана чрез процес на хидролизиране, предизвикан с помощта на топлина и минерална киселина CAS №: 9004-34-6 Загуба при сушене: ≤ 7 % Водоразтворими вещества: $\leq 0,24$ % Сулфатна пепел: $\leq 0,5$ % Карбоксилни групи ≤ 1 % Размер на частиците: ≤ 10 % частици с размер под $5 \mu\text{m}$ <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За идентифициране/характеризиране на микрокристална целулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за микрокристална целулоза и съответните методи от монография „микрокристална целулоза“ на	Всички видове животни	—	—	—	1. В утъването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.
--------	-------------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД						

(⁴) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „свързващи вещества“

1с460i	Микрокристална целулоза	<i>Състав на добавката</i> Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база) <i>В твърдо състояние</i> <i>Характеристика на активното вещество</i> Микрокристална целулоза ≥ 97 % (изчислена като целулоза на безводна база), произведена от дървесна маса,	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва	19 февруари 2035 г.
--------	-------------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		частично деполимеризирана чрез процес на хидролизиране, предизвикан с помощта на топлина и минерална киселина CAS №: 9004-34-6 Загуба при сушене: ≤ 7 % Водоразтворими вещества: ≤ 0,24 % Сулфатна пепел: ≤ 0,5 % Карбоксилни групи ≤ 1 % Размер на частиците: ≤ 10 % частици с размер под 5 µm Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на микрокристална целулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за микрокристална целулоза и съответните методи от монография „микрокристална целулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД					да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „емулгатори“								
1с461	Метилцелулоза	Състав на добавката Метилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Метилцелулоза, получена от дървесна маса или памучни влакна посредством алкална обработка и метилиране на алкалната целулоза с хлорометан (метилхлорид) CAS №: 9004-67-5 Съдържание на метоксисови групи (-OCH₃) не по-малко от 25 % и не повече от 33 % и на хидроксietоксисови групи (-OCH₂CH₂OH) — не повече от 5 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилцелулоза, съответните методи от монография „метилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0345 от Европейската фармакопея						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „стабилизатори“

1с461	Метилцелулоза	<i>Състав на добавката</i> Метилцелулоза В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Метилцелулоза, получена от дървесна маса или памучни влакна посредством алкална обработка и метилиране на алкалната целулоза с хлорометан (метилхлорид) CAS №: 9004-67-5 Съдържание на метоксилови групи (-OCH₃) не по-малко от 25 % и не повече от 33 % и на хидроксietоксилови групи	Всички видове животни	—	—	—	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и	19 февруари 2035 г.
-------	---------------	--	-----------------------	---	---	---	---	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		(-OCH ₂ CH ₂ OH) — не повече от 5 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилцелулоза, съответните методи от монография „метилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0345 от Европейската фармакопея					премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „сгъстители“								
1с461	Метилцелулоза	Състав на добавката Метилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Метилцелулоза, получена от дървесна маса или памучни влакна посредством алкална обработка и метилиране на алкалната целулоза с хлорометан (метилхлорид) CAS №: 9004-67-5 Съдържание на метоксисови групи (-OCH₃) не по-малко от 25 % и не повече от 33 % и на хидроксиетоксисови групи (-OCH₂CH₂OH) — не повече от 5 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилцелулоза, съответните методи от монография „метилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното	Всички видове животни	—	—	—	1. В упу̀тването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0345 от Европейската фармакопея						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „желиращи агенти“

1с461	Метилцелулоза	Състав на добавката Метилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Метилцелулоза, получена от дървесна маса или памучни влакна посредством алкална обработка и метилиране на алкалната целулоза с хлорометан (метилхлорид) CAS №: 9004-67-5	Всички видове животни	—	—	—	1. В утъгването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят	19 февруари 2035 г.
-------	---------------	---	-----------------------	---	---	---	---	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Съдържание на метоксилови групи (-OCH ₃) не по-малко от 25 % и не повече от 33 % и на хидроксietоксилови групи (-OCH ₂ CH ₂ OH) — не повече от 5 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилцелулоза, съответните методи от монография „метилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0345 от Европейската фармакопея					организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „свързващи вещества“								
1с461	Метилцелулоза	Състав на добавката Метилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Метилцелулоза, получена от дървесна маса или памучни влакна посредством алкална обработка и метилиране на алкалната целулоза с хлорометан (метилхлорид) CAS №: 9004-67-5 Съдържание на метоксилови групи (-OCH₃) не по-малко от 25 % и не повече от 33 % и на хидроксиетоксилови групи (-OCH₂CH₂OH) — не повече от 5 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилцелулоза, съответните методи от монография „метилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0345 от Европейската фармакопея						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „стабилизатори“

1d462	Етилцелулоза	Състав на добавката Етилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Етилцелулоза, получена чрез реакция на частично деполимеризирана целулоза с хлоретан (етилхлорид) Етоксилови групи (-OC₂H₅): > 44 % и < 50 % на суха база (еквивалентни на най-много 2,6 етоксилови групи на	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят	19 февруари 2035 г.
-------	--------------	---	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		анхидроглюкозна единица) CAS №: 9004-57-3 Загуба при сушене: ≤ 3 % Сулфатна пепел: ≤ 0,4 % Метод за анализ (1) За идентифициране/характеризиране на етилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за етилцелулоза и съответните методи, описани в монография „етилцелулоза“ на ФАО/СЕКДХ и монография 0822 на Европейската фармакопея					организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „емулгатори“								
1с463	Хидроксипропилцелулоза	<i>Състав на добавката</i> Хидроксипропилцелулоза В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Хидроксипропилцелулоза, получена посредством частична етерификация на целулоза от влакнест растителен материал с хидроксипропилови групи Хидроксипропоксилови групи (-OCH₂CHONCH₃): ≤ 80,5 %, еквивалентни на най-много 4,6 хидроксипропилови групи на анхидроглюкозна единица, на безводна база CAS №: 9004-64-2 Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 0,5 % Пропилен хлорхидрини ≤ 0,1 mg/kg <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За идентифициране/характеризиране на хидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за хидроксипропилцелулоза и съответните методи от монография „хидроксипропилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното	Всички видове животни	—	—	—	1. В утъването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвият организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0337 от Европейската фармакопея						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „стабилизатори“

1с463	Хидроксипропилцелулоза	<i>Състав на добавката</i> Хидроксипропилцелулоза <i>В твърдо състояние</i> <i>Характеристика на активното вещество</i> Хидроксипропилцелулоза, получена посредством частична етерификация на целулоза от влакнест растителен материал с хидроксипропилови групи Хидроксипропоксилови групи (-ОСН ₂ СНОНСН ₃): ≤ 80,5 %, еквивалентни на най-много 4,6	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвият организационни мерки за ползвателите на добавката и	19 февруари 2035 г.
-------	------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		хидроксипропилови групи на анхидроглюкозна единица, на безводна база CAS №: 9004-64-2 Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 0,5 % Пропилен хлорхидрини ≤ 0,1 mg/kg Метод за анализ (1) За идентифициране/характеризиране на хидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за хидроксипропилцелулоза и съответните методи от монография „хидроксипропилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0337 от Европейската фармакопея					премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „сгъстители“								
1с463	Хидроксипропилцелулоза	<i>Състав на добавката</i> Хидроксипропилцелулоза В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Хидроксипропилцелулоза, получена посредством частична етерификация на целулоза от влакнест растителен материал с хидроксипропилови групи Хидроксипропоксилови групи (-OCH₂CHONCH₃): ≤ 80,5 %, еквивалентни на най-много 4,6 хидроксипропилови групи на анхидроглюкозна единица, на безводна база CAS №: 9004-64-2 Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 0,5 % Пропилен хлорхидрини ≤ 0,1 mg/kg <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За идентифициране/характеризиране на хидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за хидроксипропилцелулоза и съответните методи от монография „хидроксипропилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното	Всички видове животни	—	—	—	1. В утъването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвият организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0337 от Европейската фармакопея						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „желиращи агенти“

1с463	Хидроксипропилцелулоза	Състав на добавката Хидроксипропилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Хидроксипропилцелулоза, получена посредством частична етерификация на целулоза от влакнест растителен материал с хидроксипропилови групи Хидроксипропоксидови групи (-OCH₂CHONCH₃): ≤ 80,5 %, , еквивалентни на най-много 4,6	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвият организационни мерки за ползвателите на добавката и	19 февруари 2035 г.
-------	------------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		хидроксипропилови групи на анхидроглюкозна единица, на безводна база CAS №: 9004-64-2 Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 0,5 % Пропилен хлорхидрини ≤ 0,1 mg/kg Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на хидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за хидроксипропилцелулоза и съответните методи от монография „хидроксипропилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0337 от Европейската фармакопея					премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „емулгатори“								
1с464	Метилхидроксипропилцелулоза	Състав на добавката Метилхидроксипропилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Метилхидроксипропилцелулоза, произведена чрез реакция на частично деполимеризирана целулоза с метилови групи и с ниска степен на заместване на хидроксипропил CAS №: 9004-65-3 Метоксилови групи (-OCH₃) 19—30 % Хидроксипропоксилови групи (-OCH₂CHОНCH₃): 3—12 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % (за продукти с вискозитет 50 mPa.s или повече); ≤ 3 % (за продукти с вискозитет под 50 mPa.s) Пропиленхлорхидрини: ≤ 0,1 mg/kg Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилхидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилхидроксипропилцелулоза, съответните методи от монография „метилхидроксипропилцелулоза“ на	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0348 от Европейската фармакопея						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „стабилизатори“

1с464	Метилхидроксипропилцелулоза	<i>Състав на добавката</i> Метилхидроксипропилцелулоза <i>В твърдо състояние</i> <i>Характеристика на активното вещество</i> Метилхидроксипропилцелулоза, произведена чрез реакция на частично деполимеризирана целулоза с метилови	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на	19 февруари 2035 г.
-------	-----------------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		групи и с ниска степен на заместване на хидроксипропил CAS №: 9004-65-3 Метоксилови групи (-OCH ₃) 19—30 % Хидроксипропоксилови групи (-OCH ₂ CHONCH ₃): 3—12 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % (за продукти с вискозитет 50 mPa.s или повече); ≤ 3 % (за продукти с вискозитет под 50 mPa.s) Пропиленхлорхидрини: ≤ 0,1 mg/kg Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилхидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилхидроксипропилцелулоза, съответните методи от монография „метилхидроксипропилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0348 от Европейската фармакопея					употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „сгъстители“								
1с464	Метилхидроксипропилцелулоза	Състав на добавката Метилхидроксипропилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Метилхидроксипропилцелулоза, произведена чрез реакция на частично деполимеризирана целулоза с метилови групи и с ниска степен на заместване на хидроксипропил CAS №: 9004-65-3 Метоксилови групи (-OCH₃): 19—30 % Хидроксипропоксилови групи (-OCH₂CHОНCH₃): 3—12 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % (за продукти с вискозитет 50 mPa.s или повече); ≤ 3 % (за продукти с вискозитет под 50 mPa.s) Пропиленхлорхидрини: ≤ 0,1 mg/kg Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилхидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилхидроксипропилцелулоза, съответните методи от монография „метилхидроксипропилцелулоза“ на	Всички видове животни	—	—	—	1. В утъването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0348 от Европейската фармакопея						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „желиращи агенти“

1с464	Метилхидроксипропилцелулоза	<i>Състав на добавката</i> Метилхидроксипропилцелулоза В твърдо състояние <i>Характеристика на активното вещество</i> Метилхидроксипропилцелулоза, произведена чрез реакция на частично деполимеризирана целулоза с метилови	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на	19 февруари 2035 г.
-------	-----------------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		групи и с ниска степен на заместване на хидроксипропил CAS №: 9004-65-3 Метоксилови групи (-OCH ₃): 19—30 % Хидроксипропоксилови групи (-OCH ₂ CHONCH ₃): 3—12 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % (за продукти с вискозитет 50 mPa.s или повече); ≤ 3 % (за продукти с вискозитет под 50 mPa.s) Пропиленхлорхидрини: ≤ 0,1 mg/kg Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилхидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилхидроксипропилцелулоза, съответните методи от монография „метилхидроксипропилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0348 от Европейската фармакопея					употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „свързващи вещества“								
1с464	Метилхидроксипропилцелулоза	Състав на добавката Метилхидроксипропилцелулоза В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Метилхидроксипропилцелулоза, произведена чрез реакция на частично деполимеризирана целулоза с метилови групи и с ниска степен на заместване на хидроксипропил CAS №: 9004-65-3 Метоксилови групи (-OCH₃) 19—30 % Хидроксипропоксилови групи (-OCH₂CHONCH₃): 3—12 % Загуба при сушене: ≤ 10 % Сулфатна пепел: ≤ 1,5 % (за продукти с вискозитет 50 mPa.s или повече); ≤ 3 % (за продукти с вискозитет под 50 mPa.s) Пропиленхлорхидрини: ≤ 0,1 mg/kg Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на метилхидроксипропилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за метилхидроксипропилцелулоза, съответните методи от монография „метилхидроксипропилцелулоза“ на	Всички видове животни	—	—	—	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ), том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД и монография 0348 от Европейската фармакопея						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „емулгатори“

1с466	Натриева карбоксиметилцелулоза	Състав на добавката Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база) В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база), получена чрез реакция на етерификация между	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва	19 февруари 2035 г.
-------	--------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		алкало-целулозния комплекс и монохлороцетна киселина. CAS №: 9000-32-4 Карбоксиметилови групи (-CH ₂ COOH): 0,2—1,5 на анхидроглюкозна единица Загуба при сушене: ≤ 12 % Общо гликолат: ≤ 0,4 % (като натриев гликолат на безводна база) Натрий: ≤ 12,4 % (на безводна база) Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на натриева карбоксиметилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за натриева карбоксиметилцелулоза и съответните методи от монография „натриева карбоксиметилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД.					да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „стабилизатори“								
1с466	Натриева карбоксиметилцелулоза	Състав на добавката Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база) В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база), получена чрез реакция на етерификация между алкало-целулозния комплекс и монохлороцетна киселина. CAS №: 9000-32-4 Карбоксиметилкови групи (-CH₂COOH): 0,2—1,5 на анхидроглюкозна единица Загуба при сушене: ≤ 12 % Общо гликолат: ≤ 0,4 % (като натриев гликолат на безводна база) Натрий: ≤ 12,4 % (на безводна база) Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на натриева карбоксиметилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за натриева карбоксиметилцелулоза и съответните методи от монография „натриева карбоксиметилцелулоза“	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД.						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „сгъстител“

1с466	Натриева карбоксиметилцелулоза	Състав на добавката Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база) В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база), получена чрез реакция на етерификация между алкало-целулозния комплекс и	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни	19 февруари 2035 г.
-------	--------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		монохлороцетна киселина. CAS №: 9000-32-4 Карбоксиметиллови групи (-CH₂COOH): 0,2—1,5 на анхидроглюкозна единица Загуба при сушене: ≤ 12 % Общо гликолат: ≤ 0,4 % (като натриев гликолат на безводна база) Натрий: ≤ 12,4 % (на безводна база) Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на натриева карбоксиметилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за натриева карбоксиметилцелулоза и съответните методи от монография „натриева карбоксиметилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД.					процедури и да предвият организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „желиращи агенти“								
1с466	Натриева карбоксиметилцелулоза	Състав на добавката Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база) В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база), получена чрез реакция на етерификация между алкало-целулозния комплекс и монохлороцетна киселина. CAS №: 9000-32-4 Карбоксиметилкови групи (-CH₂COOH): 0,2—1,5 на анхидроглюкозна единица Загуба при сушене: ≤ 12 % Общо гликолат: ≤ 0,4 % (като натриев гликолат на безводна база) Натрий: ≤ 12,4 % (на безводна база) Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на натриева карбоксиметилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за натриева карбоксиметилцелулоза и съответните методи от монография „натриева карбоксиметилцелулоза“	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	19 февруари 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД.						

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“ Функционална група: „свързващи вещества“

1с466	Натриева карбоксиметилцелулоза	Състав на добавката Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база) В твърдо състояние Характеристика на активното вещество Натриева карбоксиметилцелулоза ≥ 99,5 % (на безводна база), получена чрез реакция на етерификация между алкало-целулозния комплекс и	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. С оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата на добавката и премиксите операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни	19 февруари 2035 г.
-------	--------------------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	---------------------

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		монохлороцетна киселина. CAS №: 9000-32-4 Карбоксиметиллови групи (-CH₂COOH): 0,2—1,5 на анхидроглюкозна единица Загуба при сушене: ≤ 12 % Общо гликолат: ≤ 0,4 % (като натриев гликолат на безводна база) Натрий: ≤ 12,4 % (на безводна база) Метод за анализ ⁽¹⁾ За идентифициране/характеризиране на натриева карбоксиметилцелулоза във фуражната добавка: — Регламент (ЕС) № 231/2012 за натриева карбоксиметилцелулоза и съответните методи от монография „натриева карбоксиметилцелулоза“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) и том 4 на комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД.					процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.