



KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/157

2025 m. sausio 29 d.

**dėl leidimo naudoti mikrokristalinę celiuliozę, metilceliuliozę, etilceliuliozę,
hidroksipropilceliuliozę, hidroksipropilmetilceliuliozę ir natrio karboksimetilceliuliozę kaip visų
rūšių gyvūnų pašarų priedus**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ⁽²⁾;
- (2) pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti mikrokristalinę celiuliozę, metilceliuliozę, etilceliuliozę, hidroksipropilceliuliozę, hidroksipropilmetilceliuliozę ir natrio karboksimetilceliuliozę kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šios medžiagos buvo įtrauktos į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;
- (3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateikti prašymai iš naujo įvertinti mikrokristalinę celiuliozę, metilceliuliozę, etilceliuliozę, hidroksipropilceliuliozę, hidroksipropilmetilceliuliozę ir natrio karboksimetilceliuliozę kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Pareiškėjai paprašė priskirti mikrokristalinę celiuliozę, metilceliuliozę, hidroksipropilmetilceliuliozę ir natrio karboksimetilceliuliozę prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinių grupių „emulsikliai“, „stabilizatoriai“, „tirštikliai“ ir „stingdikliai“; etilceliuliozę prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „stabilizatoriai“, o hidroksipropilceliuliozę prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „emulsikliai“, „stabilizatoriai“, „tirštikliai“ ir „stingdikliai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (4) be to, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsniu buvo pateikti prašymai suteikti leidimą naudoti mikrokristalinę celiuliozę, metilceliuliozę, hidroksipropilmetilceliuliozę ir natrio karboksimetilceliuliozę kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir priskirti juos prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „rišikliai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- (5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2020 m. liepos 2 d.⁽³⁾ ir 2024 m. sausio 31 d.⁽⁴⁾ nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis mikrokristalinė celiuliozė, metilceliuliozė, etilceliuliozė, hidroksipropilceliuliozė, hidroksipropilmetilceliuliozė ir natrio karboksimetilceliuliozė yra saugios visų rūšių gyvūnams, vartotojams ir aplinkai. Neturėdama duomenų, ji negalėjo padaryti išvados dėl naudotojų saugos. Konkrečių duomenų apie šių priedų veiksmingumą pašaruose nepateikta, bet, kadangi visus šiuos priedus leidžiama naudoti kaip maisto priedus, Tarnyba padarė išvadą, kad galima pagrįstai tikėtis, jog poveikis, matomas naudojant šias medžiagas maisto produktuose, bus matomas jas naudojant kaip pašarų priedus. Be to, patvirtinama pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad mikrokristalinė celiuliozė, metilceliuliozė, etilceliuliozė, hidroksipropilceliuliozė, hidroksipropilmetilceliuliozė ir natrio karboksimetilceliuliozė atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl šias medžiagas turėtų būti leista naudoti. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedų naudotojų sveikatai;
- (7) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, kai jos priklauso funkcinėms grupėms „emulsikliai“, „stabilizatoriai“, „tirštikliai“ ir „stingdikliai“, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;
- (8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinėms grupėms „emulsikliai“, „stabilizatoriai“, „tirštikliai“, „stingdikliai“ arba „rišikliai“ leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedus mikrokristalinę celiuliozė, metilceliuliozė, etilceliuliozė, hidroksipropilceliuliozė, hidroksipropilmetilceliuliozė ir natrio karboksimetilceliuliozė, kuriuos leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2025 m. rugpjūčio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2025 m. vasario 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol nepasibaigs turimos atsargos.

2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2026 m. vasario 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2025 m. vasario 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol nepasibaigs turimos atsargos.

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(7):6209; EFSA Journal 2020;18(7):6212; EFSA Journal 2020;18(7):6210; EFSA Journal 2020;18(7):6213; EFSA Journal 2020;18(7):6234; EFSA Journal 2020;18(7):6211.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2024;22:e8625; EFSA Journal 2024;22:e8637; EFSA Journal 2024;22:e8636; EFSA Journal 2024;22:e8626.

3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. vasario 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2025 m. vasario 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol nepasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: emulsikliai								
1c460i	Mikrokristalinė celiuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė) Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė), pagaminta iš medienos plaušienos, iš dalies depolimerizuotos hidrolizavimo būdu, gautos naudojant šilumą ir neorganinę rūgštį. CAS Nr.: 9004-34-6 Nuodžiūvis: ≤ 7 % Vandenyje tirpi cheminė medžiaga: ≤ 0,24 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Krakmolas: neaptinkama Karboksigrupės ≤ 1 % Dalelių dydis: ≤ 10 % dalelių, mažesnių kaip 5 µm	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		<i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Mikrokristalinės celiuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012 ⁽²⁾ mikrokristalinės celiuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA mikrokristalinei celiuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'microcrystalline cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)						

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ 2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stabilizatoriai								
1c460i	Mikrokristalinė celiuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė) Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė), pagaminta iš medienos plaušienos, iš dalies depolimerizuotos hidrolizavimo būdu, gautos naudojant šilumą ir neorganinę rūgštį. CAS Nr.: 9004-34-6 Nuodžiūvis: ≤ 7 % Vandenyje tirpi cheminė medžiaga: ≤ 0,24 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Karboksigrupės ≤ 1 % Dalelių dydis: ≤ 10 % dalelių, mažesnių kaip 5 μm <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Mikrokristalinės celiuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 mikrokristalinės celiuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		mikrokristalinei celiuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'microcrystalline cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: tirštikliai

1c460i	Mikrokristalinė celiuliozė	Priedo sudėtis Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė) Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė), pagaminta iš medienos plaušienos, iš dalies depolimerizuotos hidrolizavimo būdu, gautos naudojant	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos.	2035 m. vasario 19 d.
--------	----------------------------	--	--------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		šilumą ir neorganinę rūgštį. CAS Nr.: 9004-34-6 Nuodžiūvis: ≤ 7 % Vandenyje tirpi cheminė medžiaga: ≤ 0,24 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Karboksigrupės ≤ 1 % Dalelių dydis: ≤ 10 % dalelių, mažesnių kaip 5 µm Analizės metodas ⁽¹⁾ Mikrokristalinės celiuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 mikrokristalinės celiuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA mikrokristalinei celiuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'microcrystalline cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)					Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stingdikliai								
1c460i	Mikrokristalinė celiuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė) Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė), pagaminta iš medienos plaušienos, iš dalies depolimerizuotos hidrolizavimo būdu, gautos naudojant šilumą ir neorganinę rūgštį. CAS Nr.: 9004-34-6 Nuodžiūvis: ≤ 7 % Vandenyje tirpi cheminė medžiaga: ≤ 0,24 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Karboksigrupės ≤ 1 % Dalelių dydis: ≤ 10 % dalelių, mažesnių kaip 5 μm <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Mikrokristalinės celiuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 mikrokristalinės celiuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kacija- vimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		mikrokristalinei celiuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'microcrystalline cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: rišikliai

1c460i	Mikrokristalinė celiuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė) Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Mikrokristalinė celiuliozė ≥ 97 % (apskaičiuota kaip bevandenė celiuliozė), pagaminta iš medienos plaušienos, iš dalies depolimerizuotos	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų	2035 m. vasario 19 d.
--------	----------------------------	--	--------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		hidrolizavimo būdu, gautos naudojant šilumą ir neorganinę rūgštį. CAS Nr.: 9004-34-6 Nuodžiūvis: ≤ 7 % Vandenyje tirpi cheminė medžiaga: ≤ 0,24 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Karboksigrupės ≤ 1 % Dalelių dydis: ≤ 10 % dalelių, mažesnių kaip 5 µm <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Mikrokristalinės celiuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 mikrokristalinės celiuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA mikrokristalinei celiuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'microcrystalline cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)					išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: emulsikliai								
1c461	Metilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Metilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Metilceliuliozė, gaunama iš medienos plaušienos arba medvilnės apdorojant šarmu ir metilinant šarminę celiuliozę su metilchloridu. CAS Nr.: 9004-67-5 Ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 33 % metoksilo grupių (-OCH₃) ir ne daugiau kaip 5 % hidroksietoksilo grupių (-OCH₂CH₂OH) Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Metilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA metilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'Methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0345						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stabilizatoriai

1c461	Metilceliuliozė	Priedo sudėtis Metilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Metilceliuliozė, gaunama iš medienos plaušienos arba medvilnės apdorojant šarmu ir metilinant šarminę celiuliozę su metilchloridu. CAS Nr.: 9004-67-5 Ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 33 % metoksilo grupių (-OCH₃) ir ne	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos	2035 m. vasario 19 d.
-------	-----------------	--	--------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		daugiau kaip 5 % hidroksietoksilo grupių (-OCH ₂ CH ₂ OH) Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Metilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA metilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'Methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0345					negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: tirštikliai								
1c461	Metilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Metilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Metilceliuliozė, gaunama iš medienos plaušienos arba medvilnės apdorojant šarmu ir metilinant šarminę celiuliozę su metilchloridu. CAS Nr.: 9004-67-5 Ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 33 % metoksilo grupių (-OCH₃) ir ne daugiau kaip 5 % hidroksietoksilo grupių (-OCH₂CH₂OH) Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Metilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA metilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'Methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0345						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stingdikliai

1c461	Metilceliuliozė	Priedo sudėtis Metilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Metilceliuliozė, gaunama iš medienos plaušienos arba medvilnės apdorojant šarmu ir metilinant šarminę celiuliozę su metilchloridu. CAS Nr.: 9004-67-5	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos.	2035 m. vasario 19 d.
-------	-----------------	---	--------------------	---	---	---	--	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		Ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 33 % metoksilo grupių (-OCH ₃) ir ne daugiau kaip 5 % hidroksietoksilo grupių (-OCH ₂ CH ₂ OH) Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % <i>Analizės metodas</i> (¹) Metilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA metilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'Methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0345					Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: rišikliai								
1c461	Metilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Metilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Metilceliuliozė, gaunama iš medienos plaušienos arba medvilnės apdorojant šarmu ir metilinant šarminę celiuliozę su metilchloridu. CAS Nr.: 9004-67-5 Ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 33 % metoksilo grupių (-OCH₃) ir ne daugiau kaip 5 % hidroksietoksilo grupių (-OCH₂CH₂OH) Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Metilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA metilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'Methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0345						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stabilizatoriai

1d462	Etilceliuliozė	Priedo sudėtis Etilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Etilceliuliozė, gaunama vykstant iš dalies depolimerizuotos celiuliozės reakcijai su etilchloridu. Etoksilo grupės (-OC₂H₅): > 44 % ir < 50% sausoje medžiagoje (atitinka ne daugiau kaip 2,6 etoksilo grupių	Visų rūšių gyvūnais	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras	2035 m. vasario 19 d.
-------	----------------	--	---------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		viename anhidrogliukozės vienetu) CAS Nr.: 9004-57-3 Nuodžiūvis: ≤ 3 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,4 % <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Etilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 dėl etilceliuliozės ir atitinkami metodai, aprašyti FAO JECFA etilceliuliozei skirtoje monografijoje (FAO JECFA 'Ethyl cellulose' monograph) ir Europos farmakopėjos monografijoje 0822					ir priemonės šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: emulsikliai								
1c463	Hidroksipropilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Hidroksipropilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Hidroksipropilceliuliozė, gaunama iš pluoštinės augalinės medžiagos dalinio celiulozės eterinimo su hidroksipropilo grupėmis būdu Hidroksipropoksilo grupės (-OCH₂CHOHCH₃): ≤ 80,5 % atitinka ne daugiau kaip 4,6 hidroksipropilo grupių viename anhidrogliukozės vienetė, skaičiuojant bevandenei medžiagai CAS Nr.: 9004-64-2 Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Propileno chlorhidrinai ≤ 0,1 mg/kg <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 hidroksipropilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'hydroxypropyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0337						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stabilizatoriai

1c463	Hidroksipropilceliuliozė	Priedo sudėtis Hidroksipropilceliuliozė Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Hidroksipropilceliuliozė, gaunama iš pluoštinės augalinės medžiagos dalinio celiulozės eterinimo su hidroksipropilo grupėmis būdu Hidroksipropoksilo grupės ($-\text{OCH}_2\text{CHOHCH}_3$): $\leq 80,5$ % atitinka ne daugiau kaip 4,6 hidroksipropilo grupių	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos	2035 m. vasario 19 d.
-------	--------------------------	---	--------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		viename anhidrogliukozės vienetė, skaičiuojant bevandenei medžiagai CAS Nr.: 9004-64-2 Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Propileno chlorhidrinai ≤ 0,1 mg/kg <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 hidroksipropilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA <i>‘hydroxypropyl cellulose’ monograph</i>) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA <i>combined compendium for food additives specifications, volume 4</i>) ir Europos farmakopėjos monografijos 0337					negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: tirštikliai								
1c463	Hidroksipropilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Hidroksipropilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Hidroksipropilceliuliozė, gaunama iš pluoštinės augalinės medžiagos dalinio celiulozės eterinimo su hidroksipropilo grupėmis būdu Hidroksipropoksilo grupės (-OCH₂CHOHCH₃): ≤ 80,5 % atitinka ne daugiau kaip 4,6 hidroksipropilo grupių viename anhidrogliukozės vienetė, skaičiuojant bevandenei medžiagai CAS Nr.: 9004-64-2 Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Propileno chlorhidrinai ≤ 0,1 mg/kg <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 hidroksipropilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		<i>'hydroxypropyl cellulose' monograph</i>) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (<i>FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4</i>) ir Europos farmakopėjos monografijos 0337						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stingdikliai

1c463	Hidroksipropilceliuliozė	Priedo sudėtis Hidroksipropilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Hidroksipropilceliuliozė, gaunama iš pluoštinės augalinės medžiagos dalinio celiulozės eterinimo su hidroksipropilo grupėmis būdu Hidroksipropoksilo grupės (-OCH₂CHOHCH₃): ≤ 80,5 % atitinka ne daugiau kaip 4,6 hidroksipropilo grupių	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos	2035 m. vasario 19 d.
-------	--------------------------	---	--------------------	---	---	---	--	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		viename anhidrogliukozės vienetė, skaičiuojant bevandenei medžiagai CAS Nr.: 9004-64-2 Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 0,5 % Propileno chlorhidrinai ≤ 0,1 mg/kg <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 hidroksipropilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA <i>‘hydroxypropyl cellulose’ monograph</i>) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA <i>combined compendium for food additives specifications, volume 4</i>) ir Europos farmakopėjos monografijos 0337					negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemonės.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: emulsikliai								
1c464	Hidroksipropilmetilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Hidroksipropilmetilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Hidroksipropilmetilceliuliozė, pagaminta vykdant iš dalies depolimerizuotos celiuliozės reakciją su metilo grupėmis ir turinti mažai hidroksipropilo pakaitalų. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilo grupės (-OCH₃) 19-30 % Hidroksipropoksilo grupės (-OCH₂CHOHCH₃): 3-12 % Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % (kai produktų klampa ne mažesnė kaip 50 mPa.s); ≤ 3 % (kai produktų klampa mažesnė kaip 50 mPa.s) Propileno chlorhidrinai: ≤ 0,1 mg/kg. <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilmetilceliuliozei skirtos	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		monografijos (FAO JECFA 'Hydroxypropyl methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0348						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stabilizatoriai

1c464	Hidroksipropilmetilceliuliozė	Priedo sudėtis Hidroksipropilmetilceliuliozė Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Hidroksipropilmetilceliuliozė, pagaminta vykdant iš dalies depolimerizuotos celiuliozės reakciją su metilo grupėmis ir	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo	2035 m. vasario 19 d.
-------	-------------------------------	---	--------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		turinti mažai hidroksipropilo pakaitalų. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilo grupės (-OCH₃) 19-30 % Hidroksipropoksilo grupės (-OCH₂CHOHCH₃): 3-12 % Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % (kai produktų klampa ne mažesnė kaip 50 mPa.s); ≤ 3 % (kai produktų klampa mažesnė kaip 50 mPa.s) Propileno chlorhidrinai: ≤ 0,1 mg/kg. <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilmetilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'Hydroxypropyl methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0348					procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmeninės odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: tirštikliai								
1c464	Hidroksipropilmetilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Hidroksipropilmetilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Hidroksipropilmetilceliuliozė, pagaminta vykdant iš dalies depolimerizuotos celiuliozės reakciją su metilo grupėmis ir turinti mažai hidroksipropilo pakaitalų. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilo grupės (-OCH₃) 19-30 % Hidroksipropoksilo grupės (-OCH₂CHOHCH₃): 3-12 % Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % (kai produktų klampa ne mažesnė kaip 50 mPa.s); ≤ 3 % (kai produktų klampa mažesnė kaip 50 mPa.s) Propileno chlorhidrinai: ≤ 0,1 mg/kg. <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilmetilceliuliozei skirtos	Visų rūšių gyvūnais	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba katego- rija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		monografijos (FAO JECFA 'Hydroxypropyl methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0348						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stingdikliai

1c464	Hidroksipropilmetilceliuliozė	Priedo sudėtis Hidroksipropilmetilceliuliozė Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Hidroksipropilmetilceliuliozė, pagaminta vykdant iš dalies depolimerizuotos celiuliozės reakciją su metilo grupėmis ir	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo	2035 m. vasario 19 d.
-------	-------------------------------	---	--------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		turinti mažai hidroksipropilo pakaitalų. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilo grupės (-OCH₃) 19-30 % Hidroksipropoksilo grupės (-OCH₂CHOHCH₃): 3-12 % Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % (kai produktų klampa ne mažesnė kaip 50 mPa.s); ≤ 3 % (kai produktų klampa mažesnė kaip 50 mPa.s) Propileno chlorhidrinai: ≤ 0,1 mg/kg. <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilmetilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'Hydroxypropyl methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0348					procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: rišikliai								
1c464	Hidroksipropilmetilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Hidroksipropilmetilceliuliozė Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Hidroksipropilmetilceliuliozė, pagaminta vykdant iš dalies depolimerizuotos celiuliozės reakciją su metilo grupėmis ir turinti mažai hidroksipropilo pakaitalų. CAS Nr.: 9004-65-3 Metoksilo grupės (-OCH₃) 19-30 % Hidroksipropoksilo grupės (-OCH₂CHOHCH₃): 3-12 % Nuodžiūvis: ≤ 10 % Sulfatiniai pelenai: ≤ 1,5 % (kai produktų klampa ne mažesnė kaip 50 mPa.s); ≤ 3 % (kai produktų klampa mažesnė kaip 50 mPa.s) Propileno chlorhidrinai: ≤ 0,1 mg/kg. <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Hidroksipropilmetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 metilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA hidroksipropilmetilceliuliozei skirtos	Visų rūšių gyvūnais	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba katego- rija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		monografijos (FAO JECFA 'Hydroxypropyl methyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4) ir Europos farmakopėjos monografijos 0348						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: emulsikliai

1c466	Natrio karboksimetilceliuliozė	Priedo sudėtis Natrio karboksimetilceliuliozė $\geq 99,5$ % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Natrio karboksimetilceliuliozė $\geq 99,5$ % (skaičiuojant bevandenei medžiagai), gauta vykstant eterinimo reakcijai tarp	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų	2035 m. vasario 19 d.
-------	--------------------------------	---	--------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		šarminės celiuliozės komplekso ir monochloracto rūgštis CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimetilo grupės (-CH₂COOH): 0,2–1,5 viename anhidrogliukozės vienetė Nuodžiūvis: ≤ 12 % Suminis glikolatas: ≤ 0,4 % (kaip natrio glikolatas, skaičiuojant bevandenei medžiagai) Natris: ≤ 12,4 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Natrio karboksimetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 natrio karboksimetilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA natrio karboksimetilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'sodium carboxymethyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)					išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stabilizatoriai								
1c466	Natrio karbosimetilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Natrio karboksimetilceliuliozė ≥ 99,5 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Natrio karboksimetilceliuliozė ≥ 99,5 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai), gauta vykstant eterinimo reakcijai tarp šarminės celiuliozės komplekso ir monochloracto rūgšties CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimitilo grupės (-CH₂COOH): 0,2–1,5 viename anhidrogliukozės vienetė Nuodžiūvis: ≤ 12 % Suminis glikolatas: ≤ 0,4 % (kaip natrio glikolatas, skaičiuojant bevandenei medžiagai) Natris: ≤ 12,4 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Natrio karboksimetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 natrio karboksimetilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA natrio	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		karboksimetilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'sodium carboxymethyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: tirštikliai

1c466	Natrio karboksimetilceliuliozė	Priedo sudėtis Natrio karboksimetilceliuliozė $\geq 99,5$ % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Natrio karboksimetilceliuliozė $\geq 99,5$ % (skaičiuojant bevandenei medžiagai), gauta vykstant eterinimo reakcijai tarp šarminės celiuliozės komplekso ir	Visų rūšių gyvūnui	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų	2035 m. vasario 19 d.
-------	--------------------------------	--	--------------------	---	---	---	---	-----------------------

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		monochloracto rūgštis CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimetilo grupės (-CH₂COOH): 0,2–1,5 viename anhidrogliukozės vienetu Nuodžiūvis: ≤ 12 % Suminis glikolatas: ≤ 0,4 % (kaip natrio glikolatas, skaičiuojant bevandenei medžiagai) Natris: ≤ 12,4 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Natrio karboksimetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 natrio karboksimetilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA natrio karboksimetilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'sodium carboxymethyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)					naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: stingdikliai								
1c466	Natrio karbosimetilceliuliozė	<i>Priedo sudėtis</i> Natrio karboksimetilceliuliozė ≥ 99,5 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Natrio karboksimetilceliuliozė ≥ 99,5 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai), gauta vykstant eterinimo reakcijai tarp šarminės celiuliozės komplekso ir monochloracto rūgšties CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksimitilo grupės (-CH₂COOH): 0,2–1,5 viename anhidrogliukozės vienetė Nuodžiūvis: ≤ 12 % Suminis glikolatas: ≤ 0,4 % (kaip natrio glikolatas, skaičiuojant bevandenei medžiagai) Natris: ≤ 12,4 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Natrio karboksimetilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 natrio karboksimetilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA natrio	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. vasario 19 d.

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		karboksimetilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'sodium carboxymethyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: rišikliai

1c466	Natrio karboksimetilceliuliozė	Priedo sudėtis Natrio karboksimetilceliuliozė $\geq 99,5$ % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Natrio karboksimetilceliuliozė $\geq 99,5$ % (skaičiuojant bevandenei medžiagai), gauta vykstant eterinimo reakcijai tarp šarminės celiuliozės komplekso ir	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų	2035 m. vasario 19 d.
-------	--------------------------------	--	--------------------	---	---	---	--	-----------------------

Pašarų priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		monochloracto rūgštis CAS Nr.: 9000-32-4 Karboksietilo grupės (-CH ₂ COOH): 0,2–1,5 viename anhidrogliukozės vienete Nuodžiūvis: ≤ 12 % Suminis glikolatas: ≤ 0,4 % (kaip natrio glikolatas, skaičiuojant bevandenei medžiagai) Natris: ≤ 12,4 % (skaičiuojant bevandenei medžiagai) <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Natrio karboksietilceliuliozės nustatymas / apibūdinimas pašarų priede: — Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 natrio karboksietilceliuliozės atveju ir atitinkami metodai iš FAO JECFA natrio karboksietilceliuliozei skirtos monografijos (FAO JECFA 'sodium carboxymethyl cellulose' monograph) ir FAO JECFA jungtinio maisto priedų rinkinio 4 tomo (FAO JECFA combined compendium for food additives specifications, volume 4)					naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiškai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.